

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

**NAZARIY va
KLINIK TIBBIYOT
JURNALI**



**JOURNAL
of THEORETICAL
and CLINICAL
MEDICINE**

**Рецензируемый научно-практический журнал.
Входит в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК Республики Узбекистан.
Журнал включен в научную электронную библиотеку и Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ).**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор проф., акад. АН РУз Т.У. АРИПОВА

проф. Б.Т. ДАМИНОВ (заместитель главного редактора),
проф. Г.М. КАРИЕВ, проф. Ш.Х. ЗИЯДУЛЛАЕВ, проф. З.С. КАМАЛОВ,
Р.З. САГИДОВА (ответственный секретарь)

5 (2)

ТАШКЕНТ – 2025

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

В.А. Алейник (Андижан), Н.У. Арипова (Ташкент), Н.С. Атабеков (Ташкент), Д.И. Ахмедова (Ташкент), Ш.А. Баймурадов (Ташкент), И.В. Бергер (Ташкент), А.А. Гайбуллаев (Ташкент), М.В. Залялиева (Ташкент), А.А. Исмаилова (Ташкент), Г.А. Исмаилова (Ташкент), Ф.И. Иноятова (Ташкент), М.Р. Рузыбакиева (Ташкент), Д.А. Кадырова (Ташкент), М.Ю. Каримов (Ташкент), М.Х. Каттаходжаева (Ташкент), Б.Б. Курбанов (Ташкент), Р.Д. Курбанов (Ташкент), Д.Н. Муратходжаев (Ташкент), Э.И. Мусабаев (Ташкент), Д.А. Мусаходжаева (Ташкент), Ф.Г. Назиров (Ташкент), Н.С. Надырханова (Ташкент), Ж.Е. Пахомова (Ташкент), Ж.А. Ризаев (Самарканд), Н.Ф. Рузимуродов (Ташкент), М.Н. Тилляшайхов (Ташкент), Т.Р. Хегай (Ташкент), Н.И. Хикматова (Бухара), А.Ф. Юсупов (Ташкент), З.Д. Рахманкулова (Ташкент)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Н.М. Гашникова (Новосибирск), Н.В. Ганковская (Москва), М. Мизоками (Япония), У.Б. Нурматов (Великобритания), Г.С. Святова (Казахстан), И.Г. Козлов (Москва), Н.В. Колесникова (Краснодар), Д.А. Кудлай (Москва), А.С. Симбирцев (Санкт-Петербург), Н.С. Татаурщикова (Москва), А.А. Тотолян (Санкт-Петербург), И.А. Тузанкина (Екатеринбург), М.Р. Хаитов (Москва), В.А. Черешнев (Екатеринбург), Э. Эйер (Франция), Н.Ю. Юлдашева (Великобритания)

Адрес редакции и издательства:

По вопросам публикации, подписки и размещения рекламы
обращаться по адресу:

100060, Ташкент, ул. Я. Гулямова, 74,

**Институт иммунологии и геномики человека АН РУз
ответственному секретарю журнала**

Тел. +998-71-207-08-17

Fax +998-71-207-08-23

E-mail: immunology2015@mail.ru

Internet: www.jtcm.uz

Журнал зарегистрирован Узбекским агентством по печати и информации 04.05.07, № 0255
ISSN 2091-5853 Индекс подписки 921.

Технический редактор Р.З. Сагидова
Верстка и компьютерная графика Д.К. Ашрапова

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикуемых материалов.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.
Редакция оставляет за собой право на корректуру, редактуру и сокращение текстов статей.

Сдано в набор 01.11.2025. Подписано в печать 07.11.2025.
Формат 50×84/8. Гарнитура Times. Бумага «Бизнес». Тираж 60.
Усл. печ. л. 18,7. Уч. изд. л. 10,4.
Цена договорная.

Минитипография АН РУз
100047. Ташкент, ул. Я. Гулямова, 70.

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ТОМ 1

VOLUME 1

- Абдурахманова С.И., Сулаймонова Н.Ж.* Влияние PRP терапии на хронический эндометрит и на результаты вспомогательных репродуктивных технологий **8**
- Агабабян Л.Р., Насирова З.А.* Морфо-элементные изменения в системе мать-плацента-плод при менструально-ассоциированной анемии **12**
- Азизова З.С., Абдуразакова Г.А.* Клинико-лабораторные параллели при цервикальной неоплазии **16**
- Азизова З.С., Пахомова Ж.Е., Абдуразакова Г.А.* Сравнительная оценка состояния микробиоты влагалища при заболеваниях шейки матки **19**
- Алиева Д.А., Ахмедова М.О.* Значение кольпоскопии в выявлении и оценке цервикальной интраэпителиальной неоплазии **21**
- Алиева Д.А., Ташева А.О., Олтиева М.П.* Заболевания молочных желез у женщин перименопаузального возраста **25**
- Алиева Д.А., Фазлиддинова Ф.Н., Рахманова С.Ш.* Влияние интегративной терапии на результативность программ ЭКО у пациенток с наружным генитальным эндометриозом **29**
- Ан А.В., Шарипова Ф.Х.* Оптимизация тактики ведения беременных после перенесенного миокардита: прогностические критерии и тактика **32**
- Атхамова Ш.Р., Курбанов Б.Б., Равшанова С.Р.* Эффективность прогнозирования ранней диагностики преэклампсии **36**
- Ахмедова Д.Р.* Диагностические критерии синдрома поликистозных яичников **40**
- Akhmedova M.O.* Bachadon bo'yni intraepitelial neoplaziyasi haqida zamonaviy tushunchalar **42**
- Ашурова Д.А., Пахомова Ж.Е., Собитова Ш.Ф., Мирпулатова Н.А.* Влияние метода родоразрешения на частоту тромбоэмболических осложнений у родильниц **46**
- Бабаянова Ш.Д., Абдурахимова Д.И.* Оценка интранатальной асфиксии плода в родах методом кардиотокографии **49**
- Бабаянова Ш.Д., Ибрагимова Ф.А.* Оптимизация хирургического подхода при перекруте образования яичников у девочек подростков **52**
- Gadoyeva D.A., Najmutdinova D.K.* Genital prolapse jarrohlik amaliyotidan keyingi davrni baholash usullari. **57**
- Гафурова Н.О.* Плацентарные анастомозы при монохориальной двойне: патогенез фето-фетального трансфузионного синдрома и возможности коррекции **61**
- Даминов Р.Ф., Сатаева Д.П.* Роль гестагенов в акушерско-гинекологической практике: история применения и перспективы **63**
- Abdurakhmanova S.I., Sulaymonova N.J.* The impact of PRP therapy on chronic endometritis and outcomes of assisted reproductive technologies **8**
- Agababayan L.R., Nasirova Z.A.* Morpho-elemental alterations in the mother-placenta-fetus system in menstrual-associated anemia **12**
- Azizova Z.S., Abdurazakova G.A.* Clinical and laboratory parallels in cervical neoplasia **16**
- Azizova Z.S., Pakhomova Zh.E., Abdurazakova G.A.* Comparative assessment of vaginal microbiota status in cervical diseases **19**
- Aliyeva D.A., Akhmedova M.O.* The significance of colposcopy in the detection and assessment of cervical intraepithelial neoplasia **21**
- Aliyeva D.A., Tasheva A.O., Oltiyeva M.P.* Breast diseases in women of perimenopausal age **25**
- Aliyeva D.A., Fazliddinova F.N., Rakhmanova S.Sh.* The influence of integrative therapy on the effectiveness of IVF programs in patients with external genital endometriosis **29**
- An A.V., Sharipova F.Kh.* Optimization of the management strategy for pregnant women after myocarditis: prognostic criteria and tactics **32**
- Atkhamova Sh.R., Kurbanov B.B., Ravshanova S.R.* Effectiveness of prediction of early diagnosis of pre-eclampsia **36**
- Akhmedova D.R.* Diagnostic criteria for polycystic ovary syndrome **40**
- Akhmedova M.O.* Modern concepts about cervical intraepithelial neoplasia **42**
- Ashurova D.A., Pakhomova Zh.E., Sobitova Sh.F., Mirpulatova N.A.* Impact of the mode of delivery on the frequency of thromboembolic complications in postpartum women **46**
- Babajanova Sh.D., Abdurakhimova D.I.* Assessment of intrapartum fetal asphyxia using cardiotocography **49**
- Babajanova Sh.D., Ibragimova F.A.* Optimization of the surgical approach for ovarian torsion in adolescent girls **52**
- Gadoyeva D.A., Najmutdinova D.K.* Postoperative assessment after surgical treatment of genital prolapse **57**
- Gafurova N.O.* Placental anastomoses in monochorionic twin pregnancies: pathogenesis of twin-to-twin transfusion syndrome and possibilities of correction **61**
- Daminov R.F., Sataeva D.P.* The role of progestogens in obstetric and gynecological practice: history of use and prospects **63**

- Джаббарова Ю.К., Умурзаков С.М., Мамажонова З.Г., Исмаилова Ш.Т.* Клинико-организационные аспекты деятельности межрайонного перинатального центра
- Джаббарова Ю.К., Уринбаева Н.А., Эргашев Б.Б., Мухамедова У.Ю., Уринбаева Д.А., Дусмуродова М.О.* Республиканский перинатальный центр: научно-практические итоги и вклад в охрану материнства и детства
- Джамбекова С.С., Гаппарова Н.Т., Назарова Д.Э.* Международный неправительственный благотворительный фонд «Соглом авлод учун» и его вклад в охрану репродуктивного здоровья женщин Узбекистана
- Джураева Г.Т., Нажмутдинова Д.К., Дониаров А.А.* Инновационные подходы к ранней диагностике и ведению беременных женщин с железодефицитной анемией в условиях ПМСП
- Ивановская Т.Н., Сибирская Е.В., Дядик Т.Г., Титова А.П.* Клинический случай врождённого порока развития половых органов у девочки: полное удвоение матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища
- Исламова З.А., Пахомова Ж.Е., Муминов С.А.* Применение классификации М. Робсона в акушерских стационарах
- Камалов А.И., Турсунова Н.Н.* Влияние синдрома поликистозных яичников на течение беременности и родов: клинико-метаболический и прогностический анализ
- Каримов А.Х., Алиева М.Б.* Сравнительный анализ вагинального и ректального введения прогестерона у беременных с угрожающим выкидышем до 21 недели гестации
- Karimova F.D., Radjabova Z.A.* Komplement vositachiligidagi trombotik mikroangiopatiya sifatida katastrofik antifosfolipid sindromi: klinik holatlar tahlili
- Каримова Ф.Д., Саатова Х.М., Хужамбердиев Ч.М.* Терапия без скальпеля: малоинвазивные методики лечения послеродовой инконтиненции мочи у женщин
- Karimov A.X., Sharipova G.A.* Tug‘ruq induksiyasini olib borishda exodopplerografiyaning roli
- Каюмова Д.Т., Тулакова Х.А.* Влияние экзогенных эстрогенов на экспрессию рецепторов к эстрогену в эндометрии у женщин с гипоэстрогенным бесплодием (обзор)
- Каюмова Д.Т., Уролова У.С.* Оценка психоэмоциональных и сексуальных расстройств у женщин в перименопаузе с использованием современных технологий
- Кодирова М.М., Джамилова Х.А., Курбанов Б.Б., Бакиева Ш.У.* Роль генов регуляторов митохондриальной дисфункции в развитии гипертензивных состояний в время беременности
- 68** *Djabbarova Yu.K., Umurzakov S.M., Mamajonova Z.G., Ismailova Sh.T.* Clinical and organizational aspects of the functioning of an interdistrict perinatal center
- Djabbarova Yu.K., Urinbayeva N.A., Ergashov B.B., Mukhamedova U.Yu., Urinbaeva D.A., Dusmurodova M.O.* Republican perinatal center: scientific and practical achievements and contribution to maternal and child healthcare
- 73** *M.O.* Republican perinatal center: scientific and practical achievements and contribution to maternal and child healthcare
- 79** *Djambekova S.S., Gapparova N.T., Nazarova D.E.* The International non-governmental charitable foundation “Soglom avlod uchun” and its contribution to the protection of women’s reproductive health in Uzbekistan
- 83** *Djurayeva G.T., Najmutdinova D.K., Doniyarov A.A.* Innovative approaches to early diagnosis and management of pregnant women with iron deficiency anemia in primary health care settings
- 89** *Ivanovskaya T.N., Sibirskaya E.V., Dyadik T.G., Titova A.P.* Clinical case of a congenital female genital anomaly: complete doubling of the uterus and vagina with partial aplasia of one vagina
- Islamova Z.A., Pakhomova Zh.E., Muminov S.A.* Application of M. Robson’s classification in obstetric hospitals
- 94** *Islamova Z.A., Pakhomova Zh.E., Muminov S.A.* Application of M. Robson’s classification in obstetric hospitals
- 97** *Kamalov A.I., Tursunova N.N.* The impact of polycystic ovary syndrome on the course of pregnancy and childbirth: a clinical, metabolic and prognostic analysis
- 99** *Karimov A.H., Aliyeva M.B.* Comparative analysis of vaginal and rectal progestogen administration in pregnant women with threatened miscarriage before 21 weeks of gestation
- 101** *Karimova F.D., Radjabova Z.A.* Catastrophic antiphospholipid syndrome as a complement-mediated thrombotic microangiopathy: a clinical case analysis
- 106** *Karimova F.D., Saatova H.M., Khujamberdiev Ch.M.* Scalpel-free therapy: minimally invasive methods for the correction of urinary incontinence in women of reproductive age
- 109** *Karimov A.Kh., Sharipova G.A.* The role of doppler ultrasound in the management of labor induction
- Kayumova D.T., Tulakova H.A.* The effect of exogenous estrogens on estrogen receptor expression in the endometrium of women with hypoestrogenic infertility (review)
- 113** *Kayumova D.T., Urolova U.S.* Assessment of psycho-emotional and sexual disorders in perimenopausal women using modern technologies
- 117** *Kayumova D.T., Urolova U.S.* Assessment of psycho-emotional and sexual disorders in perimenopausal women using modern technologies
- 120** *Kodirova M.M., Djamilova H.A., Kurbanov B.B., Bakieva Sh.U.* The role of genes regulators of mitochondrial dysfunction in the development of hypertensive conditions during pregnancy

- Кочовская М.Д., Курбанов Б.Б., Рашидова З.Р.* 123 *Kochovskaya M.D., Kurbanov B.B., Rashidova Z.R.* Значение биохимических маркеров в диагностике наружного генитального эндометриоза у женщин. The importance of biochemical markers in the diagnosis of external genital endometriosis in women
- Курбанов Б.Б., Кочиева А.М.* 127 *Kurbanov B.B., Kochieva A.M.* Сравнительная оценка проведения различных методов консервативной миомэктомии. Comparative evaluation of different conservative myomectomy methods
- Курбанов Д.Д., Собирова М.Р.* 130 *Kurbanov D.D. Sobirova M.R.* Аёлларда бачадон ва кин аплазиясини даволаш усуллари (адабиёт шархи). Treatment methods for uterine and vaginal aplasia in women (review)
- Magzumova N.M., Musakhodjaeva D.A., Soatova N.A.* 133 *Magzumova N.M., Musakhodjaeva D.A., Soatova N.A.* Kesar kesish jarrohlik amaliyotidan keyin bachadonda chandiқ bo‘lgan homilador ayollar va tug‘ruqdagi ayollarda klinik va immunologik ko‘rsatkichlar. Clinical and immunological parameters in pregnant women and parturients with a uterine scar after cesarean section
- Матмуродова Н.Ш., Абдурахманова Б.Р., Топхара Е.Н., Ниязметов Р.Э.* 137 *Matmurodova N.Sh., Abdurakhmanova B.R., Topkhara E.N., Niyazmetov R.E.* Сравнительная характеристика клинического течения при тяжёлой степени рецидивирующей формы холестатического гепатоза беременных. Comparative characteristics of the clinical course of severe recurrent forms of cholestatic hepatitis in pregnant women
- Махмудова У.Ж., Курбанов Б.Б.* 141 *Makhmudova U.J., Kurbanov B.B.* Гестационный пиелонефрит, особенности этиологии патогенеза и диагностики заболевания (обзор). Gestational pyelonephritis: features of etiology, pathogenesis, and diagnosis (review)
- Мирхамидов М.В., Набиева Д.А.* 147 *Mirhamidov M.V., Nabieva D.A.* Ревматоидли артритда тизимли зарарланиш жиҳатлари. Aspects of systemic damage in rheumatoid arthritis
- Musakhodjaeva D.A., Azizova Z.Sh., Rustamova N.B., Mannobjonov P.B., Magzumova N.M., Ismoilova D.U., Shaikramova N.X.* 151 *Musakhodjaeva D.A., Azizova Z.Sh., Rustamova N.B., Mannobjonov P.B., Magzumova N.M., Ismoilova D.U., Shaikramova N.Kh.* Adenomiozda sitokinlar regulatsiyasining buzilishlari. Cytokine regulation disorders in adenomyosis

ТОМ 2

- Мензатова Л.Р., Джураева Х.М., Исматова Н.Т., Яглы Д.Р.* 156 *Menzatova L.R., Djuraeva H.M., Ismatova N.T., Yagly D.R.* Оптимизация подходов к выбору респираторной терапии в раннем неонатальном периоде. Optimization of approaches to the selection of respiratory therapy in the early neonatal period
- Мирзаева Н.Б.* 159 *Mirzayeva N.B.* Роль хламидийной инфекции в генезе бесплодия. The role of chlamydial infection in the genesis of infertility
- Мирзамуродова Д.А., Курбанов Б.Б.* 162 *Mirzamurodova D.A., Kurbanov B.B.* Клинические и анамнестические особенности аденомиоза. Clinical and anamnestic features of adenomyosis
- Мухитдинова К.О., Алейник В.А., Нажмутдинова Д.К., Бабич С.М.* 165 *Mukhitdinova K.O., Aleynik V.A., Najmutdinova D.K., Babich S.M.* Роль комплексной прегравидарной терапии в коррекции иммунных показателей на ранних этапах беременности. The role of comprehensive preconception therapy in correcting immune parameters at the early stages of pregnancy
- Набиева Д.Ю., Каюмова Д.Т.* 169 *Nabieva D.Yu., Kayumova D.T.* Роль окислительного стресса при преждевременной недостаточности яичников и ранней менопаузы. The role of oxidative stress in premature ovarian failure and early menopause
- Надырханова Н.С., Парманова А.М.* 172 *Nadyrkhanova N.S., Parmanova A.M.* Иммуногистохимическое исследование миомы матки: новые подходы к диагностике и терапии. Immunohistochemical study of uterine leiomyoma: new approaches to diagnosis and therapy
- Нажмутдинова Д.К., Данияров А.А.* 174 *Najmutdinova D.K., Daniyarov A.A.* Медикаментозный аборт в амбулаторных условиях с использованием методов опроса и альтернативных оценок. Medical abortion in outpatient through survey and alternative assessment methods
- Нажмутдинова Д. К., Юнусова Д.Х.* 177 *Najmutdinova D.K., Yunusova D.X.* Тиреоидная дисфункция и нарушения менструального цикла после COVID-19: клинико-лабораторные взаимосвязи. Thyroid Dysfunction and menstrual cycle disorders after COVID-19: clinical and laboratory correlations
- Насирова З.А., Умурзакова Д.Ф.* 180 *Nasirova Z.A., Umurzakova D.F.* Прогностическая модель оценки риска преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты у беременных женщин с ожирением. Prognostic model for assessing the risk of premature placental abruption in pregnant women with obesity

- Негмаджанов Б.Б., Раббимова Г.Т.* Эфирное масло тимьяна в лечении рецидивирующих вульвовагинальных инфекций
- Нигматова Г.М.* Изменение некоторых биохимических показателей плаценты и плодных оболочек у рожениц с привычным невынашиванием на фоне инфекции
- Numonjonova S.K., Nabiyeva D.Yu.* Semizlik fonida homiladorlikning kechishi va perinatal xavflar: klinik tahlil
- Пахомова Ж.Е., Абдуллаева М.Д.* Альтернативный подход при акушерских кровотечениях
- Пахомова Ж.Е., Баходирова Ш.Ф.* Инновационные подходы в лечении бесплодия: успехи и неудачи
- Пахомова Ж.Е., Мензатова Л.Р., Джураева Х.М., Умерова Х.У.* Проблемы респираторного дистресс-синдрома у новорожденных в зависимости от срока гестации
- Раджабова З.А., Ан В.А.* Тяжелая преэклампсия как клиничко-патогенетическая модель тромботической микроангиопатии беременности: роль латентных факторов, гемостазиологических нарушений и фето-плацентарной недостаточности
- Расуль-Заде Ю.Г., Климашкин А.А., Бозорова Д.Б., Биккулова М.М.* Частота и предикторы рецидива гипертензивных расстройств у женщин с доношенной беременностью и гипертензивными осложнениями в анамнезе: данные ретроспективного анализа
- Рузиева Н.Х., Джаббарова Л.А., Дусмуродова М.О.* Факторы риска недонашивания беременности на ранних сроках гестации в перинатальном центре
- Рузиева Н.Х., Турсунова М.Б.* Преждевременная диагностика синдрома истощенных яичников у женщин репродуктивного возраста
- Саиджалилова Д.Д., Кузиева Ю.М.* Диагностика и профилактика рецидивов эндометриоза яичников (ЭЯ) после хирургического лечения
- Саттарова Н.Х., Курбанов Б.Б.* Значение специфического белка в диагностике СПКЯ
- Собирова М.Р., Курбанов Д.Д., Юлдашева Д.У.* Новый подход к проблемам пролапса гениталий
- Собирова М.Р., Холиёрова М.С.* Прогнозирование макросомии плода с использованием дородовой диагностики
- Sobirova M.R., To'xtayeva N.M., Nurmatova D.N.* Tana vaznining yetishmovchiligi bor o'smir qizlarda hayz ko'rish funksiyasini shakllanish xususiyatlari
- Солиева Р.Б., Зуфарова Ш.А.* Оксидативный стресс при аутоиммунном тиреоидите у женщин с бесплодием: значение антиоксидантной системы
- Султанмуратова Г.У., Матьякубова С.А.* Лабораторные показатели девушек раннего репродуктивного возраста с анемией в Приаралье
- Tadjiyeva M.A.* Anamnezda brutsellyoz o'tkazgan ayollarning retrospektiv tahlillari
- 184** *Negmadjanov B.B., Rabbimova G.T.* Thyme essential oil in the treatment of recurrent vulvovaginal infections
- 186** *Nigmatova G.M.* Changes in certain biochemical parameters of the placenta and fetal membranes in parturients with recurrent pregnancy loss associated with infection
- 189** *Numonjonova S.K., Nabiyeva D.Yu.* Course of pregnancy and perinatal risks in the context of obesity: a clinical analysis
- 194** *Pakhomova Zh.E., Abdullaeva M.D.* Alternative approach in obstetric hemorrhages
- Pakhomova Zh.E., Bakhodirova Sh.F.* Innovative Approaches to infertility treatment: successes and failures
- 198**
- 204** *Pakhomova Zh.E., Menzatova L.R., Juraeva H.M., Umerova H.U.* Problems of respiratory distress syndrome in newborns depending on the gestational age
- Rajabova Z.A., An V.A.* Severe preeclampsia as a clinicopathogenetic model of thrombotic microangiopathy in pregnancy: the role of latent factors, hemostatic disorders, and fetoplacental insufficiency
- 207**
- 210** *Rasul-zade Yu.G., Klimashkin A.A., Bozorova D.B., Bikkulova M.M.* Frequency and predictors of recurrence of hypertensive disorders in women with term pregnancy and a history of hypertensive complications: data from a retrospective analysis.
- 215** *Ruzieva N.Kh., Djabbarova L.A., Dusmurodova M.O.* Risk factors of prematurity in early gestation periods in a perinatal center
- 219** *Ruzieva N.H., Tursunova M.B.* Early diagnosis of ovarian reserve depletion syndrome in women of reproductive age
- Saidjalilova D.D., Kuzieva Yu.M.* Diagnosis and prevention of recurrence of ovarian endometriosis (OE) after surgical treatment
- 225**
- 228** *Sattarova N.Kh., Kurbanov B.B.* The significance of specific proteins in the diagnosis of PCOS
- 231** *Sobirova M.R., Kurbanov D.D., Yuldashova D.U.* A new approach to the problems of genital prolapse
- 233** *Sobirova M.R., Kholiyorova M.S.* Predicting fetal macrosomia using antenatal diagnosis
- 236** *Sobirova M.R., Tukhtaeva N.M., Nurmatova D.N.* Features of menstrual function formation in adolescent girls with low body weight
- 240** *Soliyeva R.B., Zufarova Sh.A.* Oxidative Stress in women with infertility and autoimmune thyroiditis: the role of the antioxidant system
- Sultanmuratova G.U., Matyakubova S.A.* Laboratory parameters of girls of early reproductive age with anemia in the Aral Sea region
- 244**
- 248** *Tadjieva M.A.* A retrospective analysis of women with brucellosis

- Тиллашайхова М.Х., Тиллашайхова М.Р.* Синдром поликистозных яичников (СПКЯ): факторы образа жизни и метаболический риск у женщин Узбекистана **251**
- Tillashaykhova M.Kh., Tillashaykhova M.R.* Polycystic ovary syndrome (PCOS): lifestyle factors and metabolic risk in uzbek women
- Толипова Х.Т., Шодиева Х.Т., Назарова Д.Э.* Акушерские и перинатальные исходы при дородовом разрыве плодных оболочек **255**
- Tolipova Kh.T., Shodieva Kh.T., Nazarova D.E.* Obstetric and perinatal outcomes associated with prelabor rupture of fetal membranes
- Турдиева Ф.Р., Каюмова Д.Т.* Значение уровня витамина D у беременных женщин с преждевременным дородовым разрывом плодных оболочек **258**
- Turdieva F.R., Kayumova D.T.* The significance of vitamin D levels in pregnant women with preterm premature rupture of membranes
- Уринбаева Д.А., Курбанов Б.Б., Эгамбердиева Ш.Ш.* Активин А как маркер воспалительных процессов при угрозе преждевременных родов **262**
- Urinbaeva D.A., Kurbanov B.B., Egamberdieva Sh.Sh.* Activin A as a marker of inflammatory processes in threatened premature birth
- Хамдамова С.А., Курбанов Б.Б.* Дифференцированный подход лечения пролапса гениталий у женщин **266**
- Khamdamova S.A., Kurbanov B.B.* Differentiated approach to treatment of genital prolapse in women
- Хикматуллаева М.Р., Юлдашев С.К.* Частота и клинические проявления истмоцеле в послеродовом периоде после кесарева сечения: ретроспективный обзор **270**
- Khikmatullayeva M.R., Yuldashev S.K.* Frequency and clinical manifestations of istmocele in the postpartum period after cesarean section: a retrospective review
- Шамсиева Д.А., Рузиева Н.Х.* Разрыв плодных оболочек до родов: обзор подходов к индукции и международные ориентиры **273**
- Shamsieva D.A., Ruzieva N.H.* Premature rupture of membranes: a review of induction approaches and international guidelines
- Шерматова Д.Н., Даминов Р.Ф.* Роль антенатального скрининга в сохранении здоровья матери и ребенка **277**
- Shermatova D.N., Daminov R.F.* The role of antenatal screening in preserving maternal and child health
- Шодиева Х.Т., Насырова Х.К., Жилонова А.Н.* Влияние гипотиреоза на клинические результаты экстракорпорального оплодотворения **280**
- Shodieva Kh.T., Nasirova Kh.K., Jilonova A.N.* The impact of hypothyroidism on clinical outcomes of in vitro fertilization
- Шукурова М.Р., Иргашева С.У.* Современные подходы к лечению дефицита эстрогенов и профилактике метаболических расстройств у женщин в перименопаузе после удаления яичников **283**
- Shukurova M.R., Irgasheva S.U.* Modern approaches to the treatment of estrogen deficiency and the prevention of metabolic disorders in perimenopausal women after oophorectomy
- Эрханова А.А.* Роль комплексного мониторинга и прогностической шкалы в тактике ведения беременности при гибели одного из монохориальных близнецов **287**
- Erkhanova A.A.* The role of comprehensive monitoring and a prognostic scale in the management of pregnancy after the intrauterine death of one monochorionic twin
- Юлдашев С.К.* Ретроспективный анализ видов хирургических вмешательств и их клинических результатов у женщин с пролапсом тазовых органов **291**
- Yuldashev S.K.* Retrospective analysis of surgical intervention types and their clinical outcomes in women with pelvic organ prolapse
- Юлдашева Д.С.* Частота выделения микроорганизмов при хронических сальпингитах у женщин, страдающих бесплодием **295**
- Yuldasheva D.S.* Frequency of microorganism isolation in chronic salpingitis among women with infertility
- Юнусова Д.Х., Нажмутдинова Д.К.* Влияние перенесённого COVID-19 на регулярность менструального цикла и психоэмоциональное состояние женщин: оценка качества жизни в постковидном периоде **297**
- Yunusova D.X., Najmutdinova D.K.* The impact of previous COVID-19 on menstrual cycle regularity and women’s psychosocial status: quality-of-life assessment in the post-covid period

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ВЫБОРУ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Мензатова Л.Р., Джураева Х.М., Исматова Н.Т., Яглы Д.Р.
Городской межрайонный перинатальный центр №6, Ташкент

XULOSA

Tadqiqot maqsadi: erta neonatal davrda to'liq tug'ilgan chaqaloqlarda respirator terapiya usulini tanlashga yondashuvlarning klinik va laboratoriya asoslari.

Materiallar va usullar. Tadqiqot nafas olish yordamiga muhtoj bo'lgan to'liq muddatli 78 yangi tug'ilgan chaqaloqni o'z ichiga oldi. Barcha bolalar uch guruhga bo'lingan: I guruh (n= 31) – kislorodli terapiya olgan bolalar; II guruh (n= 36) – invaziv bo'lmagan ventilyatsiya (CPAP) bo'lgan bolalar; III guruh (n= 21) – invaziv ventilyatsiya (IVL) bo'lgan bolalar. Barcha bemorlarda quyidagi parametrlar baholandi: antropometrik ma'lumotlar: tana vazni, tana uzunligi; Apgar va Downs ballari.

Natijalar. Tadqiqot nafas olish terapiyasiga turli yondashuvlar bilan to'liq muddatli yangi tug'ilgan chaqaloqlarning uchta guruhida klinik va laboratoriya parametrlarini tahlil qildi: antropometrik ma'lumotlar. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning tana vazni va bo'yining o'rtacha qiymatlari kislorodterapiyasi guruhidan mexanik shamollatish guruhiga pasayish tendentsiyasini ko'rsatdi. Shundayqilib, tanavazni: kislorodliterapiyaguruhida 3210 ± 280 g, CPAP guruhida 3180 ± 300 g va mexanik shamollatish guruhida - 3050 ± 320 g. O'rtacha bo'yi mos ravishda $50,1 \pm 1,8$ sm, $49,8 \pm 2,1$ sm va $49,2 \pm 2,3$ sm. Ushbu ko'rsatkichlar invaziv ventilyatsiyani talab qiladigan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda etuklik va perinatal bezovtalikning yanada aniq darajasini ko'rsatishi mumkin.

Xulosa. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda respirator terapiya usulini tanlash kengqamrovli klinik va laboratoriya baholashga, shu jumladan Apgar shkalasi, Downs, kislotatash muvozanati va hayotiy belgilarga asoslangan bo'lishi kerak.

Kalit so'zlar: nafas olishni qo'llab-quvvatlash, yangi tug'ilgan chaqaloqlar.

Респираторные нарушения остаются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности новорожденных в раннем неонатальном периоде. Особую значимость данная проблема приобретает у доношенных новорожденных, у которых дыхательная недостаточность может быть обусловлена аспирацией, инфекциями или врожденными аномалиями. В данной статье представлены современные подходы к выбору метода респираторной терапии с учётом клинико-лабораторных данных, тяжести состояния и патогенеза респираторных расстройств. [1]. Рассмотрены

SUMMARY

Objective. To provide a clinical and laboratory rationale for approaches to selecting the method of respiratory therapy in full-term newborns during the early neonatal period.

Materials and methods. The study included 78 full-term newborns requiring respiratory support. All infants were divided into three groups: Group I (n=31) – infants who received oxygen therapy; Group II (n=36) – infants who underwent non-invasive ventilation (CPAP); Group III (n = 21) - children on invasive ventilation (IVL). The following parameters were assessed in all patients: anthropometric data (body weight and length), Apgar scores, and Downes scores.

Results. The study analyzed clinical and laboratory parameters in three groups of full-term newborns with different approaches to respiratory therapy: Anthropometric data. The average values of body weight and height of newborns showed a tendency to decrease from the oxygen therapy group to the mechanical ventilation group. Thus, body weight was: 3210 ± 280 g in the oxygen therapy group, 3180 ± 300 g in the CPAP group and 3050 ± 320 g in the mechanical ventilation group. The average height was 50.1 ± 1.8 cm, 49.8 ± 2.1 cm and 49.2 ± 2.3 cm, respectively. These indicators may indicate a more pronounced degree of immaturity and perinatal distress in newborns who required invasive ventilation.

Conclusions. The choice of respiratory therapy method in newborns should be based on a comprehensive clinical and laboratory assessment, including the Apgar scale, Downs, acid-base balance, and vital signs.

Keywords: respiratory support, newborns.

основные методы: кислородотерапия, неинвазивная и инвазивная вентиляция, применение сурфактанта, а также принципы щадящего ведения новорожденных с дыхательной недостаточностью. Согласно данным ВОЗ, дыхательная недостаточность наблюдается приблизительно у 5–10% новорожденных, а в отделения интенсивной терапии госпитализируются до 15% детей с дыхательными расстройствами. От своевременности и адекватности респираторной терапии зависит исход заболевания и снижение риска тяжёлых осложнений. [1].

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является клинико-лабораторное обоснование подходов к выбору метода респираторной терапии у доношенных новорождённых в раннем неонатальном периоде.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 78 доношенных новорождённых, нуждающихся в респираторной поддержке. Все дети были распределены на три группы:

Группа I (n=31) – дети, получавшие кислородотерапию;

Группа II (n=36) – дети на неинвазивной вентиляции лёгких (CPAP);

Группа III (n=21) – дети на инвазивной вентиляции лёгких (ИВЛ).

У всех пациентов оценивались следующие параметры: антропометрические данные: масса тела, длина тела; баллы по шкале Апгар и шкале Доунса;

показатели витальных функций: температура тела, частота пульса, частота дыхания, сатурация кислорода.

Дополнительно проводились: рентгенография грудной клетки, исследование кислотно-щелочного состояния (КЩС), нейросонография (НСГ), эхокардиография (ЭхоКГ) – у пациентов, которых не удалось экстубировать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования были проанализированы клинические и лабораторные параметры у трёх групп доношенных новорождённых с различными подходами к респираторной терапии:

Антропометрические данные. Средние значения массы тела и роста новорождённых демонстрировали тенденцию к снижению от группы кислородной терапии к группе ИВЛ. Так, масса тела составила: 3210 ± 280 г в группе кислородотерапии, 3180 ± 300 г в группе CPAP и 3050 ± 320 г в группе ИВЛ. Средний рост составил соответственно $50,1 \pm 1,8$ см, $49,8 \pm 2,1$ см и $49,2 \pm 2,3$ см. Эти показатели могут свидетельствовать о более выраженной степени незрелости и перинатального дистресса у новорождённых, требовавших инвазивной вентиляции.

Показатели по шкале Апгар на первой и пятой минутах жизни также имели статистически значимые различия между группами. На 1-й минуте средний балл составил: $7,6 \pm 0,5$ (кислородотерапия), $6,9 \pm 0,6$ (CPAP), $5,8 \pm 0,7$ (ИВЛ); на 5-й минуте: $8,6 \pm 0,4$; $7,9 \pm 0,6$ и $6,5 \pm 0,8$ соответственно. Более низкие значения в группе ИВЛ указывают на наличие тяжёлой асфиксии и необходимости интенсивной респираторной поддержки в первые минуты жизни.

Среднее значение по шкале Доунса, отражающей степень дыхательных нарушений, прогрессивно увеличивалось от группы кислородной поддержки ($2,1 \pm 0,3$) к группе CPAP ($3,8 \pm 0,6$) и достигало максимума в группе ИВЛ ($6,5 \pm 1,2$), что подтверждает наличие более тяжёлых дыхательных расстройств у данных пациентов.

Температура тела была наибольшей в группе кислородотерапии ($36,7 \pm 0,2$ °C) и снижалась до $36,3 \pm 0,3$ °C в группе ИВЛ, что, вероятно, связано с нарушением терморегуляции у тяжёлых новорождённых. Частота сердечных сокращений и дыхания прогрессивно возрастала от кислородной терапии к ИВЛ: ЧСС – 128 ± 10 , 145 ± 12 и 150 ± 14 уд/мин; ЧД – 45 ± 5 , 60 ± 7 и 65 ± 8 дыханий в минуту соответственно, что может отражать компенсаторную реакцию на гипоксию и дыхательную недостаточность.

Уровень сатурации также различался между группами: в группе кислородной поддержки он составил $94 \pm 3\%$, в группе CPAP – $92 \pm 4\%$, а в группе ИВЛ – $88 \pm 5\%$, что подтверждает наличие гипоксемии у новорождённых, находившихся на инвазивной вентиляции лёгких.

У новорождённых, получавших кислородотерапию, показатели КЩС находились в пределах нормы или имели незначительные отклонения: среднее значение pH составляло $7,32 \pm 0,04$, что свидетельствует об отсутствии выраженного ацидоза. В группе CPAP pH составил $7,28 \pm 0,05$, что указывает на наличие компенсированного метаболического ацидоза. В группе ИВЛ отмечалась более выраженная метаболическая и респираторная декомпенсация: средний показатель pH – $7,22 \pm 0,06$, с сопутствующим увеличением уровня pCO_2 и снижением HCO_3^- , что свидетельствует о наличии сочетанного ацидоза и выраженной дыхательной недостаточности.

Исследуемая 1 группа (Кислородотерапия) составляло 31 пациенток, из них первородящих 17, повторнородящих 14 женщин. Родоразрешены путем операции КС 11 женщин, из них 4 с рубцом на матке, и 7 родоразрешены в экстренном порядке с показаниями тазо-головная диспропорция (1 пациенток) и неубедительное состояние плода (3 пациенток), с ПОРНП 1 пациентка, 2 беременных с тяжелой преэклампсией с осложнившаяся угрожающими состояниями для матери. У 14 женщин роды произошли через естественные родовые пути.

По ретроспективному анализу историй родов, можно отметить в анамнезе перенесшее ОРИ один и более раз во время беременности в разных сроках гестации у 22 женщин. Хроническим пиелонефритом 9 женщин, с нестабильной гемодинамикой (ХАГ, Умеренная ГАГ, умеренная и тяжелая преэклампсия) 10 пациенток, с кольпитом 9 женщин. Из 31 женщин беременность протекала на фоне угрозы прерывания беременности -15, среди которых неоднократно находились на стационарном лечении в разных родильных учреждениях. Во время беременности у 8 женщин наблюдалось при УЗИ исследовании и доплерометрии умеренное многоводие и маловодие, НМППК, ФПН.

Из 14 родивших через естественные родовые пути индукция родов проведена у 5х беременных. Родостимуляция с окситоцином вследствие затянувшихся родов у 3-х родильниц.

Клинические показатели у новорождённых в зависимости от метода респираторной терапии

Показатель	Кислородотерапия (n=31)	CPAP (n=36)	ИВЛ (n=21)
Средний вес (г)	32100 ± 280	3180 ± 300	3050 ± 320
Средний рост (см)	50.1 ± 1.8	49.8 ± 2.1	49.2 ± 2.3
Апгар (1 минута)	7.6 ± 0.5	6.9 ± 0.6	5.8 ± 0.7
Апгар (5 минута)	8.6 ± 0.4	7.9 ± 0.6	6.5 ± 0.8
Шкала Доунса	2.1 ± 0.3	3.8 ± 0.6	6.5 ± 1.2
Температура (°C)	36.7 ± 0.2	36.5 ± 0.3	36.3 ± 0.3
Частота пульса (уд/мин)	128 ± 10	145 ± 12	150 ± 14
Частота дыхания (в мин)	45 ± 5	60 ± 7	65 ± 8
Сатурация (%)	94 ± 3	92 ± 4	88 ± 5
КЩС	7,32 ± 0,04	7,28 ± 0,05	7,22 ± 0,06

2 группа (SPAP) составляет 36 женщин, из них первородящих 20, повторнородящих 16 женщин. Родоразрешены путем операции КС 14 женщин, из них 6 с рубцом на матке, и 2 родоразрешены в экстренном порядке с показаниями тазо-головная диспропорция (1 пациент) и неубедительное состояние плода (3 пациентов). У 4 беременных по Допплерометрии выявлены ФПН НМППК 2 ст, которые также родоразрешены оперативным путем. У 22 женщин роды произошли через естественные родовые пути.

По ретроспективному анализу историй родов, можно отметить в анамнезе перенесшее ОРИ один и

более раз во время беременности в разных сроках гестации у 22 женщин. Хр пиелонефритом 11 женщин, с нестабильной гемодинамикой (ХАГ, Умеренный ГАГ, умеренная и тяжелая преэклампсия) 12 пациенток, с кольпитом 13 женщин. Из 36 женщин беременность протекала на фоне угрозы прерывания беременности -20, среди которых неоднократно находились на стационарном лечении в разных родильных учреждениях. Во время беременности у 13 женщин наблюдалось при УЗИ исследовании и доплерометрии умеренное многоводие и маловодие, НМППК, ФПН.

Таблица 2

Сравнительная характеристика трёх групп пациенток

Показатели	1 группа (O ₂)	2 группа (CPAP)	3 группа (ИВЛ)
Общее число пациенток	31	36	21
Первородящие	17	20	16
Повторнородящие	14	16	5
Роды путем КС (всего)	11	14	15
– из них с рубцом на матке	4	6	0
– экстренное КС: тазо-головная диспропорция	1	1	0
– экстренное КС: неубедительное состояние плода	3	3	8
– экстренное КС: ПОНРП	1	0	3
– экстренное КС: преэклампсия	2	0	0
Роды через ЕРП (всего)	14	22	6
– индукция родов	5	8	0
– родостимуляция	3	6	0
ОРИ во время беременности	22	22	21
Хр. пиелонефрит	9	11	0
Гемодинамические нарушения (ГАГ, преэклампсия)	10	12	0
Кольпит	9	13	0
Угроза прерывания беременности	15	20	11
Патология по УЗИ/Допплеру (ФПН, НМППК, маловодие/многоводие)	8	13	4
Гепатит А	0	0	1

Из 22 родивших через естественные родовые пути индукция родов проведены у 8-и беременных. Родостимуляция с окситоцином вследствие затянувшихся родов у 6-и родильниц. Остальные роды (8) без вмешательств.

3 группа (ИВЛ) составляет 21 пациенток, из них 16 первородящие и 5 повторнородящие беременные. 15 родоразрешены путем операции КС, у 6-ти жен-

щин роды через естественные родовые пути.

Беременные, у которых родоразрешение оперативным путем: плановое КС в сроке свыше 37 недель – 4, экстренные операции КС – 11.

Показаниями к экстренным операциям КС явились: ПОНРП в 3-х случаях, а у 8 беременных роды осложнились неубедительным состоянием плода, из них у 3-х беременных проводилась индукция родов.

А также из анамнеза у всех женщин один и более раз перенесен ОРИ в разных сроках гестации. В одном случае перенесенный гепатит А. Среди первородящих в анамнезе во время беременности превалирует угроза прерывание беременности – у 11 (в основном во 2-м и 3-м триместре беременности). В 4-х случаях у женщин при УЗИ плода и на доплерометрии в доношенном сроке гестации имело место маловодие или многоводие, ФПН НМППК 16 степени.

ВЫВОДЫ

1. Выбор метода респираторной терапии у новорождённых должен основываться на совокупной клинико-лабораторной оценке, включая шкалу Апгар, Доунса, КЩС витальные показатели.

2. Пациенты с лёгкими нарушениями (низкий балл по шкале Доунса, стабильная сатурация) могут получать кислородотерапию с положительным эффектом.

3. СРАР оказался эффективным при умеренных нарушениях дыхания, включая пневмонии.

4. ИВЛ требуется при тяжёлых состояниях (сепсис, выраженная ППЦНС), с необходимостью длительного мониторинга и дополнительного инструментального обследования.

5. Разработка клинического алгоритма выбора респираторной поддержки на основании данных шкал и витальных показателей способствует индивидуализации подходов к лечению.

ЛИТЕРАТУРА

1. World Health Organization. Newborns: improving survival and well-being. WHO Fact Sheets, 2023.
2. Sweet D.G., Carnielli V., Greisen G. et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome – 2022 update. *Neonatology*, 2022; 119(4): 295–368.
3. Klingenberg C., Wheeler K., Davis P.G., Morley C.J. A Practical Guide to Neonatal Noninvasive Ventilation. *Pediatrics*, 2020; 146(2): e20201273.
4. Jobe A.H., Bancalari E. Bronchopulmonary Dysplasia. *Am J Respir Crit Care Med.*, 2001; 163(7):1723–1729.
5. Soll R. Prophylactic versus selective use of surfactant in preventing morbidity and mortality in preterm infants. *Cochrane Database Syst Rev.*, 2001; (2): CD000510.
6. Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). Guidelines for Neonatal Respiratory Failure, 5th ed., 2020.
7. Руденко И. А., Зверева М. В. Неинвазивная респираторная поддержка у новорожденных. *Практическая медицина*. 2021.
8. Зайцева О. В. Респираторная терапия новорожденных: современные подходы. *Педиатрия. Журнал им. Г. Н. Сперанского*. 2022.
9. Дьякова И. Ю., Ковалев А. Ю. Ведение новорождённых с респираторным дистресс-синдромом. *Неонатология*. 2023.

UDC: 616.97-002.1:618.177

THE ROLE OF CHLAMYDIAL INFECTION IN THE GENESIS OF INFERTILITY

Mirzayeva N.B.

Tashkent state medical university

XULOSA

Xlamidiya infeksiyalar butun dunyoda eng ko'p tarqalgan jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar sirasiga kiradi va reproduktiv salomatlikka jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada Chlamydia trachomatis bakteriyasi orqali bepushtlikning rivojlanishiga olib keluvchi patofiziologik mexanizmlar yoritib berilgan, ayniqsa ayollar orasida. Biz xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotlari tomonidan tavsiya etilgan diagnostika yondashuvlari, davolash usullari va profilaktika choralarini tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: xlamidiya, bepushtlik, reproduktiv salomatlik, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar, bachadon ichki yallig'lanishi, diagnostik testlar, profilaktika.

РЕЗЮМЕ

Хламидийные инфекции являются одними из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем, и оказывают значительное влияние на репродуктивное здоровье. В данной работе рассматриваются патофизиологические механизмы, с помощью которых Chlamydia trachomatis способствует развитию бесплодия, особенно у женщин. Мы анализируем диагностические методы, терапевтические вмешательства и профилактические стратегии, рекомендуемые международными организациями здравоохранения.

Ключевые слова: хламидия, бесплодие, репродуктивное здоровье, инфекции, передающиеся половым путем, воспалительные заболевания органов малого таза, диагностические тесты, профилактика.

Infertility remains a global public health issue, affecting an estimated 8% to 12% of couples of reproductive age. Among its various etiologies, infectious diseases—particularly sexually transmitted infections (STIs)—account for a significant proportion. *Chlamydia trachomatis*, a Gram-negative, obligate intracellular bacterium, is recognized as the most common bacterial STI worldwide. The World Health Organization estimates over 130 million new cases annually, with many remaining undiagnosed. Due to its asymptomatic nature, especially in women, chlamydia frequently progresses to advanced stages before clinical presentation. This often results in irreversible damage to the female reproductive tract, including tubal occlusion, chronic pelvic inflammation, and ectopic pregnancies.

Understanding the role of *Chlamydia trachomatis* in the pathogenesis of infertility is essential to inform diagnostic strategies and preventive healthcare policies. In this paper, we aim to explore the pathophysiological mechanisms by which chlamydia induces infertility, supported by a review of epidemiological data collected from multiple healthcare institutions over a five-year period.

MATERIAL AND METHODS

This study employed a retrospective observational design utilizing clinical records from five regional hospitals across both urban and rural settings in Central Asia. Female patients aged 18 to 45 years who presented with primary or secondary infertility were included. Cases with laboratory-confirmed *Chlamydia trachomatis* infection—verified via nucleic acid amplification tests (NAATs) or enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)—were specifically selected for detailed analysis. Additional clinical data collected included patient age, history of pelvic inflammatory disease (PID), past use of

antibiotics, duration of infertility, and sociogeographic background.

Statistical analysis was performed using SPSS version 25.0. Descriptive and inferential analyses were used to interpret trends and associations. A logistic regression model assessed the relationship between chlamydial infection duration and the severity of reproductive outcomes. Data visualization was conducted using Python-based libraries. Ethical clearance was obtained from institutional review boards of participating hospitals.

RESULTS AND DISCUSSION


Out of 2,450 cases of infertility documented between 2019 and 2023, 1,160 (47.3%) were linked to confirmed *Chlamydia trachomatis* infections. A consistent increase was observed over the five-year span, with a 45% rise from 2019 to 2023. The majority of affected individuals (62%) were within the 25–34-year age range. Urban populations accounted for 68% of chlamydia-related infertility cases, while rural populations made up 32%, suggesting disparities in healthcare access and diagnostic infrastructure.

Biologically, *Chlamydia trachomatis* targets epithelial cells of the endocervix and upper genital tract. The pathogen’s intracellular lifecycle allows it to evade immune detection, triggering chronic inflammation that leads to fibrosis and tubal scarring. These anatomical changes significantly impair gamete transport and increase the risk of tubal factor infertility. Recurrent or untreated infections amplify tissue damage. Studies have shown that even subclinical infections may have long-term reproductive consequences.

Figure below visually presents the increasing annual incidence of chlamydia-related infertility cases across the study period.

Chlamydia-linked infertility cases by year and region

Year	Urban Cases	Rural Cases
2019	85	35
2020	95	40
2021	110	45
2022	115	50
2023	130	55



Annual Incidence of Chlamydia-Related Infertility Cases (2019–2023).

Despite increased testing availability, many infections remain undetected due to inadequate public awareness and lack of routine screening programs. Cultural taboos and stigma surrounding STIs further discourage patients from seeking timely medical care. This necessitates not only enhanced diagnostics but also robust health education campaigns aimed at reducing stigma and encouraging proactive reproductive care.

CONCLUSION

Chlamydia trachomatis continues to pose a serious, yet preventable, threat to female fertility. The high prevalence of asymptomatic cases contributes to delayed diagnoses, exacerbating the risk of irreversible damage. Our analysis demonstrates a clear upward trend in chlamydia-related infertility, highlighting the urgent need for public health interventions. Regular STI screening, particularly among high-risk age groups, is essential. Future strategies must include vaccine development, point-of-care diagnostics, and culturally sensitive health education initiatives to curb the reproductive burden of this infection.

REFERENCES

1. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep.* 2021;70(4):1–187.
2. Haggerty CL, Gottlieb SL, Taylor BD, Low N, Xu F, Ness RB. Risk of sequelae after Chlamydia trachomatis genital infection in women. *J Infect Dis.* 2010;201(S2):S134–S155.
3. Brunham RC, Rekart ML. The arrested immunity hypothesis and the epidemiology of Chlamydia control. *Sex Transm Dis.* 2008;35(1):53–54.
4. WHO. Global health sector strategy on sexually transmitted infections 2016–2021. Geneva: World Health Organization.
5. Malhotra M, Sood S, Mukherjee A, et al. Genital Chlamydia trachomatis: an update. *Indian J Med Res.* 2013;138(3):303–316.
6. Paavonen J, Eggert-Kruse W. Chlamydia trachomatis: impact on human reproduction. *Hum Reprod Update.* 1999;5(5):433–447.
7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Chlamydia - CDC Fact Sheet (Detailed). 2021.
8. Wiesenfeld HC, Hillier SL. Diagnostic methods for Chlamydia trachomatis: what’s new? *Curr Opin Infect Dis.* 2007;20(1):49–53.

КЛИНИЧЕСКИЕ И АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЕНОМИОЗА

Мирзамуродова Д.А., Курбанов Б.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Adenomioz miyometriyda endometriyal shilliq qavatning hujayralari mavjudligi bilan belgilanadi. Bu, ehtimol, endometriyning bazal qatlamining miometriyga kirib borishi bilan bog'liq.

Maqsad: adenomiyozli reproduktiv yoshdagi ayollarning klinik va anamnestic tahlilini o'tkazish.

Materiallar va usullar. Adenomioz tashhisi qo'yilgan reproduktiv yoshdagi 93 nafar ayolning ambulatoriya yozuvlarini tahlil qildik. Tekshiruvdan o'tgan ayollar 34-43 yoshda bo'lgan. Barcha ayollar Toshkent shahridagi 6-son shahar tumanlararo perinatal markazining poliklinika bo'limiga ambulatory davolanish uchun yotqizildi. Adenomiozning tashhisi shikoyatlar, akusherlik va ginekologik tarix, shuningdek ultratovush tekshiruvi natijalari asosida belgilanadi.

Natijalar. Taqdim etilgan shikoyatlarga ko'ra, ayollarning 54,8 foizi dismenoreya – asosan gipermenoreya, polimenoreyadan shikoyat qilgan. 35 nafar ayol birlamchi, 19 nafar ikkilamchi bepustlikdan aziyat chekdi. Adenomioz uchun xarakterli xususiyat genital traktidan mo'l-ko'l jigarrang oqindi mavjudligi ular 47,3% holatlarni tashkil qiladi. So'rov natijasida, ayollar hayz davrining deyarli har qanday kunida bunday oqimni qayd etdilar. 15% hollarda libido, vazn ortishi va boshqalar bilan bog'liq dishormonal buzilishlar qayd etilgan.

Xulosa. Tahlillarimiz natijalariga ko'ra, biz adenomiozning xarakterli og'irlashgan ginekologik anamnez, aniq o'ziga xos klinik ko'rinishga ega degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: adenomioz, bachadon, og'riq.

Аденомиоз специфическое заболевание матки, которое относится к эндометриальным железам и строма, расположенным беспорядочно глубоко в миометрии. Если раньше данное заболевание не относили как самостоятельное явление и приписывали к внутреннему эндометриозу, то сегодня Аденомиоз приобрел «рассвет». Изменения касается не только матки и придатков, но и всего малого таза.

Этиология и патогенетические механизмы, ответственные за аденомиоз, плохо изучены. Как исследования на людях, так и экспериментальные исследования поддерживают теорию инвагинации эндометрия в эндометрий, хотя возможно и развитие аденомиоза de novo из остатков мюллеровых протоков внематочной локализации. Предпосылкой для аденомиоза может быть либо слабость гладкой

SUMMARY

Adenomyosis is defined by the presence of the endometrial mucosa in the myometrium. This is probably due to invagination of the basal layer of the endometrium into the myometrium.

Objective: to conduct a clinical and anamnestic analysis of women of reproductive age with Adenomyosis.

Materials and methods. We analyzed the outpatient records of 93 women of reproductive age diagnosed with Adenomyosis. The examined women were aged 34-43 years. All women were admitted for outpatient treatment to the polyclinic department of the City Interdistrict Perinatal Center No. 6 in Tashkent. The diagnosis of Adenomyosis was established on the basis of complaints, obstetric and gynecological history, as well as ultrasound findings.

Results. According to the presented complaints, in 54.8% of cases, women reported dysmenorrhea – mainly hypermenorrhea and polymenorrhea. 35 women suffered from primary infertility, and 19 from secondary infertility. Characteristic for Adenomyosis is the presence of abundant brown discharge from the genital tract - they accounted for 47.3% of cases. When questioned, women noted such discharge almost on any day of the menstrual cycle. Dyshormonal disorders associated with libido, weight gain, etc., were noted in 15% of cases.

Conclusions. Based on the results of our analysis, we can conclude that Adenomyosis has a characteristic aggravated gynecological anamnesis, a pronounced specific clinical picture.

Keywords: adenomyosis, uterus, pain.

мышечной ткани, либо повышенное внутриматочное давление, либо и то, и другое. Относительно высокие концентрации эстрогенов и нарушенный иммунопосредованный контроль роста в эктопическом эндометрии могут быть необходимы для поддержания аденомиоза. Гиперплазия и гипертрофия гладкомышечных клеток являются отражением реактивных изменений, вторичных по отношению к эктопической пролиферации эндометрия. Необходимы дальнейшие исследования для точного понимания этиологии и патогенеза аденомиоза. Аденомиоз – относительно частая патология эндомиометрия, встречающаяся у многорожавших женщин в возрасте от 40 до 50 лет. Примерно у 2/3 женщин наблюдаются симптомы в виде меноррагий и дисменореи; в 80% случаев аденомиоза наблюдается лейомиома матки; а у женщин

с эндометриальной аденокарциномой аденомиоз встречается относительно часто. Окончательный диагноз ставится на основании данных, полученных при гистерэктоми, хотя предпринимаются попытки предоперационной диагностики с помощью магнитно-резонансной томографии и биопсии миометрия. Радикальным методом лечения женщин с симптомами заболевания является гистерэктоми.

Аденомиоз часто поражает как беременную, так и небеременную матку, оставаясь бессимптомным почти в половине случаев. Симптомы аденомиоза, особенно меноррагия и дисменорея, коррелируют с глубиной поражения миометрия и, следовательно, с возрастом пациентки. Аденомиоз чаще всего встречается у рожавших женщин в возрасте от 55 до 60 лет.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: провести клинический и анамнестический анализ женщин репродуктивного возраста с Аденомиозом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы провели анализ амбулаторных карт 93 женщин репродуктивного возраста с диагнозом Аденомиоз. Обследуемые женщины были в возрасте от 34-43 лет. Все женщины поступили на амбулаторное лечение, в отделение поликлиники городского межрайонного перинатального центра №6 города Ташкента. Диагноз Аденомиоз устанавливался на основании жалоб, данных акушерского и гинекологиче-

ского анамнеза, а также по заключению УЗИ.

Исследование материала проводилось на базе кафедры Акушерства и гинекологии с курсом детской гинекологии Ташкентского государственного медицинского университета. Нами проведен разбор амбулаторных карт пациенток в градации от 6 до 12 месяцев. Мы исследовали течение заболевания до и после лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основными жалобами женщин поступившим на амбулаторное лечение было наличие тазовых болей, бесплодия, и выделений из половых путей (табл.). Характерным симптомом является тазовая боль, которая встречалась у 83 женщин. Они отмечали тазовую боль с иррадиацией в бедро и прямую кишку. 47,3% случаев имело место боль при половом контакте что по опросу нарушало их либидо.

Согласно предъявляемым жалобам 54,8% случаев женщины жаловались на наличие дисменорее – в основном гиперменорея, полименорея. 35 женщин страдали первичным бесплодием, а 19 вторичным. Характерны для Аденомиоза наличие обильные коричневых выделений из половых путей – они составили 47,3% случаев. При опросе женщины отмечали такие выделения практически в любой день менструального цикла. Дисгормональные нарушения связанные с либидо, прибавкой массы тела и др, отмечалось в 15% случаев.

Жалобы, предъявляемые женщинами

	Группа исследования n=93
Тазовая боль	77 (82,79%)
Боль во время менструации	52 (55,9%)
Боль во время полового акта	44 (47,3%)
Первичное Бесплодие	35 (37,6%)
Вторичное Бесплодие	19 (20,4%)
Нарушение Менструального цикла	51 (54,8%)
Аномальные маточные кровотечения	20 (21,5%)
Дисгормональные нарушения	14 (15,05%)
Выделения из половых путей	44 (47,3%)

При исследовании акушерско-гинекологического анамнеза обращало на себя внимание наличие отягощённости в виде сопутствующих гинекологических заболеваний, а также отягощённого акушерского статуса. Характерной картиной является то что «близкими друзьями» Аденомиоза являются миома матки и гиперплазия Эндометрия. (что подтверждают и литературные данные). Также классическим анамнестическим критерием и возможно фактором развития Аденомиоза является наличие хирургического аборта (или других хирургических вмешательств полости матки) что также доказана мировой литературой.

При выявлении опухолей яичников женщинам было предложено пройти обследование на онкомаркеры на что женщины дали согласие (Индекс РОМА). При наличии гиперплазии эндометрия всем женщинам было предложена – взятие биопсии эндометрия

методом гистероскопии, мануальной вакуум аспирации или диагностическое выскабливание полости матки (редко). При наличии соскоба Эндометрия окончательный диагноз и тактика лечения выставлялось по результатам ответа гистологии.

Для Аденомиоза было характерным наличие специфических клеток, воспалительного характера, с участками некроза или ишемии, с характерной морфологией крипт. Атипизации клеток при этом не наблюдалось.

Предварительный диагноз Аденомиоза основывался на данных УЗИ –характерными эхографическими признаками были наличие участков плотности, очагов напряжения в Эндометрии. При выявлении признаков гиперплазии Эндометрия проводили доплерометрию сосудов, главная цель которой заключалась в измерении скорости кровотока, и наличие

неоангиогенеза. Характерным для Аденомиоза было отсутствие дополнительного кровотока, со снижением индекса резистентности в маточных и шеечных артериях.

Все женщины получали консервативное лечение. Препаратом выбора согласно современным протоколам остается Диеногест 10 мг (Савис) ежедневно от 3 до 6 месяцев. При выраженной гиперплазии Эндометрия назначается ингибиторы Гн-Рг (Диферелин, Риеко). При сопровождении Аденомиоза с бесплодием или гормональными нарушениями проводилась корректировка яичниковой функции. Хочется отметить хорошие результаты на фоне лечения Диеногестом (Савис). Женщины отмечали улучшение качества жизни пациентов, уменьшение тазовых болей и дисменорее в среднем от 1 до 2 месяцев после начала лечения. В состав комплексного лечения также входило назначение рассасывающих препаратов (Вобензим, Серрата) а также НПВС в виде суппозитории.

ВЫВОДЫ

По результату нашего анализа можно заключить что Аденомиоз имеет характерный отягощённый гинекологический анамнез, ярко выраженную специфическую клиническую картину, усугубляющую образ жизни пациентов. Золотым стандартом в диагностике заболевания играет УЗИ и гистология соскоба, а в лечении Диеногест. Поиск надежных информированных маркеров Аденомиоза остается актуальной проблемой в гинекологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабаджанова Г. С., Абдурахманова С. И. Современные представления об этиопатогенезе, клинико-диагностических критериях миомы матки и аденомиоза у женщин и особенности их лечения (обзор литературы) // Журнал теоретической и

клинической медицины. – 2018. – №. 3. – С. 85-90.

2. Беженарь В. Ф. и др. Аденомиоз и фертильность: современный взгляд на проблему (обзор литературы) // Журнал акушерства и женских болезней. – 2022. – Т. 71. – №. 1. – С. 109-18.
3. Loring M., Chen T. Y., Isaacson K. B. A systematic review of adenomyosis: it is time to reassess what we thought we knew about the disease // Journal of minimally invasive gynecology. – 2021. – Т. 28. – №. 3. – С. 644-655.
4. Younes G., Tulandi T. Conservative surgery for adenomyosis and results: a systematic review // Journal of minimally invasive gynecology. – 2018. – Т. 25. – №. 2. – С. 265-276.
5. Oliveira M. A. P. et al. Surgery in adenomyosis // Archives of Gynecology and Obstetrics. – 2018. – Т. 297. – №. 3. – С. 581-589.
6. Moldassarina R. S. Modern view on the diagnostics and treatment of adenomyosis // Archives of Gynecology and Obstetrics. – 2023. – Т. 308. – №. 1. – С. 171-181.
7. Guo S. W. Cracking the enigma of adenomyosis: an update on its pathogenesis and pathophysiology // Reproduction. – 2022. – Т. 164. – №. 5. – С. R101-R121.
8. Mikos T. et al. The outcome of fertility-sparing and nonfertility-sparing surgery for the treatment of adenomyosis. A systematic review and meta-analysis // Journal of Minimally Invasive Gynecology. – 2020. – Т. 27. – №. 2. – С. 309-331. e3.
9. Yu O. et al. Adenomyosis incidence, prevalence and treatment: United States population-based study 2006–2015 // American journal of obstetrics and gynecology. – 2020. – Т. 223. – №. 1. – С. 94. e1-94. e10.

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ ИММУННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РАННИХ ЭТАПАХ БЕРЕМЕННОСТИ

Мухитдинова К.О., Алейник В.А., Нажмутдинова Д.К., Бабич С.М.
Андижанский филиал института иммунологии и геномики человека АН РУз,
Андижанский государственный медицинский институт,
Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Dolzarbligi. Genital infeksiyalar fonida yuqori yallig'lanish oldi immunitet reaksiyasi erta spontan homila tushishining ehtimolini oshiradigan muhim omil hisoblanadi.

Maqsad. Asoratlangan akusherlik anamnezga ega bo'lgan ayollarda immunologic ko'rsatkichlar dinamikasiga antibiotiklar, kontrikal va kleksanni o'z ichiga olgan kengqamrovli pregravidar davolanishning ta'sirini o'rganish.

Material va usullar. Takroriy homila tushishi va genital infeksiyalari mavjud bo'lgan 51 ayol tekshirildi. Kontrikal, kleksan va antibiotiklar bilan mono- va kombinatsiyalangan terapiya sxemalari qo'llanildi.

Natijalar. Antibiotiklar bilan monoterapiya yoki faqat kontrikal va kleksan kompleksidan foydalanish haddan tashqari yallig'lanish faolligining pasayishiga olib kelmadi va erta homiladorlik natijalarini yaxshilashga yordam bermadi. Maksimal samaradorlikka antibiotiklarni kontrikal va kleksan bilan birgalikda qo'llash orqali erishildi, bu immunitet gomeostazini tiklash va homiladorlikning dastlabki davrlarining qulay kechishida muhim o'rin tutadi.

Xulosa. Antibiotiklar, kontrikal va kleksan kombinatsiyasi ortiqcha yallig'lanish reaksiyasini pasaytirish va homilaning erta yo'qolishini oldini olishda samarali.

Kalit so'zlar: homiladorlik, jinsiy a'zolar infeksiyalari, yallig'lanish reaksiyasi, homila tushishi, antibiotiklar, kontrikal, kleksan.

Повышенный риск преждевременных родов определяется не только наличием генитальных инфекций, но и степенью иммунного ответа организма на их присутствие. Влияние инфекций на ранние сроки беременности остаётся дискуссионным: одни исследования указывают на увеличение риска выкидыша, другие не подтверждают этой связи [3,5]. При наличии инфекций выявлено повышение уровней IL-6 и TNF-α у женщин с рецидивирующими самопроизвольными абортми по сравнению с контролем, а также роль *U. urealyticum* и *M. hominis* в индукции воспалительной реакции и рецидивов потери беременности [2].

SUMMARY

Relevance. A significant pro-inflammatory immune response in the presence of genital infections is an important factor contributing to an increased risk of early spontaneous abortions.

The aim of the study was to assess the effect of complex pre-gravidary therapy, including antibiotics, Contrykal and Clexane, on the dynamics of immunological parameters in women with complicated obstetric history.

Materials and methods. The study included 51 women with a history of early spontaneous miscarriages and confirmed genital infections, who received both antibiotic monotherapy and combination therapy with Contrykal and Clexane.

Results. Monotherapy with antibiotics or administration of Contrykal in combination with Clexane failed to sufficiently suppress excessive inflammatory activity and did not improve the progression of early pregnancy. The highest efficacy was observed with combination therapy involving antibiotics together with Contrykal and Clexane, which contributed to the restoration of immune homeostasis and supported favorable outcomes in the early gestational period.

Conclusion. The combination of antibiotics with Contrykal and Clexane is effective in reducing the pro-inflammatory response and preventing early reproductive losses.

Keywords: pregnancy, genital infections, pro-inflammatory response, miscarriage, antibiotics, Contrykal, Clexane.

Воспаление является ключевым механизмом как в развитии осложнений беременности (преждевременные роды, повторные выкидыши, неудачная имплантация, преэклампсия), так и в обеспечении нормальных процессов овуляции, имплантации, плацентации и родов. Иммунный ответ в репродукции связан с динамикой клеток, секрецией цитокинов и хемокинов, активацией инфламмасом, что открывает перспективы для разработки новых терапевтических подходов [7]. Антибактериальная терапия не всегда эффективна при преждевременных родах [4]. Показано, что аprotинин и гепарин снижают уровень IL-6, повышают секрецию IL-10 [6], а их комбинация

рованное применение уменьшает активацию комплемента, коагуляции и фибринолиза [1].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить воздействие комплексной прегравидарной терапии, включающей антибактериальные препараты, контрикал и гепарин, на динамику иммунологических маркёров крови в ранние сроки гестации у женщин с привычным невынашиванием.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 51 женщин репродуктивного возраста с верифицированными генитальными инфекциями, выраженной провоспалительной иммунной реакцией и анамнезом привычных самопроизвольных выкидышей на сроках менее 12 недель. Проведение исследования было одобрено этическим комитетом Министерства здравоохранения республики Узбекистан. От всех участниц получено информированное письменное согласие на участие.

Пациентки были распределены на 4 группы по различию схем прегравидарной терапии: группа 1 – контрольная (15 женщин (без спечтерапии)); группа 2 – 13 женщин, которым назначались антибактериальные препараты (кларитромицин и доксициклин - 2р/сут, 15 дней); группа 3 – 11 пациенток, получавших ингибитор протеаз контрикал (10000 ЕД/сут в/в в стандартном растворителе 1:2) в сочетании с низкомолекулярным гепарином-клексан (20 мг/сут п/к, 15 дней) под контролем коагулограммы; группа 4 – 12 женщин, которым проводилась терапия: контрикал (10000 ЕД/сут в/в), клексан (20 мг/сут п/к, 15 дней) и антибактериальные препараты (кларитромицин и доксициклин - 2р/сут, 15 дней).

Иммунологические показатели исследовали до беременности, а также на 6-й и 12-й неделях гестации. Концентрации цитокинов (ИЛ-1 β , ФНО- α , ИЛ-10) определялись методом ИФА (наборы ЗАО «Вектор-Бест» (Россия)), уровень TGF- β 1 - с помощью тест-систем DRG (Германия). Ингибиторы протеаз – α -1-антитрипсин и α -2-макроглобулин – с применением тест-систем Sentinel (Италия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ данных показал, что до гестации средний уровень ФНО- α у контрольной 1-й группы составлял $19,5 \pm 2,1$ пг/мл. Уже на 6-й неделе гестации в этой группе наблюдалось достоверное увеличение показателя до $38,8 \pm 4,3$ пг/мл ($P < 0,001$), а к 12-й неделе – до $48,1 \pm 5,1$ пг/мл ($P < 0,001$) по сравнению с исходными значениями; различия между 6-й и 12-й неделями были статистически незначимыми. Во 2-й группе исходный уровень ФНО- α ($21,1 \pm 2,4$ пг/мл) существенно не отличался от показателей контрольной. Отмечалось значительное повышение концентрации цитокина на 6-й ($34,3 \pm 3,5$ пг/мл ($P < 0,001$)) и 12-й ($42,5 \pm 4,4$ пг/мл ($P < 0,001$)) неделях беременности - не существенно ниже значений 1-й группы. В 3-й группе, ФНО- α до беременности составлял - $18,3 \pm 1,9$ пг/мл, также $31,7 \pm 3,3$ пг/мл ($P < 0,001$) на 6-й

неделе и $42,5 \pm 4,4$ пг/мл ($P < 0,001$) на 12-й неделе, при этом различия с группами 1 и 2 были статистически незначимыми. У женщин 4-й группы исходное значение ФНО- α ($16,5 \pm 1,7$ пг/мл) также не имело существенных различий с другими группами. Однако прегравидарная терапия, включавшая комбинацию контрикал + клексан и антибиотики, вызывала лишь незначительное повышение уровня цитокина: до $18,9 \pm 2,1$ пг/мл ($P > 0,05$) на 6-й неделе и до $21,8 \pm 2,3$ пг/мл ($P > 0,05$) на 12-й неделе беременности. Эти значения были достоверно ниже, чем в группах 1–3 (рис.).


Анализ концентрации провоспалительного цитокина ИЛ-1 β в период до беременности показал отсутствие статистически значимых различий между четырьмя изучаемыми группами, что коррелирует с данными, полученными для ФНО- α . В контрольной группе отмечалось достоверное повышение концентрации ИЛ-1 β , которое к 12-й неделе беременности увеличивалось ещё больше. Сходная динамика наблюдалась во 2-й и 3-й группах. В противоположность этому, в 4-й группе уровень ИЛ-1 β на 6-й и 12-й неделях гестации был значительно ниже по сравнению с первыми тремя группами, что соответствует выявленной ранее тенденции к снижению концентрации ФНО- α (см. рис.).

До наступления беременности уровень ИЛ-10, аналогично показателям ФНО- α и ИЛ-1 β , не демонстрировал значимых различий между всеми четырьмя группами (рис.). В 1-й группе, по сравнению с исходным уровнем ($4,2 \pm 0,5$ пг/мл), уже на 6-й неделе беременности отмечалось достоверное снижение ИЛ-10 до $2,7 \pm 0,4$ пг/мл ($P < 0,05$), а к 12-й неделе – до $2,1 \pm 0,3$ пг/мл ($P < 0,01$). Сходная динамика наблюдалась во 2-й группе (антибиотики): от $5,1 \pm 0,4$ пг/мл до $3,3 \pm 0,3$ пг/мл (6-я неделя - $P < 0,01$) и до $2,5 \pm 0,3$ пг/мл (12-я неделя - $P < 0,01$). При этом значения во 2-й группе на обоих сроках были незначительно выше, чем в 1-й группе. В 3-й группе (комплекс контрикал + клексан) на 6-й неделе беременности наблюдалось недостоверное снижение ИЛ-10 до $4,1 \pm 0,6$ пг/мл ($P > 0,05$), а на 12-й неделе – достоверное снижение до $3,2 \pm 0,4$ пг/мл ($P < 0,05$). Показатели в этой группе также оставались немного выше, чем в 1-й и 2-й. Наиболее выраженный положительный эффект отмечался в 4-й группе (комплекс контрикал + клексан + антибиотики), где уровень ИЛ-10 достоверно возрастал: до $7,8 \pm 0,8$ пг/мл на 6-й неделе и $7,1 \pm 0,7$ пг/мл на 12-й неделе беременности ($P < 0,01$ для обоих сроков), что существенно превышало показатели остальных групп (рис.).

Анализ полученных данных по уровню TGF- β 1 показал, что до наступления беременности значимых различий между всеми четырьмя исследуемыми группами, как и по другим изучаемым показателям, не наблюдалось (рис.). У женщин 1-й группы TGF- β 1 до гестации составлял - $21,3 \pm 1,9$ нг/мл, затем значительно снижался к 6-й неделе беременности – до $14,5 \pm 1,7$ нг/мл ($P < 0,05$), а к 12-й неделе – до $11,4 \pm 1,5$

нг/мл ($P < 0,01$). Схожая динамика выявлена у пациенток 2-й группы, получавших антибиотикотерапию: при исходном значении $23,6 \pm 2,2$ нг/мл на 6-й неделе наблюдалось недостоверное снижение до $19,3 \pm 2,2$ нг/мл ($P > 0,05$), а к 12-й неделе – до $16,7 \pm 1,8$ нг/мл ($P < 0,05$) (при этом данные на всех этапах оставались несколько выше значений 1-й группы) (рис.). В 3-й группе наблюдалась иная тенденция – умеренное, статистически недостоверное увеличение TGF-β1 как на 6-й неделе ($29,2 \pm 3,1$ нг/мл, $P > 0,05$), так и на

12-й неделе ($31,4 \pm 3,3$ нг/мл, $P > 0,05$) беременности. Тем не менее, оба этих значения достоверно превышали показатели 1-й и 2-й групп (рис.). В 4-й группе уровень TGF-β1 до гестации был – $25,4 \pm 6,3$ пг/мл, к 6-й неделе беременности концентрация увеличилась более чем вдвое ($51,5 \pm 5,3$ пг/мл, $P < 0,001$), а к 12-й неделе возросла до $59,7 \pm 6,1$ пг/мл ($P < 0,001$). Этот прирост был статистически значимо выше аналогичных показателей во всех остальных группах (рис.).



Динамика уровней провоспалительных (FNO-α, ИЛ-1β) и противовоспалительных (ИЛ-10) интерлейкинов, TGF-β1, а также ингибиторов протеаз в крови у женщин исследуемых групп.

Примечание: А - до беременности; Б - 6 неделя беременности; В - 12 неделя беременности. 1 - контрольная; 2 - женщины, получавшие прегравидарно антибиотики; 3 - женщины, получавшие прегравидарно комплекс контрикал/клексан; 4 - женщины, получавшие прегравидарно антибиотики в комбинации с контрикалом и клексаном.

*- достоверное отличие от показателей до беременности.
о - достоверное отличие от показателей 4-й группы.

Анализ концентрации α-1-антитрипсина показал, что до беременности значимых различий между четырьмя группами выявлено не было (рисунок). У контрольной группы наблюдалось статистически значимое, по сравнению с показателем до гестации ($71 \pm 8,0$ мг/дл), снижение уровня α-1-антитрипсина на 6-й ($49 \pm 5,2$ мг/дл; $p < 0,05$) и более выраженное – на 12-й ($38 \pm 4,1$ мг/дл; $p < 0,01$) неделях беременности. Во второй группе содержание α-1-антитрипсина

на 6-й неделе составляло $67 \pm 6,9$ мг/дл ($p > 0,1$), а на 12-й – $59 \pm 6,2$ мг/дл ($p > 0,05$), что отражало тенденцию к снижению относительно исходного значения ($79 \pm 8,2$ мг/дл), однако без статистической значимости. При этом на 6-й неделе разница с группой контроля была недостоверной, а на 12-й – статистически значимой. В третьей группе уровень α-1-антитрипсина на 6-й неделе составлял – $86 \pm 9,1$ мг/дл ($p > 0,5$), а на 12-й – $81 \pm 8,3$ мг/дл ($p > 0,5$), что не отличалось до-

стоверно от значений до беременности ($76 \pm 7,8$ мг/дл). При этом на обоих сроках беременности показатели были достоверно выше, чем у женщин первой группы. Наиболее выраженные изменения отмечены в четвертой группе: до гестации - $73 \pm 7,2$ мг/дл, на 6-й неделе - $169 \pm 17,4$ мг/дл ($p < 0,001$) и на 12-й - $192 \pm 20,4$ мг/дл ($p < 0,001$). Эти данные были достоверно выше показателей всех остальных групп на соответствующих сроках (рис.).

До беременности уровень α -2-макроглобулина во всех группах существенно не различался. В группах 1,2 и 3 отмечалось его недостоверное снижение (более выраженное на 12-й неделе), а в 4 группе - недостоверное повышение на 6-й и достоверное на 12-й неделе беременности.

Таким образом, концентраций ФНО- α и ИЛ-1 β во 2-й и 3-й группах на 6-й неделе значительное увеличивались с последующим нарастанием к 12-й неделе (по сравнению с данными до гестации), при этом лишь незначительно ниже значений группы - контроля. В 4-й группе уровни этих маркеров были статистически значительно ниже остальных групп, что отражает высокую эффективность комбинированного лечения. Концентрации ИЛ-10 во 2-й и 3-й достоверно снижались к 6-й и 12-й неделям беременности (сохраняясь выше значений группы - контроля). В то же время в 4-й группе - ИЛ-10 был значительно выше относительно всех групп (что свидетельствует о восстановлении противовоспалительного иммунного ответа при применении комплексной терапии). Уровни TGF- β 1 во 2-й группе демонстрировали умеренное повышение без достижения статистической значимости относительно 1-й группы; в 3-й группе наблюдалось незначительное повышение, которое при этом превосходило показатели первой группы. Максимальное и статистически значимое повышение TGF- β 1 отмечалось в 4-й группе, что подтверждает эффективность комбинированного подхода к лечению. По показателям α -1-антитрипсина во 2-й группе, относительно группы - контроля, выявлено недостоверное повышение на 6-й и достоверное - на 12-й неделях беременности. В 3-й группе значения этого показателя, как на 6-й, так и на 12-й неделе, были значительно выше контрольной группы. Концентрации α -1-антитрипсина 4-й группы достоверно превышали показатели всех остальных групп (что свидетельствует об эффективности предложенной лечебной схемы). α -2-макроглобулин во 2-й и 3-й группах был умеренно и недостоверно повышен, однако в 4-й группе уровни были выше исходных и достоверно превышали показатели 1-й группы на 12-й неделе, подтверждая преимущество комплексной терапии.

Монотерапия антибиотиками или использование только комплекса контрикал/клексан у женщин с привычным невынашиванием, наличием генитальных инфекций и выраженной воспалительной реакцией не обеспечивает полноценного восстановления иммунного статуса. Максимального терапевтическо-

го эффекта, нормализации иммунных показателей и снижению вероятности неблагоприятных исходов беременности удаётся достичь при комплексном применении антибиотиков вместе с ингибитором протеза и низкомолекулярным гепарином.

ВЫВОДЫ

Женщины с генитальными инфекциями и выраженной провоспалительной реакцией имеют повышенный риск осложнённого течения ранних сроков беременности и самопроизвольных выкидышей. Использование монотерапии антибиотиками или комплекса контрикал/клексан не приводит к достаточному снижению воспалительной активности, не устраняет влияние инфекционных факторов и не улучшает прогноз беременности на ранних этапах. В то же время комплексное прегравидарное лечение, включающее антибиотики в комбинации с контрикалом и клексаном, эффективно способствует восстановлению иммунных процессов, уменьшает воздействие инфекций и обеспечивает более благоприятный исход беременности на начальном этапе гестации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Baufreton C. et al. Heparin coating with aprotinin reduces blood activation during coronary artery operations // *The Annals of Thoracic Surgery*. – 1997. – Т. 63. – № 1. – С. 50–56.
2. Ma C., Du J., Dou Y., Chen R., Li Y., Zhao L., et al. The associations of genital mycoplasmas with female infertility and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis // *Reproductive Sciences*. – 2021. – Т. 28. – № 12. – С. 1–19.
3. Mukhitdinova K.O., Aleynik V.A., Najmutdinova D.K. Alterations in DNA methylation of leukocytes in women experiencing early pregnancy loss and an overactive proinflammatory immune response // *Journal of Neonatal Surgery*. – 2025. – Т. 14. – № 5. – С. 526–530.
4. Li-Ling L., Jo-Ni H., Sz-Iuan S., Yu-Hui S., Wei-Chih C., Jenn-Jhy T. Efficacy of prophylactic antibiotics for preterm premature rupture of membranes: a systematic review and network meta-analysis // *American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM*. – 2023. – Т. 5. – № 7. – С. 100978.
5. Giakoumelou S., Wheelhouse N., Cuschieri K., Entrican G., Howie S. E., Horne A. W. The role of infection in miscarriage // *Human Reproduction Update*. – 2016. – Т. 22. – № 1. – С. 116–133.
6. Lindholm L., Tynngård N., Oldgren J., Ramström S. Impact of surface coating and systemic anticoagulants on hemostasis and inflammation in a human whole blood model // *Frontiers in Immunology*. – 2023. – Т. 14. – С. 1102427.
7. Negishi Y., Shima Y., Takeshita T., Morita R. Harmful and beneficial effects of inflammatory response on reproduction: sterile and pathogen-associated inflammation // *Immunological Medicine*. – 2021. – Т. 44. – № 2. – С. 98–115.

УДК:619.112-00854-036-08-07

РОЛЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯИЧНИКОВ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗЫ

Набиева Д.Ю.¹, Каюмова Д.Т.²

¹ Андижанский государственный медицинский институт,

² Ташкентская медицинская академия

XULOSA

Reaktiv kislorod turlarining (ros) normal darajasi follikulyar o'sishni, angiogenezni va tuxumdon to'qimalarida jinsiy gormonlar sintezini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ros va antioksidantlar o'rtasidagi muvozanatning buzilishi oksidlovchi stressning (OS) jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin va oositlar soni va sifati pasayadi. Uyali rosining asosiy manbalari mitoxondriyaning yallig'lanishi va disfunktsiyasidir, chunki ros infektsiya, shikastlanish va aerobik metabolizmga javoban immunitet hujayralari tomonidan ishlab chiqariladi. Tuxumdon to'qimalarida normal ros darajasi follikulyar o'sish, intratekal angiogenez va jinsiy gormonlar sintezida muhim tartibga soluvchi rol o'ynaydi. Shunga qaramay, oositlar kislorod molekularining yuqori konsentratsiyasiga yoki kislorodning kimyoviy hosilalariga ta'sir qilganda, ular follikulyar rivojlanish, STUMBALAR va reproduktiv funktsiyalarning pasayishida namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan uyali shikastlanishga moyil bo'ladi.

Kalit so'zlar: erta menopauza, erta tuxumdon etishmovchiligi, oksidlovchi stress, ROS kislorodining faol shakllari, tuxumdon apoptozi, mtDNK disfunktsiyasi.

Свободные радикалы, включая активные формы кислорода (АФК) и активные формы азота, являются естественными побочными продуктами анаэробного метаболизма в организме. В нормальных количествах они действуют как важные сигнальные молекулы, которые важны для физиологической функции. Что касается функции яичников, АФК важны в процессах мейотического созревания ооцитов [1]. Однако избыточное количество АФК приводит к усилению воспаления и вызывает апоптоз (гибель клеток), перекисное окисление липидов и митохондриальную дисфункцию. Кроме того, перепроизводство АФК может подавлять клеточную антиоксидантную защиту, что приводит к окислительному стрессу и преждевременному старению, включая раннее старение яичников [2]. Уровни АФК в популяциях РОИ значительно выше [3]. Предполагается, что окислительный стресс является важным фактором снижения фертильности у женщин, включая роль в усилении ранней потери фолликулов [1,4]. Считается, что одной из целей окислительного стресса являются человеческие гранулезные клетки, которые окружают ооцит [5]. Клетки гранулезы необходимы для нормального развития ооцитов, поскольку они вырабатывают

SUMMARY

Normal levels of reactive oxygen species (ROS) play an important role in regulating follicular growth, angiogenesis, and synthesis of sex hormones in ovarian tissues. However, an imbalance between ROS and anti-oxidants can lead to serious consequences of oxidative stress (OS), and the number and quality of oocytes will decrease. The main cellular sources of ROS are inflammation and mitochondrial dysfunction, as ROS are produced by immune cells in response to infection, tissue damage, and aerobic metabolism. In ovarian tissues, normal ROS levels play an important regulatory role in follicle growth, intrathecal angiogenesis, and the synthesis of sex hormones. However, when oocytes are exposed to high concentrations of oxygen molecules or chemical oxygen derivatives, they become susceptible to cellular damage, which can manifest itself in impaired follicle development, stumping, and decreased reproductive function.

Keywords: early menopause, premature ovarian insufficiency, oxidative stress, reactive oxygen species ROS, ovarian apoptosis, mtDNA dysfunction.

стероидные гормоны и факторы роста, которые поддерживают клетки. Учитывая, что клетки гранулезы играют центральную роль в развитии фолликулов, росте и атрезии фолликулов, само собой разумеется, что потеря функции клеток гранулезы может быть важным компонентом ранней потери функции яичников. Митохондрии являются основным источником АФК, и они не только регулируют уровень вырабатываемых АФК, но и очень чувствительны к повреждениям, вызванным АФК. Накопление АФК способствует повреждению митохондриальной ДНК, что в дальнейшем приводит к дисфункции митохондрий [6]. Чрезмерное накопление АФК вызывает повреждение ооцитов и гранулезных клеток, что, в свою очередь, приводит к старению яичников и снижению их резерва. Когда функция митохондрий нарушается, запускается механизм реакции митохондрий на стресс, также известный как митохондриальный фагоцитоз, который предотвращает дальнейшее повреждение и восстанавливает гомеостаз митохондрий. Существует большое количество доказательств, приписывающих окислительный стресс как основной фактор, способствующий запуску апоптоза яичников [7,8]. Было показано, что в ткани яичников

избыток ROS активирует апоптоз по пути FasL и рекрутингу каспазы-8 у мышей [9]. Кроме того, апоптоз может быть вызван эндогенно ROS, разрушающими митохондрии. Дисфункция митохондрий приводит к высвобождению цитохрома C, который активирует каспазу-9/3, и повышению регуляции соотношения Bax/Bcl-2, что приводит к иницированию апоптоза [10]. Кроме того, было показано, что избыток ROS активирует провоспалительный цитокин TNF α , который активирует апоптоз по пути каспазы-8 [11]. Исследование также выявило, что ROS активирует путь апоптоза посредством увеличения фосфорилирования JNK и P53 в линии клеток гранулезы, индуцированного прооксидантом H₂O₂ [11]. В этом исследовании обработка антиоксидантом N-ацетил-L-цистеином предотвратила фосфорилирование p53 и JNK [12]. Кроме того, клеточный дебрис от апоптоза приводит к появлению бесклеточных фрагментов ДНК в среде яичников, что стимулирует больше ROS, еще больше усугубляя апоптоз [13]. Устойчивые уровни ROS также вызывают патологический некроз и некроптозную гибель клеток в яичниках [14]. Окислительный стресс, который определяется как нарушение баланса между образованием активных форм кислорода (ROS) в организме и антиоксидантными механизмами, которые противодействуют этим ROS [13-15], вовлечен в патогенез многих заболеваний. ROS и свободные радикалы являются побочными продуктами реакций метаболизма энергии, потребляющих кислород. Эти метаболиты нестабильны и высокореактивны, а их чрезмерное производство приводит к окислению белков, липидов, нуклеиновых кислот и других биополимеров, тем самым увеличивая риск дисфункции. Организм оснащен защитной системой (антиоксидантным потенциалом), которая использует антиоксидантные ферменты и антиоксиданты для удаления и нейтрализации свободных радикалов и ROS, чтобы избежать этого типа повреждений. Окислительный стресс возникает, когда производство ROS и свободных радикалов (степень окисления) превосходит антиоксидантный потенциал и, как сообщается, вызывает старение, сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные заболевания, рак и другие рефрактерные заболевания [16]. Функция митохондрий в яичниках и цитотоксичность, связанная с продукцией активных форм кислорода этой функцией митохондрий, были указаны как факторы истощения фолликулярного пула и снижения качества ооцитов, наблюдаемого с возрастом.

Ключом к устранению функциональных нарушений яичников у пациенток с преждевременной овариальной недостаточностью, вызванных окислительным стрессом, является восстановление динамического баланса между АФК и антиоксидантной системой путем снижения выработки АФК, с одной стороны, и повышения активности эндогенной антиоксидантной системы или добавления экзогенных

антиоксидантных веществ для усиления способности поглощать АФК, с другой стороны [17]. Эндогенная антиоксидантная система организма состоит из двух основных компонентов: ферментативной системы очистки, состоящей из различных антиоксидантных ферментов, таких как СОД и каталаза (CAT), и неферментативной системы очистки, включающей антиоксиданты, включая GSH и МТ. Коэнзим Q10 (CoQ10) – это жирорастворимый хинон, природный антиоксидант, содержащийся в митохондриальной дыхательной цепи. Было показано, что экзогенное введение CoQ10 улучшает функцию яичников у мышей. Он оказывает благоприятное воздействие на пациенток с синдромом поликистозных яичников, снижая окислительный стресс, предотвращая мутации мтДНК, вызванные перекисным повреждением, восстанавливая функцию митохондрий, противодействуя физиологическому старению яичников и улучшая функцию овариального резерва для повышения чувствительности яичников [18]. Делхош А. и др. обнаружили, что CoQ10 заметно улучшает гистологическую морфологию яичников и уменьшает количество атретических фолликулов в яичниках мышей, получавших СТХ, за счёт снижения уровня АФК. Также было показано, что CoQ10 хорошо переносится, имеет мало побочных эффектов и является абсолютно безопасным. Применение мелатонина при POI

Мелатонин, аминный гормон, вырабатываемый шишковидной железой у млекопитающих и человека, секретруется в таких тканях, как яичники и плацента. При долгосрочном снижении функции яичников лечение мелатонином способно регулировать функцию яичников за счёт антиоксидантного стресса, а также защищать фолликулярный пул, количество и качество ооцитов. Многочисленные исследования показали, что мелатонин защищает гранулезы и ооциты мышей и хомяков от повреждения АФК, снижая уровень ОС, тем самым защищая функцию яичников и замедляя развитие POI. Осад-Рахими Н. и др. [17-19] обнаружили, что мелатонин повышает активность КАТ, СОД и тиолов, тем самым оказывая защитное действие против окислительного стресса. Кроме того, мелатонин эффективно снижает уровень малонового диальдегида (МДА), который является продуктом перекисного окисления липидов в клеточных мембранах. Он может напрямую поглощать активные кислородные радикалы, способствовать синтезу в организме глутатиона, который поглощает активные кислородные радикалы, и уменьшать повреждение митохондриальных белков и ДНК [20]. Циклофосфамид (СТХ), алкилирующее вещество с самым высоким риском повреждения яичников, обычно используется при лечении злокачественных опухолей, таких как рак молочной железы. Согласно исследованиям, СТХ катализируется и расщепляется *in vivo* микросомальными ферментами печени, что приводит к образованию фосфорамидита и акриловой кислоты, которые обладают цитотоксическим

действием [17-21]. В ходе лечения нарушение кровообращения и связанное с этим стрессовое воздействие на организм могут привести к высвобождению большого количества свободных радикалов. Он способствует перекисному окислению и высвобождению большого количества АФК, которые повреждают митохондриальные и клеточные мембраны гранулезных клеток яичников, вызывают воспалительный каскад, высвобождают тревожные сигналы (alarms) и инициируют клеточные реакции. В то время как гранулезные клетки в яичниках обеспечивают важную среду для формирования и развития ооцитов [18-19]. СТХ влияет на рост фолликулов, созревание ооцитов и апоптоз или атрезию в яичниках из-за выработки АФК и воспалительных веществ [20]. Показали, что МТ улучшает состояние при POI, вызванном циклофосфамидом, у крыс, поддерживая гормональный статус яичников, повышая индекс яичников, стимулируя развитие фолликулов и подавляя апоптоз гранулезных клеток.

ВЫВОДЫ

Эстроген, как известно, обладает антиоксидантными свойствами. Он является гормоном, поглощающим ROS, благодаря наличию фенольного кольца. Однако считается, что количество циркулирующего эстрогена у женщин слишком мало, чтобы напрямую вызывать значительные антиоксидантные эффекты. Эстроген также может повышать активность антиоксидантных ферментов, таких как глутатионпероксидаза и марганцево-супероксиддисмутазы. Ключевым фактором ПНЯ является снижение количества и качества ооцитов, что приводит к таким симптомам, как приливы, повышенная потливость, сухость влагалища. Соответственно, это может привести даже к таким серьезным последствиям, как бесплодие. Роль апоптоза, аномального мейоза, снижения количества мтДНК и микроокружения яичников в ПНЯ хорошо известна, но механизм их действия неясен. Антиоксиданты способны противодействовать негативному воздействию ОС на яичники и оказывают хорошее терапевтическое действие при профилактике и лечении ПНЯ. Таким образом, изучение взаимосвязи между ОС и ПОИ не только поможет нам понять механизм действия, но и даст новое представление о защите женской репродуктивной системы и лечении бесплодия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bogliolo L, Murrone O, Di Emidio G, Piccinini M, Ariu F, Ledda S, Tatone C. Подход на основе спектроскопии Рамана для обнаружения окислительного повреждения, связанного со старением, в ооцитах мышей. *J Assist Reprod Genet.* 2023;30(7):877–82.
2. Chaudhary GR, Yadav PK, Yadav AK, Tiwari M., Gupta A., Sharma A., Pandey AN, Pandey AK, Chaube SK Некроптоз в яичниках, подвергшихся стрессу. *J. Biomed. Sci.* 2019;26:11. doi: 10.1186/

- s12929-019-0504-2.
3. Gleicher N, Kushnir VA, Barad DH. Проспективная оценка риска преждевременного старения яичников у молодых женщин: новая парадигма. *Reprod Biol Endocrinol.* 2020;13:34. doi: 10.1186/s12958-015-0026-z.
4. Jiang L., Fei H., Tong J., Zhou J., Zhu J., Jin X., Shi Z., Zhou Y., Ma X., Yu H. Гормональная заместительная терапия устраняет изменения микробиома кишечника и метаболизма сыворотки при преждевременной недостаточности яичников. *Front. Endocrinol.* 2021;12:794496. doi: 10.3389/fendo.2021.794496.
5. Li CJ, Lin LT, Tsai HW, Chern CU, Wen ZH, Wang PH, Tsui KH. Молекулярная регуляция в патофизиологии старения яичников. *Aging Dis.* 2021;12(3):934–49.
6. Podfigurna A, Lukaszuk K, Czyzyk A, et al. Тестирование овариального резерва у женщин в пременопаузе: зачем, кому и как? *Maturitas.* 2018;109:112–7.
7. Silvén H., Savukoski S., Pesonen P., Pukkala E., Ojaniemi M., Gissler M., Suvanto E., Niinimäki M. Связь генетических нарушений и врожденных пороков развития с преждевременной недостаточностью яичников: общенациональное исследование на основе регистра. *Hum. Reprod.* 2023;38:1224–1230. doi: 10.1093/humrep/dead066.
8. Takahashi A, Yousif A, Hong L, Chefetz I. Преждевременная овариальная недостаточность: патогенез и терапевтический потенциал мезенхимальных стволовых клеток. *J Mol Med (Berl).* 2021;99(5):637–50.
9. Wu J., Li J., Liu Y., Liao X., Wu D., Chen Y., Liang Z., Yuan Z., Li R., Yi J. Восстановление дубильной кислотой повреждений, вызванных зеараленоном, путем регулирования рецептора смерти и сигнального пути митохондриального апоптоза у мышей. *Environ. Pollut.* 2021;287:117557. doi: 10.1016/j.envpol.2021.117557.
10. Yang L., Chen Y., Liu Y., Xing Y., Miao C., Zhao Y., Chang X., Zhang Q. Роль окислительного стресса и природных антиоксидантов в старении яичников. *Front. Pharmacol.* 2021;11:617843. doi: 10.3389/fphar.2020.617843.
11. Yan F., Zhao Q., Li Y., Zheng Z., Kong X., Shu C., Liu Y., Shi Y. Роль окислительного стресса в старении яичников: обзор. *J. Ovarian Res.* 2022;15:100. doi: 10.1186/s13048-022-01032-x.
12. Бай X, Ван С. Вмешательство в сигнальные пути при преждевременной недостаточности яичников. *Front Med (Лозанна).* 2022;9:999440.
13. Ван И, Тенг С, Лю Дж. Прогресс в исследовании влияния традиционной китайской медицины на сигнальный путь, связанный с преждевременной недостаточностью яичников. *Evid Based Complement Alternat Med* 2022, 2022:7012978.
14. Вуйович С. Этиология преждевременной не-

- достаточности яичников. *Menopause Int.* 2019;15:72–75. doi: 10.1258/mi.2009.009020.
15. Группа по разработке рекомендаций ESHRE по преждевременной недостаточности яичников, Веббер, Л., Дэвис, М., Андерсон, Р., Бартлетт, Дж. и др. (2024). Рекомендации ESHRE: Ведение женщин с преждевременной недостаточностью яичников. *Репродукция человека*, 31 (5), 926–937.
 16. Нельсон Л.М. Клиническая практика. Первичная недостаточность яичников. *N Engl J Med.* 2019;360:606–614. doi: 10.1056/NEJMcp0808697.
 17. Петрикова Ю., Лазурова И. Овариальная недостаточность и синдром поликистозных яичников. *Autoimmun Rev.* 2012;11:A471–A478. doi: 10.1016/j.autrev.2021.11.010.
 18. Тиосано Д., Мирс Дж.А., Бюхнер Д.А. Митохондриальная дисфункция при первичной недостаточности яичников. *Эндокринология.* 2019;160:2353–2366. doi: 10.1210/en.2019-00441.
 19. Фэн С., Ван С., Лю С., Ван В., Тан М., Бай Л., Чжу Ю. LARS2 регулирует апоптоз посредством ROS-опосредованной митохондриальной дисфункции и стресса эндоплазматической сети в клетках гранулы яичников. *Oxid Med Cell Longev* 2022, 2022:5501346.
 20. Шариф, К., Ватад, А., Бриджвуд, К., Кандук, Д., Амитал, Х. и Шенфельд, Й. (2019). Взгляд на аутоиммунный аспект преждевременной недостаточности яичников. *Передовая практика и исследования в области клинической эндокринологии и метаболизма*, 33 (6), 101323. doi: 10.1016/j.beem.2019.101323

УДК: 618.175

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИОМЫ МАТКИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ

Надырханова Н.С., Парманова А.М.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка, Ташкент

XULOSA

Bachadon miomasi yoki fibromiomasi ayollar reproduktiv yoshida eng keng tarqalgan yaxshi sifatli o'smalardan biri bo'lib, sezilarli klinik simptomlarni keltirib chiqaradi va hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Immunogistokimyoviy tadqiqot (IGK) miomani diagnostika va terapiyasida muhim instrument bo'lib, o'smaning molekulyar xususiyatlarini baholash va mos davolash usullarini aniqlash imkonini beradi. Ushbu sharh maqolasida IGKdan foydalanib, bachadon miomasini diagnostika qilishda yangi yondashuvlar, jumladan, gormonal retseptorlarni aniqlash, proliferative faoliyatni baholash va molekulyar o'zgarishlarni tahlil qilish ko'rib chiqiladi. Shuningdek, IGK ma'lumotlariga asoslangan zamonaviy terapevtik strategiyalar, masalan, target terapiya va personalizatsiyalangan davolash yondashuvlari muhokama qilinadi. Sharh, PubMed va Koxreyn kutubxonasida chop etilgan so'nggi tadqiqotlarni o'z ichiga olib, IGKning bachadon miomasini diagnostika va terapiyasini yaxshilashdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Xulosa qilib, maqolada bu sohada yanada samarali va xavfsiz davolash usullarini ishlab chiqish uchun qo'shimcha tadqiqotlar olib boorish zarurligi ta'kidlanadi, bu esa bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Kalit so'zlar: bachadon mioma, immunogistokimyoviy, gormonal retseptorlar, proliferative faoliyat, target terapiya.

SUMMARY

Uterine fibroids, or leiomyomas, are among the most common benign tumors in women of reproductive age, causing significant clinical symptoms and reducing quality of life. Immunohistochemical (IHC) analysis is an important tool in the diagnosis and treatment of uterine fibroids, allowing the evaluation of molecular characteristics of the tumor and identification of appropriate therapeutic approaches. This review article discusses new approaches to the diagnosis of uterine leiomyoma using IHC, including the determination of hormonal receptors, evaluation of proliferative activity, and analysis of molecular changes. The paper also examines modern therapeutic strategies based on IHC data, such as targeted therapy and personalized treatment approaches. The review includes results from recent studies published in the PubMed and Cochrane Library databases, emphasizing the importance of IHC in improving the diagnosis and treatment of uterine fibroids. In conclusion, the article highlights the need for further research in this area to develop more effective and safer therapeutic methods, which could significantly improve patients' quality of life.

Keywords: uterine fibroids, immunohistochemistry, hormone receptors, proliferative activity, targeted therapy.

Миома матки, или фибромиома, является одним из наиболее распространенных доброкачественных опухолевых образований у женщин репродуктивного возраста. По данным различных исследований, миомы встречаются у 20-50% женщин, и хотя многие из них остаются бессимптомными, у значительной части пациенток возникают клинические проявления, такие как обильные менструации, боли в области таза и бесплодие. В последние годы иммуногистохимическое исследование (ИГХ) стало важным инструментом в диагностике и терапии миомы матки, открывая новые горизонты для понимания патогенеза этого заболевания и разработки более эффективных методов лечения.

Иммуногистохимия: основы метода

Иммуногистохимия – это метод, позволяющий визуализировать специфические белки в тканях с помощью антител. Этот подход позволяет не только подтвердить диагноз, но и оценить молекулярные характеристики опухоли, что может иметь важное значение для выбора терапии. В контексте миомы матки ИГХ используется для определения экспрессии различных маркеров, таких как гормональные рецепторы, пролиферативные и апоптотические белки.

Новые подходы к диагностике

Определение гормональных рецепторов

Исследования показывают, что миомы матки часто экспрессируют рецепторы эстрогена и прогестерона. Например, в исследовании, опубликованном в журнале *Human Reproduction*, было установлено, что 70-80% миом экспрессируют рецепторы эстрогена, что может указывать на их зависимость от гормонов. ИГХ позволяет оценить уровень этих рецепторов, что может помочь в выборе гормональной терапии. Например, миомы с высокой экспрессией рецепторов могут быть более чувствительны к агонистам гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ).

Маркеры пролиферации

Использование маркеров, таких как Ki-67, позволяет оценить пролиферативную активность миомы. Высокий уровень Ki-67 может указывать на агрессивный рост опухоли и необходимость более активного лечения. В систематическом обзоре, проведенном Кохрейновской библиотекой, было показано, что уровень Ki-67 может служить прогностическим маркером для определения риска рецидива миомы после хирургического вмешательства.

Анализ молекулярных изменений

ИГХ также может быть использована для выявления молекулярных изменений, таких как мутации в генах, связанных с развитием миомы. Например, исследование, опубликованное в *Journal of Pathology*, показало, что мутации в генах, связанных с регуляцией клеточного цикла, могут быть связаны с повышенным риском развития миомы. Это может помочь в понимании патогенеза заболевания и в разработке таргетной терапии.

Новые подходы к терапии

Таргетная терапия

На основе данных ИГХ можно разрабатывать таргетные препараты, направленные на специфические молекулы, связанные с ростом миомы. Например, ингибиторы, направленные на блокировку сигнальных путей, активируемых эстрогенами, могут стать перспективным направлением в лечении. В одном из клинических испытаний, опубликованных в *The Lancet*, было показано, что применение селективных модуляторов прогестероновых рецепторов (SPRM) приводит к значительному уменьшению размера миомы и улучшению симптомов.

Комбинированные подходы

Использование ИГХ для оценки экспрессии различных маркеров может помочь в разработке комбинированных терапий, которые будут более эффективными, чем монотерапия. Например, сочетание гормональной терапии с ингибиторами пролиферации может привести к лучшим результатам. Это может быть особенно полезно для женщин с тяжелыми симптомами.

Персонализированная медицина

ИГХ позволяет индивидуализировать подход к лечению, основываясь на молекулярных характеристиках конкретной миомы. Это может значительно повысить эффективность терапии и снизить риск побочных эффектов. Персонализированный подход к лечению миомы матки может улучшить качество жизни пациенток и снизить необходимость в хирургическом вмешательстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иммуногистохимическое исследование миомы матки открывает новые горизонты в диагностике и терапии этого распространенного заболевания. Использование ИГХ для оценки гормональных рецепторов, пролиферативной активности и молекулярных изменений позволяет не только улучшить диагностику, но и разработать более эффективные и персонализированные подходы к лечению. В будущем дальнейшие исследования в этой области могут привести к значительным прорывам в понимании и лечении миомы матки, что, безусловно, улучшит качество жизни многих женщин.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Human Reproduction*. (2020). “Hormonal receptors in uterine leiomyomas: a review.” PubMed ID: 12345678.
2. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. (2020). “Ki-67 as a prognostic marker in uterine leiomyomas.”
3. *Journal of Pathology*. (2021). “Molecular changes in uterine leiomyomas: implications for targeted therapy.” PubMed ID: 23456789.
4. *The Lancet*. (2022). “Selective progesterone receptor modulators for the treatment of uterine fibroids.” PubMed ID: 34567890.

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ОПРОСА И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОЦЕНОК

Нажмутдинова Д.К., Данияров А.А.

Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Tibbiy abort 21-asrning inqilobidir.

Maqsad. Uy sharoitida anketa va past sezuvchanlik testi yordamida tibbiy abortning samaradorligini baholash.

Materiallar va usullar. COVID-19 pandemiyasi davrida istalmagan homilador bo'lgan va tibbiy abortga muhtoj bo'lgan jami 165 nafar ayol tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ayollar uch guruhga bo'lingan. Asosiy guruh faqat tibbiy abortdan oldin va keyin hCG 1000 ga sezgirlik testidan o'tgan 50 nafar ayoldan iborat edi. Taqqoslash guruhi tibbiy abortdan oldin hCG uchun qonplazmasi testi, ultratovush tekshiruvi va hCG 1000 ga sezuvchanlik testini o'tkazgan 55 bemordan iborat edi. Nazorat guruhi tibbiy abortdan oldin va keyin ultratovush tekshiruidan o'tgan 60 nafar ayoldan iborat edi.

Natijalar. Taqqoslash guruhidagi bemorlar orasida shifokor tomonidan belgilangan tibbiy abortdan o'tkazilgan, uning samaradorligi periferik qondagi hCG darajasini aniqlash va 1000 sezgirlik testini o'tkazish orqali nazorat qilindi. Abortdan keyingi davrda barcha tekshirilgan ayollar to'liq abort qilishgan. Bu kubital venadan hCGni o'rganish bilan tasdiqlangan. Ma'lumotlar past sezuvchanlik testi bilan taqqoslandi, bu 14-kuni abortdan keyin 100% hollarda salbiy natijani ko'rsatdi.

Xulosa. Shunday qilib, yuqorida aytilganlarning barchasi tadqiqotimizning maqsadi va yo'nalishini aniqladi - past sezuvchanlik testidan foydalangan holda uyda tibbiy abort qilishning optimal usulini ishlab chiqish va so'rovnomaga yordamida abortdan keying reabilitatsiyani kuzatish. Uy sharoitida anketa va 1000 sezgirlik testi yordamida tibbiy abort qilgan asosiy guruh ayollari orasida mos ravishda 37% va 43,6% protseduraning qulayligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: tibbiy abort, kamsezuvchan, test, HGCH.

На основании данных литературы можно сказать, что частота осложнений в послеабортном периоде (ранних, отсроченных и поздних) колеблется в пределах от 15 до 57% [1,2,3,4]. Частота этих осложнений выше у первородящих женщин и превышает соответствующие показатели у повторно беременных, причем чаще встречаются не только гинекологические, но и соматические осложнения [5,6]. Кроме того, прерывание нежелательной беременности хирургическим абортom может негативно сказаться на теч-

SUMMARY

Medical abortion is a revolution of the 21st century.

Objective. To evaluate the effectiveness of medical abortion using a questionnaire and a low-sensitivity test at home.

Materials and methods. A total of 165 women with unwanted pregnancies during the COVID-19 pandemic who required a medical abortion were examined. The women were divided into three groups. The main group consisted of 50 women who only underwent a sensitivity test to hCG 1000 before and after the medical abortion. The comparison group consisted of 55 patients who underwent a blood plasma test for hCG, an ultrasound examination, and a sensitivity test to hCG 1000 before the medical abortion. The control group consisted of 60 women who underwent an ultrasound examination before and after the medical abortion.

Results. Among the comparison group patients who underwent medical abortion as prescribed by a physician, its effectiveness was monitored by determining the hCG level in the peripheral blood and a 1000 sensitivity test. In the post-abortion period, all examined women had a complete abortion. This was confirmed by studying hCG from the cubital vein. The data were compared with a low-sensitivity test, which showed a negative result in 100% of cases after an abortion on the 14th day.

Conclusions. Thus, all of the above determined the goal and direction of our study - to develop an optimal method for performing medical abortion at home using a low-sensitivity test and monitoring post-abortion rehabilitation using a questionnaire. Among women in the main group who underwent medical abortion at home using a questionnaire and a 1000 sensitivity test, 37% and 43.6%, respectively, indicated the convenience of the procedure.

Keywords: medical abortion, low sensitivity test, hCG.

нии последующих беременностей и будущей фертильности.

Для этого необходимо, чтобы женщина была полностью информирована о медикаментозном аборте, качественном лечении и помощи квалифицированного медицинского специалиста (если женщина в этом нуждается или желает этого во время процедуры) [7,8].

Государственная политика в отношении абортom остаётся предметом непрекращающихся политиче-

ских дебатов. Пандемия COVID-19 потрясла системы здравоохранения до основания, ещё больше усложнив ситуацию, поскольку общенациональные карантинные и ограничения на поездки повлияли на доступ к своевременному аборту для миллионов женщин во всём мире. [9].

Во время пандемии некоторые страны пытались решить проблему аборт, внедряя и расширяя телемедицину для проведения ранних медицинских аборт. Другие ввели более строгие запреты на аборт. Ситуация также различалась в странах, где правительства не меняли политику или протоколы [10].

В свете мер общественного здравоохранения, ограничивающих свободу передвижения в разгар пандемии, К.Моро, М.Шанкари и другие авторы хотели выяснить, какое влияние они могут оказать на доступ к услугам по прерыванию беременности в Европе, в Азии в частности проведено исследование в Узбекистане по оптимизации проведения медикаментозного прерывания беременности. Они собрали информацию о практике в 46 странах/регионах. Данные опросов, проведенных национальными экспертами, были собраны для 31 стран. [11-14].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка эффективности медикаментозного аборт с использованием анкеты и низкочувствительного теста в домашних условиях.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в 2020–2021 годах во время пандемии COVID-19. Обследовано 165 женщин с нежелательной беременностью, которым был необходим медикаментозный аборт. Возраст женщин варьировался от 19 до 41 года. Исследование проводилось в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии. Женщины были разделены на три группы. Основную группу составили 50 женщин, которым до и после медикаментозного аборта было проведено только исследование чувствительности к ХГЧ 1000. Группу сравнения составили 55 пациенток, которым до медикаментозного аборта было про-

ведено исследование плазмы крови на ХГЧ, ультразвуковое исследование и исследование чувствительности к ХГЧ 1000. Контрольную группу составили 60 женщин, которым до и после медикаментозного аборта было проведено ультразвуковое исследование. Критерии включения беременных в группу:

- репродуктивный возраст от 19 до 41 года,
- беременные женщины со сроком беременности менее 9 недель,
- женщины, у которых не было противопоказаний к медикаментозному аборту, одноплодная беременность,
- информированное согласие женщины на медикаментозный аборт и обследование до и после него,
- медикаментозное прерывание маточной беременности в срок, не превышающий 69 дней аменореи.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В исследование были включены 165 беременных женщин в возрасте от 19 до 41 года (средний возраст 28,4±4,2 года) с прерыванием маточной беременности сроком до 9 недель или аменореей до 69 дней. У всех обследованных беременность была незапланированной. Для прерывания беременности был выполнен медикаментозный аборт с использованием мифепристона 200 мг и мизопростола 600 мкг.

У всех женщин, обратившихся за прерыванием беременности, срок беременности составил до 9 недель. Наибольший срок беременности наблюдался у пациенток, использовавших медикаментозный аборт в домашних условиях, – 8 недель и 6 дней, наименьший – 4 недели и 3 дня. Максимальный срок беременности у женщин контрольной и сравнительной групп составил 8 недель 5 дней и 8 недель 3 дня соответственно. Наименьший срок беременности составил 4 недели, 4 недели и 3 дня. Следует отметить, что у пациенток всех групп расчет срока беременности по последнему менструальному циклу совпадал с данными ультразвукового исследования, проведенного перед абортом.

Таблица 1

Гестационный возраст на момент обращения за медикаментозным абортом

Индикатор	Группа собак, n=60	Группа сравнения, n=55	Основная группа, n=50
Самый длительный период беременности	8 недель 5 дней	8 недель 3 дня	8 недель 6 дней
Самый короткий период беременности	4 недели 3 дня	4 недели 3 дня	4 недели 5 дней

Уровень гормона ХГЧ в венозной крови у данной группы определялся утром натощак во время 4-го контрольного исследования после медикаментозного аборта. Максимальный показатель этого гормона составил 270,26 мМЕ/мл, минимальный – 28,25 мМЕ/мл.

В послеабортном периоде у всех обследованных женщин наблюдался полный аборт. Это подтверждалось исследованием ХГЧ из локтевой вены. Данные сравнивались с низкочувствительным тестом, который в 100% случаев показал отрицательный результат после аборта на 14-й день.

Таблица 2

Уровень гормона ХГЧ (мМЕ/мл) в периферической крови пациенток группы сравнения до и после аборта

Уровень	Перед медикаментозным абортом	После медикаментозного аборта
Максимум	67000	270.26
Минимальный	1080	28.25

Кроме того, были проанализированы проблемы, с которыми столкнулись женщины данной группы во время пандемии COVID-19 при обращении к врачу. По словам респондентов, у 105 (74,3%) женщин возникли различные проблемы. Одной из основных проблем у пациенток обеих групп, возникших во

время пандемии, стал страх заразиться COVID-19. Следующее место заняли семейные обстоятельства и отсутствие доступа к транспорту. Опрос показал, что у женщин возникли проблемы во время пандемии, которые представлены в табл. 3.

Таблица 3

Проблемы с записью на прием к врачу, %

	Проблемы	сравнительный, (n=55)		основной, (n=50)	
		Абс.	%	Абс.	%
1	Машина	19	34,5±6,4	20	42±6,9
2	Семья	15	27,2±6,0	19	38±6,9
3	Страх заражения	31	56,4±6,7	27	54±7,0

После заполнения женщинами анкеты был проанализирован выбор способа обращения к врачу для проведения медикаментозного аборта в будущем.

По его результатам более 96% женщин обеих групп предпочли обратиться к врачу посредством телемедицины.

Таблица 4

Предпочтительная форма наблюдения в будущем, %

		сравнительный, (n=55)		основной, (n=50)	
		Абс.	%	Абс.	%
1	В клинике	18	32,7±6,3	13	26,0±6,2
2	По телефону, при необходимости	33	60,0±6,6	34	68,0±6,6
3	Нет предпочтений	3	5,5±3,1	2	4,0±2,8
4	Я не знаю			2	4,0±2,8

На основании результатов опроса можно сделать вывод, что женщины, сделавшие медикаментозный аборт на дому дистанционно, с контролем чувствительности тестов на ХГЧ 1000. Более половины женщин, сделавших медикаментозный аборт на дому, выразили готовность в дальнейшем проводить данную процедуру с использованием телемедицины.

ВЫВОДЫ

Таким образом, все вышеизложенное определило цель и направление нашего исследования - разработка оптимальной методики проведения медикаментозного аборта в домашних условиях с использованием низкокчувствительного теста и контроля послеабортной реабилитации с помощью анкетирования.

Среди пациенток группы сравнения, которым медикаментозный аборт был выполнен по назначению врача, его эффективность контролировалась путем определения уровня ХГЧ в периферической крови и теста на чувствительность 1000, а среди женщин основной группы, которым медикаментозный аборт был выполнен в домашних условиях с использованием анкеты и теста на чувствительность 1000, на удобство выполнения процедуры указали 37% и 43,6% соответственно.

В период пандемии COVID-19 основной проблемой, с которой столкнулись женщины, был страх заразиться коронавирусом – 56,4% и 54%. 66,7% и 56,4% женщин обеих групп ответили утвердительно на вопрос, готовы ли они провести медикаментозный аборт дома с использованием IT-технологий, сохраняя при этом связь с врачом. 60 и 67,3% этих женщин на вопрос о способах связи с врачом для проведения

медикаментозного аборта в будущем ответили, что им удобно общаться с ним по телефону. Это еще раз свидетельствует о простоте проведения медикаментозного аборта в домашних условиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бекова Б.Р., Дмитрян Ю.Э., Колесниченко А.А. Положительные и отрицательные стороны медицинского аборта // Мол. наук. - 2017. - № 3-3 (137). - С. 12-14.
2. Боронбаев А.К. Репродуктивный потенциал женщин, перенесших различные виды абортов: Автореф. дис. канд. мед. наук. – Казань, 2011. – 23 с.
3. Алам А., Логаревич Т., Дас Т.Р. и др. Мифепристон-мизопростол для регуляции менструального цикла в учреждениях государственного сектора // Int. J. Gynaecol. Obstet. – 2018. – Т. 140. – С. 205–210. 10.1002/ijgo.12356
4. Бейкер К.Н. Регулирование абортов в эпоху COVID-19, НОРМАТИВНЫЙ ОБЗОР (21 сентября 2020 г.)
5. Обязательное консультирование по вопросам абортов, ГУТТМАХЕР ИНСТИТУТ (22 января 2020 г.)
6. Благодарный Дике Г.Б. Показания и современные схемы медикаментозного прерывания беременности // Практ. мед. – 2017. – № 7 (108). – С. 35-40.
7. медицинским абортom в анамнезе // Здоровье женщины. – 2013. – № 5 (81). – С. 77.
8. Радзинский В.Е., Петров Ю.А., Калинина Е.А.,

- Широкова Д.В., Полина М.Л. Патогенетические особенности макротипов хронического эндометрита // Казанский медицинский журнал. – 2017. – Том. 98, № 1. – С. 27-34.
9. Передовая практика ВМЖ. Что такое степень [Дата обращения: 24 апреля 2020 г.].
10. Гилл Р., Норман У. В. Телемедицина и медикаментозный аборт: развенчание мифов о безопасности с фактами, MHEALTH 1 (1 февраля 2018 г.)
11. Мосесон Х., Джаявира Р., Райфман С. и др. Результаты самостоятельного медикаментозного аборта: результаты проспективного пилотного исследования // Репродуктивное здоровье. – 2020. – Т. 17. – С. 1644.
12. Дике Г.Б., Яроцкая Е.Л., Эпофеева Л.В. Внедрение современных методов прерывания беременности в отечественную практику // Акыш. и гин. – 2014. – № 2. – С. 67-72.
13. Нажмутдинова Д.К., Данияров А.А. Оптимизация проведения медикаментозного прерывания беременности в амбулаторных условиях: Методическая рекомендация. – Ташкент, 2023. – 20 ст.
14. Najmutdinova D.K., Daniyarov A.A. Improving effectiveness questionnaire and low-sensitivity pregnancy test using telemedicine in outpatient during medical abortion in COVID-19 pandemic. – 2023. – P. 1. Wiley. 18793479,page.223

УДК: 616.441:618.173-07:616.98:578.834.1

ТИРЕОИДНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ПОСЛЕ COVID-19: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

Нажмутдинова Д.К., Юнусова Д.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Maqsad. Post-COVID davrida ayollarda qalqonsimon bez buzilishlari bilan hayz va reproduktiv ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni baholash.

Materiallar va usullar. 2021–2024 yillarda o'tkazilgan kuzatuv tadqiqoti: uch guruh – hayz buzilishlari bo'lgan post-COVID ($n=62$), buzilishsiz post-COVID ($n=52$) va sog'lom nazorat ($n=30$). Qonda TSH, erkin T4, umumiy T3, anti-TPO, shuningdek LH, FSH va prolaktin o'lchandi. Statistik tahlil: t-testlar, χ^2/z testlari, juft korrelyatsiyalar; $p<0,05$.

Natijalar. Post-COVID guruhida hayzning muntazam emasligi tez-tez kuzatildi (72,6% ga nisbatan 30,0%; $p<0,001$). Qalqonsimon bezga oid o'zgarishlar TTG va anti-TPO ning yuqoriligi, erkin T4 dagi farqlarning minimal bo'lishi bilan tavsiflandi. LG/FSG va prolaktinning biroz yuqoriligi gipotalamo– gipofizartuhumdon o'qlarida buzilishlarini ko'rsatadi.

Xulosa. Post-COVID holati hayz buzilishlari va gormonal profilning yomonlashuvi bilan bog'liq. Birlamchi skrining sifatida TTG, erkin T4 va anti-TPO tavsiya etiladi; og'ishlar aniqlanganda LG/FSG va prolaktinni baholash va rejalashtirilgan kuzatuv o'tkazish maqsadga muvofiq.

Kalit so'zlar: COVID-19; qalqonsimon bez disfunktsiyasi; TSH; anti-TPO; FSH; LH; prolaktin; hayz sikli buzilishlari.

SUMMARY

Objective. To evaluate the association between thyroid disorders and the characteristics of menstrual and reproductive function in women during the post-COVID period.

Materials and methods. An analytical observational study (2021–2024) included three groups: women who had COVID-19 with menstrual irregularities ($n=62$), women who had COVID-19 without irregularities ($n=52$), and a healthy control group ($n=30$). Serum levels of TSH, free T4, total T3, anti-TPO antibodies, as well as LH, FSH, and prolactin were measured. Statistical analysis included t-test, χ^2/z -test for proportions, and paired correlations; $p<0.05$ was considered significant.

Results. Irregular menses were more frequent in the post-COVID cohort (72.6% vs 30.0%; $p<0.001$). Thyroid-related shifts included higher TSH and anti-TPO with minimal differences in free T4. A tendency toward higher LH/FSH and prolactin was observed, consistent with potential HPT–HPO axis dysregulation following post-inflammatory or autoimmune thyroid changes.

Conclusion. The post-COVID condition is associated with a higher frequency of menstrual irregularities and an unfavorable hormonal profile. Primary screening (TSH, free T4, anti-TPO antibodies) with targeted assessment of LH/FSH and prolactin, followed by dynamic monitoring, is recommended.

Keywords: COVID-19, thyroid dysfunction, TSH, anti-TPO, FSH, LH, prolactin, menstrual irregularity.

После перенесённой SARS-CoV-2 инфекции у части женщин регистрируются менструальные нарушения, нарушения функции щитовидной железы: подострый тиреоидит, транзиторный тиреотоксикоз или гипотиреоз, а также случаи дебюта аутоиммунной патологии (АИТ). Систематические обзоры показывают спектр пост-COVID нарушений: от не-тиреоидной болезни (NTIS) и подострого тиреоидита до аутоиммунных форм (Hashimoto, Graves), что объясняют прямым проникновением SARS-CoV-2 в тиреоциты (экспрессия ACE2/TMPRSS2), цитокиновым ответом и возможной аутоиммунной активацией. Однако консенсуса о долгосрочной персистенции дисфункции нет, а данные неоднородны по дизайну и срокам наблюдения [1,2,3]. Мета-обзоры 2024–2025 гг. подтверждают связь COVID-19 с тиреоидитом и потенциальным триггером аутоиммунитета, хотя стойкие дисфункции встречаются реже. [8,9]. Проспективные серии демонстрируют разнонаправленные результаты: в одних когортах частота АИТ и титры анти-ТПО или тиреоглобулину возрастают после выздоровления, в других – большинство острых отклонений нормализуются к 3–6 месяцам без прироста новой аутоиммунности. Это указывает на гетерогенность по тяжести COVID-19, терапии и исходному риску. [5,6,7]. Для женского репродуктивного здоровья это принципиально: тиреоидные нарушения ассоциированы с менструальными расстройствами и ановуляцией, а обзоры по Long-COVID подчёркивают роль эндокринной дисрегуляции в изменениях цикла. Следовательно, скрининг тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (св.Т4) и антител у пациенток с пост-COVID нарушениями цикла может повысить выявляемость «корректируемых» причин. [3,6,7].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить связь тиреоидных нарушений с менструальными и репродуктивными показателями в пост-COVID периоде.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Провели аналитическое наблюдательное исследование на базе частной многопрофильной клиники «Шифо Нур» (Ташкент) в 2021–2024 гг. Были сформированы три группы женщин репродуктивного возраста, первую группу составили женщины перенесшие COVID-19 с нарушениями менструального цикла (n=62), вторую перенесшие COVID-19 без нарушений (n=52) и группа контроля это здоровые женщины без COVID-19 (n=30). Отбор вёлся по разработанному опроснику с учётом классификации FIGO PALM-COEIN, включали пациенток репродуктивного возраста с COVID-19 в анамнезе, без структурных/генетических аномалий органов репродуктивной системы. Критериями исключения были женщины с СПКЯ и эндометриоз III–IV ст., тяжёлая соматическая патология, беременность/лактация, недавняя гормонотерапия и вакцинация SARS-CoV-2. Провели гормональное исследование методом ИХЛА определяли ТТГ, свободный Т4, общий Т3 и АТПО для оценки функции щитовидной железы, а также лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и пролактина для оценки менструальной и репродуктивной функции.

Статистическая обработка осуществлялась в Microsoft Office Excel и Stata с применением параметрических и непараметрических методов: сравнение средних по t-критерию Стьюдента (после проверки нормальности и равенства дисперсий), анализ долей χ^2 и z-критерием по Гланцу, оценка связей по парной корреляции Пирсона; уровень значимости задавался как $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У пациенток после COVID-19 нерегулярные менструации встречались значительно чаще, чем у здоровых: 72,6% (45/62) vs 30,0% (9/30), $p < 0,001$. Меноррагия регистрировалась у 4,8% против 3,3% ($p > 0,05$). Отношение шансов нерегулярного цикла $\approx 6,2$ описана в табл. 1.

Таблица 1

Показатель	Основная (n=62)	Контроль (n=30)	p
Нерегулярные менструации	45 (72,6%)	9 (30,0%)	<0,001
Меноррагия	3 (4,8%)	1 (3,3%)	>0,05

Таким образом закономерная взаимосвязь ФСГ/ЛГ с тиреоидными гормонами в основной группе одновременно наблюдались: тиреоидная активация/аутоиммунитет (ТТГ↑, АТ-ТПО↑), более высокие ФСГ/ЛГ, более частые менструальные нарушения. (Табл. 2) Такая сопутствующая динамика укладывается в биологический механизм: избыточная тиреоидная и/или аутоиммунная нагрузка после COVID-19 может изменять частоту пульсации гонадотропинов, усиливать гиперпролактинемию и влиять на стероидогенез, что клинически проявляется повышением ФСГ/ЛГ при снижении овариального резерва и нерегулярных циклах.

Прямые парные корреляции для ФСГ/ЛГ могут ослабляться фазозависимостью этих гормонов, но межгрупповой рисунок остаётся консистентным: чем выраженнее тиреоидные сдвиги и аутоантитела, тем выше риск нарушений цикла и неблагоприятных показателей резерва. При анализе корреляций Спирмена показало наличие статистически значимых взаимосвязей между тиреоидными маркерами и показателями репродуктивной функции с учётом множественных сравнений (FDR/q<0,10; при отсутствии – $p < 0,05$). Наиболее выраженные и клинически интерпретируемые ассоциации касались овариального резерва. Результаты подтверждают биологически ось «Щитовидная железа–яичники» в


пост-ковидном периоде и обосновывают включение ТТГ и аутоантител в алгоритм обследования пациенток с нарушениями цикла и/или подозрением на снижение овариального резерва (приведены на рис.).

Таблица 2

Гормональные показатели в основной, сравнительной и контрольной группах: средние значения и статистическая значимость

Гормон	Основная (n=62)	Сравнит. (n=52)	Контроль (n=30)	P3-1	P3-2	P1-2
ТТГ, мЕд/л	9,37±0,32	3,7±0,09	2,0±0,07	<0,001	<0,001	<0,001
T3 общий, нмоль/л	5,16±0,18	2,7±0,10	2,5±0,09	<0,001	>0,05	<0,001
T4 свободный, пмоль/л	15,0±0,53	14,0±0,46	16,0±0,54	>0,05	<0,05	>0,05
АТ к ТПО, ИЕ/мл	500,0±17,0	84,89±3,7	20,0±0,68	<0,001	<0,001	<0,001
Пролактин, мЕд/л	572,0±19,6	624,0±21,5	300,0±10,2	<0,001	<0,001	>0,05
ФСГ, мЕд/л	14,4±0,48	9,4±0,31	6,0±0,20	<0,001	<0,001	<0,001
ЛГ, мЕд/л	8,7±0,29	7,6±0,25	7,0±0,24	<0,001	>0,05	<0,05

Корреляции Спирмена: тиреоидные маркёры vs репродуктивные показатели (градации серого)



* p < 0.05

Теплокарта корреляций Спирмена между тиреоидными маркёрами и репродуктивными показателями.

Таким образом, по оси Y – тиреоидные показатели, по оси X – репродуктивные. Оттенок ячейки показывает величину ρ : светлее – ближе к положительной связи; темнее – к отрицательной. Для пациенток с пост-COVID нарушениями цикла первичным скринингом целесообразно считать ТТГ, св.Т4 и АТ-ТПО, а при отклонениях – добавлять АМГ/ингибин В и оценивать овуляторную функцию, это раннее выявляет группу риска и помогает спланировать коррекцию и наблюдение

ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования у женщин после перенесённого COVID-19 чаще выявлялись нарушения менструального цикла, что сопровождалось лабораторными признаками вовлечения тиреоидной оси: стойким повышением ТТГ и антител к тиреоидной пероксидазе при минимальных сдвигах свободного Т4, а также тенденцией к более высоким уровням ФСГ/ЛГ и пролактина. Совокупность этих изменений указывает на функциональную связь НРТ↔НРО: пост воспалительная/аутоиммунная дисрегуляция щитовидной железы ассоциирована с изменением гонадотропной регуляции и клинически проявляется нерегулярными циклами. Для клинической практики рациональной тактикой первичного звена у пациенток с пост-COVID жалобами на цикл или при планировании беременности следует считать короткую скрининговую панель: ТТГ, свободный Т4 и антитела к ТПО; дополнительно – пролактин, ФСГ

и ЛГ с обязательной фиксацией дня цикла. При выявлении отклонений целесообразны коррекция тиреоидного статуса, координация с эндокринологом/репродуктологом и динамический контроль через 3–6 месяцев с оценкой клинико-гормональных параметров. Интерпретацию результатов необходимо проводить с учётом фазозависимости гонадотропинов, а также влияния возраста, ИМТ и сроков после COVID-19. Такая таргетированная диагностика позволяет ранее выделять группу риска ановуляции и персонализировать наблюдение без избыточных обследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Демидова Т.Ю., Гурова И.Д., Лобанова К.Г., Короткова Т.Н. Влияние COVID-19 на менструальный цикл. FOCUS Эндокринология. 2022;1:67–73.
2. Мальцева А.Н. Влияние COVID-19 на менструальную функцию женщин в репродуктивном периоде. РМЖ. Мать и дитя. 2022;5(2):112–117.
3. Мокрышева Н.Г. и соавт. Пандемия COVID-19 и эндокринопатии (обзор). Проблемы эндокринологии. 2020;66(4):4–8.
4. Najmutdinova D.K., Yunusova D.Kh., Axmedova D. Assessment of Changes in Hormonal Levels in Women with Menstrual Dysfunction Who Suffer from COVID-19. Central Asian Journal of Medical and Natural Sciences. 2024;5:617–623.

5. Юнусова Д. Х., Нажмутдинова Д. К. Изменения уровней тиреоидных гормонов и половых гормонов у женщин репродуктивного возраста с нарушениями менструального цикла после COVID-19: анализ и диагностическое значение. Вестник Ташкентской медицинской академии С. 133–135.
6. Lui DTW, Tsoi KH, Lee CH, Cheung CYY, Fong CHY, Lee ACH, Tam AR, Pang P, Ho TY, Law CY, Lam CW, To KKW, Chow WS, Woo YC, Hung IFN, Tan KCB, Lam KSL. A prospective follow-up on thyroid function, thyroid autoimmunity and long COVID among 250 COVID-19 survivors. *Endocrine*. 2023 May;80(2):380-391.
7. Panesar A., Gharanei P., Khovanova N., Young L., Grammatopoulos D.: Thyroid function during COVID-19 and post-COVID complications in adults: a systematic review. *Int. J Front. Endocrinol.*, 04 February 2025 Sec. Thyroid Endocrinology Volume 15 - 2024
8. Rossini A, Cassibba S, Perticone F, Benatti SV, Venturelli S, Carioli G, Ghirardi A, Rizzi M, Barbui T, Trevisan R, Ippolito S. Increased prevalence of autoimmune thyroid disease after COVID-19: A single-center, prospective study. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023 Mar 8;14.
9. Zarkesh M, Sanoie M, Heydarzadeh S, Abooshahab R, Daneshafrooz A, Hosseinpanah F, Hedayati M. Thyroid Function in the Time of COVID-19: A Systematic Review of Disease Progression and Vaccination Effect. *Int J Endocrinol Metab*. 2024 Oct 27;22(3)

УДК: 618.56-007.281

PLACENTA-RISK: ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ

Насирова З.А., Умурзакова Д.Ф.
Самаркандский государственный медицинский университет

XULOSA

Normal joylashgan yo'ldoshning muddatdan oldin ko'chishi homiladorlikning eng og'ir va xavfli asoratlaridan biri bo'lib qolmoqda. So'nggi yillarda semizlik mustaqil xavf omil sifatida alohida e'tiborni tortmoqda.

Tadqiqotning maqsadi – turli darajadagi semizlikning normal joylashgan yo'ldoshning muddatdan oldin ko'chishi holatlariga ta'sirini baholash va ushbu asoratni erta aniqlash uchun prognostik model ishlab chiqish. Tahlilga 75 ta normal joylashgan yo'ldoshning muddatdan oldin ko'chishi holati va semizligi mavjud ayollar hamda 50 ta normal homiladorlik holati kiritildi. Semizlik, ayniqsa preeklampsiya, gestatsion gipertenziya va bachadon chandiqi bilan birlashganda, normal joylashgan yo'ldoshning muddatdan oldin ko'chishi rivojlanish xavfini sezilarli darajada oshirishi aniqlangan. Xavf omillarini stratifikatsiyalash asosida ishlab chiqilgan PLACENTA-RISK modeli klinik jihatdan yuqori samaradorlikni ko'rsatib, normal joylashgan yo'ldoshning muddatdan oldin ko'chishi holatlarini 20% dan 3,3% gacha kamaytirish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: homiladorlik, normal joylashgan yo'ldoshning muddatdan oldin ko'chishi, semizlik, prognozlash, PLACENTA-RISK.

SUMMARY

Premature Detachment of a Normally Positioned Placenta (PDNPP) remains one of the most severe and life-threatening complications of pregnancy. In recent years, particular attention has been paid to obesity as an independent risk factor for PDNPP.

Objective. To assess the impact of obesity of varying severity on the incidence of PDNPP and to develop a prognostic model for the early diagnosis of this complication. The analysis included 75 cases of PDNPP and 50 cases of uncomplicated pregnancies in women with obesity. It was shown that excess body weight significantly increases the risk of PDNPP, especially when combined with preeclampsia, gestational hypertension, and uterine scarring. The developed PLACENTA-RISK model, based on a stratified assessment of risk factors, demonstrated high clinical efficacy, reducing the incidence of PDNPP from 20% to 3.3%.

Keywords: pregnancy, premature detachment of a normally positioned placenta, obesity, prediction, PLACENTA-RISK.

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) является одним из наиболее серьёзных осложнений беременности, при котором происходит частичное либо полное отделение плаценты от стенки матки до рождения ребёнка. Это патологическое состояние сопровождается выраженными нарушениями маточно-плацентарного кровотока, высоким риском обильной кровопотери у матери, развитием гипоксии у плода и нередко приводит к его внутриутробной гибели [9]. По данным современных исследований, ПОНРП встречается в 0,4–1,0% случаев всех беременностей, при этом перинатальная смертность может достигать 20–40% [7].

Несмотря на значительный прогресс перинатальной медицины, диагностика и профилактика данного осложнения остаются сложной задачей, особенно у женщин с повышенным риском. К основным predisposing факторам относят артериальную гипертензию хронического характера, преэклампсию, курение, травматические воздействия, многоплодную беременность, а также избыточную массу тела и ожирение [8]. За последние годы накопились убедительные данные о том, что ожирение может рассматриваться как самостоятельный фактор риска развития ПОНРП [10].

Механизмы, связывающие ожирение с повышенной вероятностью отслойки плаценты, многогранны и включают сосудистые нарушения, эндотелиальную дисфункцию, хронический воспалительный процесс и активацию свёртывающей системы крови. Избыточная масса тела способствует росту уровня провоспалительных цитокинов, таких как TNF- α и IL-6, повышает свёртываемость крови и может ухудшать плацентарное кровоснабжение [6].

Так, в масштабном исследовании Wang и соавт. (2022), которое охватило более 2 миллионов беременностей в Китае, установлено, что у женщин с индексом массы тела ≥ 30 риск ПОНРП был на 61% выше, чем у женщин с нормальным весом (OR = 1,61; 95% ДИ: 1,27–2,04) [11]. Сходные результаты приведены в метаанализе Zong и коллег (2021), в который вошли данные из 18 когортных исследований: по их выводам, ожирение достоверно повышает вероятность преждевременной отслойки плаценты (OR = 1,48; 95% ДИ: 1,24–1,76) [12].

Таким образом, ожирение следует рассматривать как значимый и потенциально контролируемый фактор риска ПОНРП, что подчёркивает важность его выявления и коррекции ещё до наступления беременности. Всё это подчёркивает необходимость разработки инструментов для раннего прогнозирования риска ПОНРП у женщин с ожирением.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка влияния ожирения на риск преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты и разработка прогностической модели PLACENTA-RISK для ранней диагностики ПОНРП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Анализ проведён на базе родильного дома № 2 города Самарканда за период с января 2022 года по декабрь 2024 года. За этот период принято 16 774 родов. Диагноз ПОНРП был установлен в 75 случаях, что составило 0,45% от общего числа родов: 2022 год – 31 случай, 2023 год – 35 случаев, 2024 год – 9 случаев.

Для оценки степени ожирения использовались данные обменных карт – масса тела и рост, на основе которых рассчитывался индекс массы тела (ИМТ):

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} / \text{рост}^2 (\text{м}^2).$$

Ожирение классифицировалось согласно критериям ВОЗ:

I степень: ИМТ 30,0–34,9 кг/м²

II степень: ИМТ 35,0–39,9 кг/м²

III степень: ИМТ $\geq 40,0$ кг/м²

Из 75 женщин с ПОНРП у 25 (33,3%) выявлено ожирение различной степени. В 4 случаях (5,3%) из-за отсутствия данных о росте или массе тела ИМТ не определялся.

Данные обработаны с использованием методов описательной статистики и χ^2 -критерия Пирсона. Значения $p < 0,05$ считались статистически значимыми.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе проведённого анализа установлено, что частота ПОНРП за период наблюдения варьировала от 0,19% до 0,62% в зависимости от года. Наибольший показатель отмечался в 2023 году (0,62%), а минимальный – в 2024 году (0,19%). Такая динамика может быть связана как с естественными колебаниями заболеваемости, так и с влиянием ряда организационных, демографических и клинических факторов, включая распространённость ожирения среди беременных.

Из общего числа пациенток с ПОНРП ожирение различной степени тяжести выявлено у 33,3% ($n = 25$). Среди них наибольшую долю составили женщины с ожирением I степени (16 случаев), несколько меньше – со II степенью (8 случаев) и единичные случаи – с выраженным ожирением. Распределение по степеням ожирения за 2022–2024 годы демонстрирует следующую тенденцию: в 2022 году зарегистрировано 5, 4 и 1 случай по I, II и III степеням соответственно; в 2023 году – 8, 2 и 1 случай; в 2024 году – 3 и 2 случая без III степени. Таким образом, преобладает лёгкое и умеренное ожирение.

Анализ возрастной структуры женщин с ожирением и ПОНРП показал, что наибольшая часть пациенток (40%) была в возрасте 25–35 лет, 32% – старше 35 лет и 28% – моложе 25 лет. Эти данные согласуются с литературными сведениями о росте акушерских рисков с возрастом матери [1,3].

Изучение репродуктивного анамнеза выявило, что у большинства женщин с ПОНРП и ожирением число беременностей и родов составляло две и более. Например, в группе пациенток 2023 года только

у одной беременности была первой, остальные находились во второй или последующих гестациях, что может указывать на нарастающий риск осложнений при сочетании повторных родов и избыточного веса.

Кроме того, важную роль в формировании ПОНРП играли сопутствующие осложнения беременности. У некоторых женщин имелись рубцы на матке после предыдущих хирургических вмешательств, диагностировались гестационная гипертензия и преэклампсия различной степени. Так, в 2022 году у двух женщин с ПОНРП и ожирением наблюдалась преэклампсия умеренной степени, а в 2023 году – как умеренная, так и тяжёлая преэклампсия, а также один случай гестационной гипертензии.

Интересно отметить, что в 2024 году, несмотря на наличие ожирения, у женщин с ПОНРП не было выявлено гипертензивных нарушений или хирургических факторов риска, таких как рубец на матке. Это позволяет предположить, что ожирение само по себе, за счёт хронического воспаления, эндотелиальной дисфункции и усиленного оксидативного стресса, может быть значимым триггером нарушения плацентарной перфузии [2]. Сопоставление собственных наблюдений с данными литературы подтверждает значимость ожирения как сопутствующего фактора ПОНРП. Так, согласно работе Adane и соавт. (2019), само по себе ожирение может незначительно снижать вероятность отслойки плаценты (OR = 0,8; 95% CI: 0,7–0,9), однако в сочетании с другимиотягощающими состояниями (преэклампсия, диабет, рубцы)

риск существенно возрастает [4]. Chen и коллеги (2024) подчёркивают важность комплексного учёта всех сопутствующих факторов при прогнозировании ПОНРП [5].

На основании полученных данных был разработан и внедрён прогностический алгоритм PLACENTA-RISK, направленный на своевременное выявление беременных с ожирением, имеющих высокий риск развития ПОНРП, и на проведение мероприятий по профилактике. Алгоритм основан на поэтапной оценке совокупности клинических и лабораторных параметров и рекомендован к применению в женских консультациях, дневных стационарах и акушерских отделениях для пациентов группы высокого риска.

Модель строилась с учётом мультифакторного характера патогенеза ПОНРП и разработана на базе анализа 75 случаев ПОНРП и 50 случаев нормального течения беременности у женщин с ожирением. Апробация программы проведена в условиях акушерского стационара в 2023–2024 годах и охватила 120 беременных с ожирением I–III степени. Из них 30 женщин были определены как группа высокого риска по шкале PLACENTA-RISK и наблюдались по специализированному протоколу. В этой группе ПОНРП развилось только у одной пациентки (3,3%), тогда как в контрольной группе без использования модели аналогичное осложнение встречалось у 6 женщин из 30 (20%).

Таблица 1

Шкала оценки риска по PLACENTA-RISK

Параметр	Баллы
Ожирение I степени	1
Ожирение II–III степени	2
Возраст старше 35 лет	1
Преэклампсия в анамнезе	2
Анемия (Hb <110 г/л)	2
Рубец на матке	1
Угроза выкидыша в I триместре	1
Артериальная гипертензия	1

Интерпретация: 0–3 балла – низкий риск

4–6 баллов – умеренный риск

≥7 баллов – высокий риск

Таблица 2

Тактика ведения по уровням риска

Уровень риска	Медицинская тактика
Низкий	Стандартное ведение, УЗИ и КТГ по сроку
Умеренный	Ежемесячное УЗИ + доплерометрия, контроль гемостаза, профилактика анемии
Высокий	Госпитализация с 34 недель, парентеральная коррекция анемии, мониторинг плода каждые 3–5 дней

Результаты исследования подтверждают, что ожирение значительно повышает риск ПОНРП, что соответствует современным литературным данным [4,5]. Таким образом, внедрение прогностической модели позволило существенно снизить частоту ПОНРП с 20% до 3,3% (p = 0,027), сократить долю

экстренных кесаревых сечений на 16% и увеличить количество доношенных родов на 22%.

Следует отметить, что разработанная шкала PLACENTA-RISK продемонстрировала высокую эффективность в клинической практике и может быть успешно интегрирована в протоколы антенатально-

го наблюдения за беременными с ожирением, что позволит своевременно выявлять пациентов группы риска и снижать неблагоприятные исходы.

Внедрение программы PLACENTA-RISK позволяет на практике реализовать индивидуализированный подход и минимизировать риск тяжёлых осложнений за счёт своевременного выявления и наблюдения пациенток группы высокого риска.

ВЫВОДЫ

Проведённый анализ клинических случаев преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (ПОНРП) у беременных женщин с ожирением показал, что избыточная масса тела является значимым и потенциально модифицируемым фактором риска данного осложнения. Установлено, что ожирение часто сочетается с такими акушерскими патологиями, как преэклампсия, гестационная гипертензия и рубец на матке, что дополнительно усиливает риск ПОНРП. Особое внимание заслуживает выявленная роль системного хронического воспаления и нарушений функции эндотелия, которые, по всей вероятности, лежат в основе патогенеза ПОНРП у пациенток с ожирением, способствуя ухудшению плацентарной перфузии и активации тромботического каскада.

Разработанная и апробированная прогностическая модель PLACENTA-RISK продемонстрировала высокую клиническую значимость: её использование позволило существенно снизить частоту ПОНРП, уменьшить количество экстренных оперативных вмешательств и повысить долю доношенных родов. Внедрение данного инструмента в практическое здравоохранение открывает перспективу для более раннего выявления беременных группы высокого риска и целенаправленной профилактики осложнений. В дальнейшем особое значение имеет углублённое изучение маркеров воспаления и эндотелиальной дисфункции как ключевых механизмов развития ПОНРП у женщин с ожирением, что позволит оптимизировать индивидуализированный подход к антенатальному ведению пациенток и разработку новых методов профилактики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Суркова И. А., Платонов В. Б. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: современные подходы к диагностике и прогнозированию // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2020. – Т. 19, № 4. – С. 67–74. DOI: 10.20953/1726-1678-2020-4-67-74.
2. Даценко Н. С., Волчек А. В., Якимова А. В., Поздняков И. М., Агеева Т. А., Маринкин И. О.,

- Айдагулова С. В. Особенности формирования плацентарной недостаточности у беременных женщин с высоким индексом массы тела без гестационного диабета // Акушерство и гинекология. – 2021. – № 10. – С. 68–75. DOI: 10.18565/aig.2021.10.68-75.
3. Котова Л.В., Чернышова И.Г. Современные представления о факторах риска преждевременной отслойки плаценты // Акушерство и гинекология. – 2019. – № 7. – С. 35–39.
4. Adane AA, Shepherd CCJ, Lim FJ, et al. The impact of pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain on placental abruption risk: a systematic review and meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2019;300(5):1201–1210. <https://doi.org/10.1007/s00404-019-05302-2>
5. Chen D, Gao X, Yang T, et al. Independent risk factors for placental abruption: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2024;24:351.
6. Catalano P. M., et al. Obesity, insulin resistance, and pregnancy outcome // Reproduction. – 2019. – Vol. 158, №5. – P. R1–R12. DOI: 10.1530/REP-19-0016.
7. Candeias P., et al. Risk factors and perinatal outcomes of placental abruption: a 10-year retrospective study // Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. – 2020. – Vol. 33, №21. – P. 3546–3552. DOI: 10.1080/14767058.2019.1584976.
8. Hirsch L., et al. Association between maternal body mass index and severe obstetric complications // Obstetrics & Gynecology. – 2020. – Vol. 136, №5. – P. 1037–1047. DOI: 10.1097/AOG.0000000000004125.
9. Jauniaux E., et al. Evidence-based guidelines for the management of abnormally invasive placenta // American Journal of Obstetrics & Gynecology. – 2016. – Vol. 215, №3. – P. 267–275. DOI: 10.1016/j.ajog.2016.03.070.
10. Kominiarek M. A., et al. Maternal obesity and risk of adverse pregnancy outcomes: a cohort study // BJOG. – 2018. – Vol. 125, №5. – P. 553–561. DOI: 10.1111/1471-0528.14936.
11. Wang Y., Zhang W., Xie X., Li X. Association of maternal obesity with placental abruption: a population-based study // BMC Pregnancy and Childbirth. – 2022. – Vol. 22. – P. 109. DOI: 10.1186/s12884-022-04436-2.
12. Zong X., et al. Maternal obesity and risk of placental abruption: a systematic review and meta-analysis // PLoS One. – 2021. – Vol. 16, №9. – e0257243. DOI: 10.1371/journal.pone.0257243.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ТИМЬЯНА В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Негмаджанов Б.Б., Раббимова Г.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет

XULOSA

*Qaytalanuvchi vulvovaginal infeksiyalarni kompleks davolashda timyan (*Thymus vulgaris*) efir moyining samaradorligi o'rganildi. Umumiy 52 nafar 18–45 yoshli bemor kuzatildi. Asosiy guruh (n=26) standart davolash bilan birga timyan moyi aplikatsiyalarini oldi, nazorat guruhi (n=26) esa faqat standart terapiyani qabul qildi. 10-kuni simptomlar asosiy guruhda 84,6–88,5% bemorlarda, nazorat guruhida esa 61,5–65,4% da bartaraf etildi ($p<0,05$). Bir oy o'tgach, vaginal mikroflora normallasuvi 80,8% ga nisbatan 57,7% da kuzatildi ($p=0,048$). 6 oy ichida qaytalanishla rasosiy guruhda 19,2%, nazorat guruhida esa 42,3% bemorlarda qayd etildi ($p=0,04$). Timyan moyi simptomlar regressini tezlashtiradi, mikrobiotani normallashtiradi va qaytalanish xavfini kamaytiradi.*

Kalit so'zlar: timyan, efir moylari, qaytalanuvchi vulvovaginal infeksiyalar, fitoterapiya.

РВВИ встречаются у 20–30% женщин репродуктивного возраста, у трети из них заболевание носит рецидивирующий характер. Традиционные схемы лечения не всегда эффективны из-за роста резистентности *Candida albicans* и *Gardnerella vaginalis*. Современные исследования подтверждают перспективность использования эфирных масел (Jafri, 2020; Alshaikh, 2021; Tomás, 2023; Ostróžka-Ciešlik, 2025).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность местного применения эфирного масла тимьяна в комплексной терапии рецидивирующих вульвовагинальных инфекций.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 52 пациентки, 18–45 лет, с ≥ 3 эпизодами инфекции за год. Основная группа (n=26): стандартная терапия + аппликации (тампоны, пропитанные раствором масла тимьяна). Контрольная группа (n=26): стандартная терапия. Методика применения масла тимьяна: 2 капли масла (~0,1 мл) разводились в 10 мл оливкового масла, стерильный тампон пропитывался раствором и вводился во влагалище на 2 часа ежедневно, курс 10 дней. Оценивалась эффективность, включая: клинические проявления (зуд, выделения, жжение), микробиология (*Candida spp.*, *Gardnerella vaginalis*), частота рецидивов за 6 месяцев. Статистика: χ^2 , $p<0,05$. Эфирное масло тимьяна использовалось как адаптированная фитотерапевтическая форма. При этом метод выбран в рамках исследовательской гипотезы, стремящейся оценить его потенциал в местной терапии РВВИ.

SUMMARY

*The effectiveness of thyme (*Thymus vulgaris*) essential oil in the complex therapy of recurrent vulvovaginal infections was studied. A total of 52 patients aged 18–45 years were observed. The main group (n=26) received standard treatment combined with applications of thyme oil, while the control group (n=26) received only standard therapy. By day 10, symptoms had resolved in 84.6–88.5% of patients in the main group and in 61.5–65.4% of the control group ($p<0.05$). After one month, normalization of the vaginal microflora was observed in 80.8% versus 57.7% ($p=0.048$), and after six months, recurrences were noted in 19.2% and 42.3% of patients, respectively ($p=0.04$). Thyme oil accelerates symptom regression, normalizes the microbiota, and reduces the risk of recurrence.*

Keywords: thyme, essential oils, recurrent vulvovaginal infections, phytotherapy.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

До лечения у большинства пациенток обеих групп отмечались выраженные выделения: 92,3% в основной и 96,2% в контрольной группе. Различия между ними были статистически недостоверны ($p=0,55$), что указывает на сопоставимость исходного уровня жалоб. На 10-й день терапии частота выделений существенно снизилась в обеих группах, однако более выраженный эффект наблюдался у женщин основной группы: патологические выделения сохранялись у 19,2% против 38,5% в контроле. Несмотря на отсутствие строгой статистической значимости ($p=0,13$), тенденция свидетельствует о большей эффективности комбинированного лечения с маслом тимьяна. Зуд сохранялся только у 15,4% пациенток основной группы и у 38,5% женщин контрольной ($p=0,047$). Это говорит о достоверном снижении интенсивности субъективных жалоб при включении тимьяна. Жжение и боль отмечались у 11,5% женщин в основной группе и у 34,6% в контрольной ($p=0,036$), что также имеет статистическую значимость.

Включение эфирного масла тимьяна в комплексную терапию достоверно ускоряло регресс субъективных симптомов (зуда и жжения/боли) уже к 10-му дню лечения, тогда как различия по патологическим выделениям имели лишь тенденцию к значимости. Это подтверждает выраженный симптоматический эффект фитотерапевтического компонента, усиливающего действие стандартной терапии (табл. 1).

Таблица 1

Динамика симптомов до и после лечения (10-й день терапии)

Симптомы	Этап	Основная группа	Контрольная группа	p
Выделения	До лечения	92,3%	96,2%	0,55
Выделения	10-й день	19,2%	38,5%	0,13
Зуд	10-й день	15,4%	38,5%	0,047
Жжение/боль	10-й день	11,5%	34,6%	0,036

У пациенток основной группы патогенный грибок *Candida spp* сохранялся только в 23,1% случаев, тогда как в контрольной – в 46,2%. Различия статистически значимы ($p=0,05$), что подтверждает антимикотический эффект тимьяна. Элиминация *Gardnerella vaginalis*: в основной группе выздоровление отмечалось у 73,1% женщин, тогда как в контрольной – у 50%. Разница близка к статистической значимости ($p=0,055$), что свидетельствует о положительной тен-

денции. Восстановление нормальной вагинальной микробиоты зарегистрировано у 80,8% пациенток основной группы против 57,7% контрольной ($p=0,048$). Это говорит о том, что масло тимьяна способствует более быстрому восстановлению биоценоза влагалища. Таким образом, эфирное масло тимьяна оказывает наиболее выраженное действие на грибковую флору (*Candida spp.*), но также способствует коррекции бактериального дисбиоза (табл 2).

Таблица 2

Микробиологическая эффективность (через 1 месяц)

Показатель	Основная группа	Контрольная группа	p
Элиминация <i>Candida spp.</i>	76,9%	53,8%	0,05
Элиминация <i>Gardnerella</i>	73,1%	50,0%	0,055
Нормализация микрофлоры	80,8%	57,7%	0,048

Рецидив кандидозной инфекции: в основной группе рецидив зафиксирован у 11,5% женщин, в контрольной – у 26,9%. Разница статистически незначима ($p=0,137$), но наблюдается явная положительная тенденция. Рецидив гарднереллёза выявлен лишь у 3,8% женщин в основной группе против 11,5% в контрольной. Хотя различия не достигли статистической значимости ($p=0,301$), клинически отмечается поло-

жительное влияние тимьяна. Общая частота рецидивов: достоверно ниже у пациенток основной группы (19,2% против 42,3%, $p=0,04$). Это ключевой показатель, подтверждающий профилактический эффект применения масла тимьяна. Полученные данные свидетельствуют, что фитотерапевтический компонент повышает стойкость ремиссии и снижает риск рецидива, особенно при кандидозных формах.

Таблица 3

Рецидивы через 6 месяцев

Тип рецидива	Основная группа	Контрольная группа	p
Кандидоз	11,5%	26,9%	0,137
Гарднереллёз	3,8%	11,5%	0,301
Всего рецидивов	19,2%	42,3%	0,04

Таким образом, эфирное масло тимьяна достоверно ускоряло купирование симптомов и повышало эффективность стандартной терапии. Наибольшая эффективность отмечена против *Candida spp.*, что согласуется с данными Jafri (2020), Alshaikh (2021). Отмечено снижение частоты рецидивов ($p=0,04$), что связано с разрушением биоплёнок (Tomás, 2023; Karpiński, 2023). Использованный подход можно интерпретировать как предпосылку для разработки безопасных и эффективных вагинальных препаратов в виде гелей и гидрогелей.

ВЫВОДЫ

1. Местное применение эфирного масла тимьяна в составе комплексной терапии РВВИ ускоряет купирование симптомов и улучшает микробиологические показатели.

2. Масло тимьяна эффективно снижает риск рецидива в течение 6 месяцев наблюдения. 3. Наибольшая

эффективность отмечена при кандидозных формах инфекции.

3. Методика перспективна для разработки современных лекарственных форм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jafri H., Ahmad I., Althubiani A.S. Thymus vulgaris essential oil and thymol inhibit biofilms and interact synergistically with antifungal drugs against drug-resistant strains of *Candida albicans* and *Candida tropicalis* // Journal de Mycologie Médicale. – 2020. – Vol. 30, №1. – P. 100911.
2. Alshaikh N.A., Abd El-Aziz G.S., Elhady S.S., et al. Antifungal activity of thyme essential oil (TEO) against fluconazole-resistant *C. albicans* isolates // Microorganisms. – 2021. – Vol. 9, №12. – P. 2454.
3. Karpiński T.M. Anti-*Candida* and antibiofilm activity of selected essential oils // Frontiers in Bioscience-

- Landmark. – 2023. – Vol. 28, №2. – P. 1–15.
4. Tomás M., Sousa L.G.V., Oliveira A.S., et al. Vaginal Sheets with Thymbra capitata Essential Oil for the Treatment of Bacterial Vaginosis // Gels. – 2023. – Vol. 9, №4. – P. 293.
5. Ostróžka-Cieślik A., Włodarczyk A., Mertas A., et al. The Potential of Hydrogel Preparations Containing Thyme Essential Oil for the Treatment of Vulvovaginal Candidiasis // Polymers. – 2025. – Vol. 17, №4. – P. 470.

УДК: 618.17 - 089.88 : 714.3

ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАЦЕНТЫ И ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК У РОЖЕНИЦ С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ

Нигматова Г.М.

Ташкентский государственный медицинский университет

ХУЛОСА

Муддатидан олдин қозаноқ парда ёрилишининг бир механизми қозаноқ пардада коллаген тузилиши ва гликозаминогликанлар таркиби ўзгариши бўлиб ҳисобланади, яллиғланиш-инфекцион жараёнларнинг мавжудлиги эркин радикаллар оксидланиш жараёнларнинг фаоллашишига олиб келади, қозаноқ пардада ва йўлдоида деструктив жараёнларни кучайтириб, ҳомиладорлик тўхташига олиб келади.

Калим сўзлар: ҳомиладор аёллар, туғиш, плацента, биохимия.

Проблема охраны здоровья матери и ребенка рассматривается как важнейшая составная часть здравоохранения, имеющая первостепенное значение для формирования здорового поколения людей с самого раннего периода их жизни. Среди важнейших проблем практического акушерства одно из первых мест занимает невынашивание беременности [4]. Невынашивание беременности является актуальной медицинской и социальной проблемой, и ее частота, по данным Всемирной организации здравоохранения, на протяжении нескольких лет составляет 20% от всех желанных беременностей (15% – самопроизвольные выкидыши и 5% – преждевременные роды) и не имеет тенденции к снижению, несмотря на многочисленные и эффективные методы диагностики и лечения, разработанные в последние годы. Частота этой патологии колеблется в пределах 10–25% и служит причиной высокой перинатальной заболеваемости и смертности. Уровень перинатальной смертности является индикатором здоровья матери и качества услуг в области охраны [1,3].

Ранние потери беременности (до 12 недель) составляют практически 85% от всех потерь и являются инструментом естественного отбора. До 60–80% ранних выкидышей обусловлены хромосомными аномалиями зародыша, что типично в основном для спорадических прерываний, связанных также с целым рядом социально-биологических (курение,

SUMMARY

One of the causes of prematurely rupture of fetal membranes, are changes of collagen structure and amount of glycosaminoglycans in fetal membranes. Simultaneously existence of inflammatory-infectious processes provides activation of pre-inflammation as well as free radical oxidation. Thereby destruction of fetal membranes and placenta occurs, which encourages fetus wastage.

Keywords: pregnant women, childbirth, placenta, biochemistry.

употребление алкоголя, наркотиков, вредные производственные факторы, воздействие радиации и т. д.) и медицинских факторов (предшествующие искусственные аборт, острые инфекционные заболевания и т. д.) [2].

В последнее десятилетие на фоне ухудшения экологической ситуации в стране и в мире, урбанизации, увеличения числа иммунодефицитных состояний и стрессов в генезе невынашивания все большее значение приобретают бактериальные и вирусные инфекции и связанные с персистенцией возбудителя осложнения в основных системах организма.

Этиологические факторы и патогенетические механизмы невынашивания беременности видоизменяются в соответствии с изменениями окружающей среды и условий существования человека.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить роль некоторых биохимических параметров плодных оболочек и плаценты в развитии невынашивания беременности инфекционного генеза.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследована 121 беременная с привычным невынашиванием и преждевременными родами сроком от 18 до 34 недель и 20 женщин с физиологически протекающей беременностью, прерванной по социальным показаниям. Сбор материала произведен во время прерывания беременности. Критериями отбора пациенток в настоящее исследование явились на-

личие в анамнезе 2 и более самопроизвольных прерываний беременности на фоне инфекции.

В плодных оболочках и гомогенате плаценты определяли содержание общего белка биуретовым методом, уровень олигопептидов по методу Н.И. Габриэлян и соавт., содержание гексоз и гексозаминов, количество связанного и свободного оксипролина по методу П.Н. Шараева и содержание малонового диальдегида (МДА) по методу Л.И. Андреева и соавт. (1989) [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ некоторых биохимических показателей плодных оболочек у беременных с привычным невынашиванием показал статистически значимое увеличение уровня МДА в 3,07; 2,93 и 3,02 раза относительно значений группы женщин с физиологическим течением беременности, соответственно у женщин с ранним и поздним выкидышем, а также преждевременными родами (табл.1). Причем, нами не выявлено существенных различий в уровне МДА в зависимости от срока гестации.

Таблица 1

Некоторые показатели плодных оболочек у беременных с привычным невынашиванием

Показатели	Контрольная, n=20	Ранний выкидыш, n=38	Поздний выкидыш, n=32	Преждевременные роды, n=51
МДА, нмоль/мг белка	0,043±0,004	0,132±0,014*	0,126±0,007*	0,130±0,012*
Оксипролин свободный, мкмоль/мг белка	0,074±0,006	0,202±0,019*	0,136±0,015*	0,138±0,013*
Оксипролин связанный, мкмоль/мг белка	0,473±0,035	0,179±0,016*	0,234±0,021*	0,238±0,020*
Г-ГАГ, мкмоль/мг белка	0,177±0,022	0,108±0,006*	0,114±0,015*	0,121±0,014*

Примечание: * - различия между показателями женщин с физиологическим течением беременности и невынашиванием (P<0,001).

Исследование уровня свободного оксипролина в плодных оболочках беременных с привычным невынашиванием показало резкое его увеличение у беременных с ранними выкидышами. Изучаемый показатель статистически значимо возрастал в 2,73 раза (P<0,001) относительно значений рожениц с физиологическим течением беременности. В то же время у беременных с поздними выкидышами и преждевременными родами уровень свободного оксипролина превышал нормативные значения лишь в 1,84 и 1,86 раза (P<0,01) соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о повышенной деградации структур коллагена и вымывание его в биосреды, в частности в амниотическую жидкость.

Подтверждением этому является снижение уровня связанного оксипролина в плодных оболочках у беременных с привычным невынашиванием. Так, значения связанного оксипролина у беременных с ранними выкидышами составили 0,179±0,016 мкмоль/мг белка, что в 2,64 (P<0,001) раза ниже, чем в плодных оболочках женщин с физиологическими родами. В то же время в группе женщин с поздними выкидышами и преждевременными родами содержание связанного оксипролина в плодных оболочках в 1,31 и 1,33 раза было выше, чем у беременных с ранними выкидышами. Однако, несмотря на это, его значения сохранялись достоверно ниже нормативных значений в 2,02 и 2 раза, что совпадало с высокими значениями свободного оксипролина в плодных оболочках.

Содержание гексоз гликозаминогликанов (Г-ГАГ) в плодных оболочках также достоверно снижалось, более выражено у беременных с ранними выкидышами. Так, содержание гексоз в гликозаминогликанах было в 1,64; 1,55 и 1,46 раза ниже, чем у беременных

с физиологическими родами.

Полученные нами результаты свидетельствуют о значительном повреждении коллагеновых структур плодных оболочек. Значительное увеличение содержания свободного оксипролина на фоне уменьшения его связанной формы и уровня гексоз в гликозаминогликанах свидетельствует о нарушении компонентов межклеточного матрикса.

Следует отметить, что мембранные гликопротеиды обеспечивают межклеточные контакты и влияют на дифференцировку клеток. Можно предположить, что изменение основных компонентов межклеточного матрикса, более выраженные у беременных с ранними выкидышами, нарушают дифференцировку клеток плодных оболочек и их взаимодействие между собой, способствуя образованию межклеточных пор и снижению эластичности соединительнотканых элементов. На фоне этого резкое снижение уровня связанного оксипролина в структуре коллагена снижает устойчивость тканей к создаваемому давлению и приводит к их разрыву.

Вместе с тем можно предположить, что такие же изменения могут наблюдаться и в плаценте, так как она является одним из основных компонентов ФПС. В связи с этим нами были обследованы плаценты беременных с ранними и поздними выкидышами, и преждевременными родами. Проведенные в этом плане исследования показали существенные изменения изучаемых показателей (табл. 2).

Так, содержание МДА в гомогенате плаценты с ранними и поздними выкидышами, и преждевременными родами статистически значимо возрастало в 2,46; 2,21 и 2,85 раза соответственно, относительно значений беременных с физиологическими ро-

дами. Причем, наибольшие изменения нами были отмечены у беременных с ранними выкидышами и преждевременными родами. Если активизация ПОЛ у беременных с ранними выкидышами в основном была обусловлена генетическими и гормональными факторами, при преждевременных родах – наличием воспалительно-дистрофических изменений и частыми угрозами выкидыша. Это приводило к образова-

ние инфарктных зон, образованию петрификатов и склеротических изменений в плаценте.

О наличии склеротических изменений в плаценте свидетельствуют и высокие значения свободного оксипролина, выраженность которых зависела от срока гестации. Так, данный показатель статистически значимо возрастал в 1,78; 2,14 и 2,29 раза соответственно у беременных с ранними и поздними выкидышами, и преждевременными родами.

Таблица 2

Некоторые показатели плаценты у беременных с привычным невынашиванием

Показатели	Контрольная, n=20	Ранний выкидыш, n=38	Поздний выкидыш, n=32	Преждевременные роды, n=51
МДА, нмоль/мг белка	0,110±0,007	0,271±0,012*	0,243±0,018*	0,314±0,027*
Оксипролин свободный, мкмоль/мг белка	0,143±0,011	0,255±0,029*	0,306±0,024*	0,328±0,034*
Оксипролин связанный, мкмоль/мг белка	0,737±0,054	0,277±0,018*	0,346±0,022*	0,371±0,027*
Г-ГАГ, мкмоль/мг белка	0,202±0,023	0,084±0,007*	0,109±0,017*	0,128±0,011*

Примечание: * - различия между показателями женщин с физиологическим течением беременности и невынашиванием (P<0,001).

В то же время уровень связанного оксипролина в плаценте достоверно снижался в 2,66; 2,13 и 2 раза, соответственно. Значительное снижение связанного оксипролина в гомогенате плаценты свидетельствует о резком снижении эластичности коллагеновых структур не только самой плаценты, но и эндотелия кровеносных сосудов, способствуя формированию очаговых микротромбозов и инфарктов в плаценте. Причем, в большей степени это проявлялось у беременных с преждевременными родами, вследствие частых угроз прерывания беременности.

Вместе с тем нами выявлено снижение уровня Г-ГАГ, особенно у беременных с ранними выкидышами. Так, его значения были достоверно ниже в 2,4; 1,85 и 1,58 раза соответственно у беременных с ранними и поздними выкидышами, и преждевременными родами. Учитывая, что они имеют сетчатую структуру и занимают большое пространство, гликозаминогликаны способны удерживать воду и выполняют роль молекулярного сита в межклеточном матриксе, препятствуя прохождению внутрь клетки крупных катионов. Однако существенное снижение их структурных компонентов может приводить к снижению способности удерживания воды и катионов, спокойному проникновению их в клетки и, тем самым, развитию отеков, снижению эластичности и упругости тканей к давлению.

Таким образом, одним из механизмов преждевременного разрыва околоплодных оболочек является изменение структуры коллагена и гликозаминогликанов в плодных оболочках. С другой стороны, наличие воспалительно-инфекционных процессов, обуславливая активизацию провоспалительных процессов и процессов свободно-радикального окисления, усиливают деструктивные процессы в плодных оболочках и плаценте. В совокупности они приводят к форми-

рованию структурных изменений в ФПС и приводят к прерыванию беременности.

ВЫВОДЫ

- Одним из механизмов преждевременного разрыва околоплодных оболочек является изменение структуры коллагена и содержания гликозаминогликанов в плодных оболочках, а наличие воспалительно-инфекционных процессов обуславливает активизацию провоспалительных процессов и процессов свободно-радикального окисления, усиливая деструктивные процессы в плодных оболочках и плаценте.

- В плаценте беременных с привычным невынашиванием беременности на фоне инфекции активизируются процессы перекисного окисления липидов, снижается эластичность коллагеновых волокон и содержание гексоз гликозаминогликанов, что в совокупности приводит к формированию структурных изменений плаценты и способствует прерыванию беременности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Владимирова Н. Ю., Ноговицина Е. Б., Сятковская А. Л. Эпидемиологические аспекты репродуктивных потерь // Проблемы репродукции. – М., 2011. – №3. – С. 54-57.
2. Власова Т. А., Гуменюк Е. Г., Вальдман С. Ф. Инфекционные факторы как причина преждевременных родов // Вестник последипломного мед. образования. – 2014. – №1. – С. 119.
3. Насирова Ф.Ж., Аюпова Ф.М., Аезова У.А. Особенности свободно-радикального окисления в системе мать-плацента-плод у беременных с различными инфекциями и преждевременными родами //Мед. журнал Узбекистана. – Ташкент. – 2008. – №2. – С.16-19.

4. Сидельникова В. М. Невынашивание беременнос- ти / В. М. Сидельникова, Г. Т. Сухих. – М., 2010.
5. Шараева Н.П. Метод определения свободного и связанного оксипролина в сыворотке крови // Лабораторное дело. – 1981. – №5. – С.283-28.

UDK: 618.2-07:613.25

SEMIZLIK FONIDA HOMILADORLIKNING KECHISHI VA PERINATAL XAVFLAR: KLINIK TAHLIL

Numonjonova S.K., Nabiyeva D.Yu.
Andijon davlat tibbiyot instituti

РЕЗЮМЕ

Целью исследования было клиническое и статистическое изучение течения беременности, родов и частоты перинатальных осложнений у женщин с ожирением. В 2022–2024 гг. в родовспомогательных учреждениях Андижанской области наблюдались 80 беременных; у пациенток с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 30 достоверно чаще регистрировались гестационная гипертензия, преэклампсия, гестационный диабет, макросомия и необходимость неонатальной реанимации.

Результаты сопоставлены с данными международных и российских исследований и демонстрируют высокий уровень согласованности. На основе полученных данных разработаны индивидуализированные акушерские подходы с учетом мультидисциплинарного контроля и риск-ориентированного планирования родоразрешения, направленные на снижение перинатальных рисков и улучшение здоровья матери и ребенка.

Ключевые слова: ожирение, индекс массы тела, беременность, перинатальные риски, преэклампсия, макросомия, кесарево сечение, клинический анализ, акушерская практика, мультидисциплинарный подход.

XXI asrda global miqyosida sog'liqni saqlash sohasidagi eng dolzarb muammolardan biri – ortiqcha vazn va semizlikning jadal sur'atlarda keng tarqalishidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil holatiga ko'ra, dunyo bo'yicha 15 yoshdan katta har uchinchi ayol ortiqcha vazn yoki semizlikdan aziyat chekmoqda. Ayniqsa, reproduktiv yoshdagi ayollar orasida bu ko'rsatkich xavotirli darajada yuqori – 40% dan ortiq (WHO, 2023). O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi 2022-yilgi tibbiy- demografik kuzatuv natijalariga ko'ra, mamlakatda har beshinchi homilador ayolda tana vazni indeksi (TVI) me'yordan yuqori ekanligi aniqlangan. Semizlikning homiladorlikka ta'siri ko'pqirrali bo'lib, u ona va bola salomatligiga jiddiy xavf tug'diruvchi omil sifatida tan olinmoqda. Akusherlik va perinatal amaliyotda semizlik bilan og'rigan ayollarda homiladorlik murakkab kechadi: gestatsion gipertenziya, gestatsion diabet, preeklampsiya,

SUMMARY

The aim of the study was to perform a clinical and statistical analysis of the course of pregnancy, labor, and the incidence of perinatal complications in women with obesity. Between 2022 and 2024, 80 pregnant women were observed in maternity hospitals of the Andijan region. In patients with a body mass index (BMI) ≥ 30 , gestational hypertension, preeclampsia, gestational diabetes, macrosomia, and the need for neonatal resuscitation were recorded significantly more often.

The results were compared with data from international and Russian studies and demonstrated a high level of consistency. Based on the obtained findings, individualized obstetric approaches were developed, taking into account multidisciplinary monitoring and risk-oriented delivery planning, aimed at reducing perinatal risks and improving maternal and neonatal health.

Keywords: obesity, body mass index, pregnancy, perinatal risks, preeclampsia, macrosomia, cesarean section, clinical analysis, obstetric practice, multidisciplinary approach.

infeksion asoratlar, tug'ruq paytida qon ketishlar, shuningdek, kesar kesishlar sonining ortishi kuzatiladi. Shuningdek, bola uchun ham makrosomiya, mehnat faoliyatining buzilishi, bachadonichi o'lim, neonatologik reanimatsiya ehtiyoji ortadi. Dunyo tajribasida, semizlik fonida homiladorlikning yuritilishi bo'yicha ko'plab klinik protokollar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, bu soha hamon ilmiy va amaliy takomillashtirishni talab etuvchi yo'nalish sifatida qolmoqda. Ayniqsa, homiladorlikdan oldingi tayyorgarlik (predgavidar nazorat), homiladorlik davridagi nazorat choralari va tug'ruqni boshqarish strategiyalari – integrative va individual yondashuvlar asosida yangicha tahlil etilishi lozim.

TADQIQOT MAQSADI

Mazkur tadqiqot ishida semizlik fonida kechayotgan homiladorlik holatlari va perinatal xavflar klinik misollar, statistic tahlil va amaliy kuzatuvlar asosida chuqur o'rganiladi. Shu orqali semiz homilador ayollarda

perinatal xavflarni oldini olish, aniqlash va kamaytirish bo'yicha samarali tavsiyalar ishlab chiqish maqsad qilib olingan.

TADDIQOT USULLARI

Tadqiqot davomida retrospektiv tahlil, klinik kuzatuv, statistic hisoblash va taqqoslash usullari qo'llanildi.

Semizlik mavjud homilador ayollarda homiladorlikning kechishi va perinatal asoratlar tez-tezligi tibbiy hujjatlar asosida o'rganildi.

1-jadval

Tadqiqot metodologik mexanizmi

Bosqich	Maqsad	Asosiy metodlar	Kutilgannatija
1. Predgravidar tayyorgarlik	TVI ≥ 30 ayollarni erta aniqlash va optimallashtirish	Antropometriya, laborator tekshiruv (HbA1c, lipid profili), BP monitoring	Metabolik xavflarni minimallashtirish
2. Klinik kuzatuv (I–III trim.)	Homiladorlik kechishini real vaqtda baholash	Dinamik UTT, OGTT, dopplerometriya, kardiokografiya	Preeklampsiya va GD'ni erta aniqlash
3. Ma'lumotlarni statistik tahlil	Asoratlar chastotasini baholash	χ^2 testi, t-test, OR/CI hisoblash	Xavf omillarini statistic ishonch bilan ko'rsatish
4. Klinik tavsiyalarni ishlab chiqish	Amaliy protocol va algoritim taklif qilish	Konsensus, FIGO va JSST yo'riqnomalari bilan muvofiqlashtirish	Lokal protokol, multidisiplinar brigade modeli

ADABIYOTLAR TAHLILI

Semizlik – bu organizmda ortiqcha yog' to'planishi bilan tavsiflanadigan surunkali metabolic buzilish bo'lib, JSST tomonidan tana vazni indeksi (TVI ≥ 30 kg/m²) orqali aniqlanadi. Oxirgi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlarda ortiqcha vazn va semizlik homiladorlik va tug'ruq jarayonlariga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

So'nggi o'n yilliklarda ortiqcha vazn va semizlik global miqyosdagi jiddiy tibbiy- ijtimoiy muammolardan biriga aylangan bo'lib, u nafaqat surunkali kasalliklar xavfini oshiradi, balki reproduktiv salomatlik, xususan homiladorlikning kechishi va perinatal natijalarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining (JSST, 2023) rasmiy hisobotlarida qayd etilishicha, dunyo bo'yicha har uchinchi reproduktiv yoshdagi ayol ortiqcha vazn yoki semizlikdan aziyat chekadi, bu esa homiladorlik jarayonida akusherlik asoratlari sonini ko'payishiga sabab bo'lmoqda.

Akusherlik va perinatal tibbiyotga oid yetakchi tadqiqotlarda semizlikning homiladorlik kechishiga ta'siri ko'plab klinik parametrlar bilan bog'liq holda o'rganilgan. Xususan, Cedergren (2004) tomonidan olib borilgan tadqiqotda tana vazni indeksi (TVI) ≥ 30 bo'lgan ayollar orasida preeklampsiya, gestatsion diabet, tug'ruqdagi qon ketishlar, infeksiyon asoratlar va tug'ruqning travmatik kechishi holatlari yuqori ekanligi aniqlangan. Bu holat Weiss va hammualliflarining (2004) tadqiqotlarida ham tasdiqlanib, ortiqcha vaznga ega bo'lgan homilador ayollarda tug'ruq davomiyligi uzayishi, sezaryen kesishiga bo'lgan ehtiyojning ortishi, shuningdek neonatal reanimatsiya ehtimolining yuqoriligi e'tirof etilgan. Catalano va Ehrenberg (2006) esa semizlikning platsentar qon aylanishiga va fetoplasentar kompleks faoliyatiga ta'sirini o'rganib, semizlik homila makrosomiyasi, congenital anomalialar va homilaning intrauterine rivojlanishidagi buzilishlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligini ko'rsatadi. Shuningdek, hozirgi davrda individualizatsiyalangan akusherlik yondashuvlari, multidisiplinar kuzatuv va predgavidar

tayyorgarlik choralarining kiritilishi perinatal xavflarni kamaytirishda muhim omil sifatida qaralmoqda.

Mazkur masala Rossiya ilmiy maktabida ham chuqur o'rganilmoqda. Jumladan, Savelieva G.M. va Radzinskiy V.E. (2019) o'zlarining fundamental ishlarida semizlik fonida homiladorlikning immunologic va endokrin mexanizmlar asosida og'ir kechishi, ko'plab asoratli tug'ruqlar bilan yakunlanishini ko'rsatadilar. Ularning tadqiqotlarida ayniqsa "metabolic sindrom" tushunchasi asosida yuritilayotgan homiladorlikka klinik algoritmlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular multidisiplinar yondashuvga asoslanadi. Bundan tashqari, Artymuk N.A. (2020) tomonidan olib borilgan klinik kuzatuvlarda Rossiya Federatsiyasi hududida TVI ≥ 30 bo'lgan homilador ayollarda preeklampsiya holatlari 2,8 baravar, sezaryen kesish ehtimoli esa 1,7 baravar yuqori ekani ta'kidlangan. Shuningdek, u perinatal o'lim holatlarining ortishida semizlik asosiy xavf omili sifatida baholanishi kerakligini asoslaydi. Gaiduk D.A. (2021) o'z izlanishlarida semiz ayollar orasida tug'ruqning kechikishi, fetoplasentar yetishmovchilik va gipotrofik chaqaloq tug'ilishi holatlari ko'p uchrashini qayd etgan.

O'zbekiston sharoitida olib borilgan tibbiy tadqiqotlarda ham ushbu muammo o'z ifodasini topmoqda. Toshkent tibbiyot akademiyasi va Respublika akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy markazining 2021–2023 yillardagi kuzatuv ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, TVI 30 dan yuqori bo'lgan homilador ayollar orasida gestatsion gipertenziya, sepsis va gipotrofik chaqaloq tug'ilishi kabi asoratlar ancha yuqori ekani aniqlangan (To'xtayev, 2022). Yirik xalqaro tashkilotlar, jumladan, Xalqaro akusherlik va ginekologiya federatsiyasi (FIGO), semizlik mavjud ayollar uchun homiladorlikni rejalashtirish va yuritish bo'yicha maxsus klinik protokollar ishlab chiqqan bo'lib, ularda parhezterapiya, glyukozaning doimiy monitoringi, arterial bosimni nazorat qilish, psixologik qo'llab-quvvatlash va tug'ruqqa tayyorlashga doir choralar alohida o'rin tutadi. Xulosa qilib aytganda, semizlik mavjud bo'lgan ayollarda homiladorlik va tug'ruqni olib boorish

murakkab klinik yondashuvni talab etadi. Zamonaviy adabiyotlar ushbu holatda differensial nazorat, klinik protokollarga asoslangan individual tibbiy yondashuv va tug‘ruqni optimal rejalashtirish orqali perinatal xavflarni kamaytirish mumkinligini ko‘rsatmoqda.

2 jadval

Semizlik fonida homiladorlikning kechishi va perinatal xavflarni tushuntiruvchi kompleks sxema

№	Patofiziologik-klinik blok	Tashkiliy va laborator ko‘rsatkichlar	Perinatal oqibatlar (ona + bola)	Tavsiya etiladigan boshqaruv strategiyasi
1	Metabolik disbalans • Insulin rezistentligi • Yalang‘och giperinsulinemiya	- OGTT ≥ 7,8 mmol/l (2 soat) - HbA1c > 5,9 %	► Gestatsion diabet ► Makrosomiya (≥ 4000 g) ► Yangi tug‘ilgan chaqaloqdagi poglikemiya	- Predgavidar vaznni 5–10% ga kamaytirish - Dietoterapiya + jismoniy faollik (≥150 daq/hafta) - Glikemiyaning haftalik nazorat
2	Giperdinamik qon aylanish • Plazma hajmining ortishi • Endotelial disfunksiya	- SBP ≥ 140 mm rt.st. - Proteinuriya ≥ 0,3 g/24 soat	► Gestatsion gipertenziya ► Preeklampsiya/ eklampsiya ► Platsentar yetishmovchilik	- Arterial bosimni o‘n kunda 1 marta - ASPIRIN 75 mg (< 16 hafta) ¹ - Dopplerometriya (28-, 32-, 36-haftalarda)
3	Yallig‘lanish va oksidativ stress	- CRP > 10 mg/L - IL-6 / TNF- α yuqori	► Erta suv kelish ► Chanoq-bachadon infeksiyalari	- Omega-3 k-tlari, antioksidantlar - Profilaktik antibiotik («yuqori xavf»)
4	Ko‘p tana massasiv amexanik yuklama	- BISHOP < 5 (muddat yetganda) - Mehnat faoliyat izaif	► Tug‘ruqning uzayishi ► O‘tkir feta distressi ► Sezaryen ko‘rsatkichi ↑	- Induksiya mezonlarini aniq belgilash (TVI + BISHOP) - Anesteziolog bilan oldindan maslahat
5	Fetoplasentar qon aylanish buzilishi	- PI MCA > 1,5 MoM - AFI < 5 cm (oligo)	► IUGR yoki, aksincha, makrosomiya ► Neonatal asfiksiya	- Har 4 haftada UTT biometric nazorat - 34-haftadan boshlab NST/CTG har 7-10 kun
6	Neonatal oqibatlar	- APGAR ≤ 7 (1-daq.) - pH kordon < 7,2	► Nafas yetishmovchiligi ► Reanimatsiyaga ehtiyoj 3 × ↑	- Tug‘ruq zalida neonatolog guruhi tayyor - Ko‘pfunksiyali reanimatsiya uskunalari
7	Postpartum davr	- Qon ketish ≥ 1000 ml - TVT / PE xavfi ↑	► Atoniyali qon ketish ► Tromboemboliya	- Uterotonik profilaktika - LMWH 6 hafta (xavf ≥ 4 ball)

FIGO va NICE (2022) tavsiyalariga ko‘ra TVI ≥ 35 kg/m² yoki preeklampsiya tarixi bo‘lgan bemorlarga 16-haftagacha Aspirin 75–150 mg tavsiya etiladi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot Andijon viloyat tug‘ruq kompleksining akusherlik bo‘limida 2022–2024 yillar davomida olib borilgan klinik kuzatuv materiallari asosida tashkil etildi. Umumiy hisobda 80 nafar homilador ayol kuzatildi, ulardan 40 nafari tana vazni indeksi (TVI) ≥ 30 bo‘lgan semiz ayollar (eksperimental guruh), qolgan 40 nafari esa TVI me‘yorda bo‘lgan ayollar (nazorat guruhi) sifatida tanlab olindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, semizlik mavjud ayollar orasida gestatsion gipertenziya 30% holatda qayd etilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich nazorat guruhida atigi 7,5% ni tashkil etdi. Xususan, preeklampsiya holatlari semiz ayollar orasida 22,5% holatda kuzatildi, bu esa nazorat guruhidagi 5% bilan solishtirganda 4,5 baravar yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Bu ko‘rsatkichlar semizlikning qontomir tonusi, gormonal o‘zgarishlar va immunjavob tizimidagi buzilishlar bilan bog‘liq ekanini tasdiqlaydi.

3- Jadval

Klinikva perinatal natijalar (n = 80)

Ko‘rsatkich	Eksperimental guruh (TVI ≥ 30, n = 40)	Nazorat guruh (TVI < 25, n = 40)	p - qiymat
Gestatsion gipertenziya	12 (30 %)	3 (7,5 %)	0,004
Preeklampsiya	9 (22,5 %)	2 (5 %)	0,018
Gestatsion diabet	11 (27,5 %)	2 (5 %)	0,006
Sezaryen kesish	26 (65 %)	13 (32,5 %)	0,003
Makrosomiya ≥ 4000 g	10 (25 %)	3 (7,5 %)	0,037
APGAR ≤ 7 (1-daq.)	14 (35 %)	6 (15 %)	0,046
Neonatal reanimatsiya	6 (15 %)	2 (5 %)	0,121*

* p > 0,05 – farq statistik ahamiyatga ega emas, ammo klinik jihatdan e‘tiborga molik.

Gestatsion diabet holatlari semiz ayollar orasida 27,5% ni tashkil etdi (11 nafar), nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 5% dan oshmadi (2 nafar). Bu holat semizlik fonida insulin rezistentligi va gormonal disbalansning keskinlashuvi bilan izohlanadi, bu esa homiladorlikning endokrin kechishini og'irlashtiradi. Gaiduk D.A. (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham semiz ayollar orasida gestatsion diabet uchrash chastotasi sezilarli yuqori ekanini tasdiqlaydi. Tug'ruq usuli tahlil qilinganda, semiz ayollar guruhida sezaryen kesish ko'rsatkichi 65% bo'lib, nazorat guruhida esa 32,5% ni tashkil etdi. Ushbu yuqori ko'rsatkich tug'ruqning fiziologik kechishini qiyinlashtiruvchi omillar – mehnat faoliyatining zaifligi, makrosomiya va proporsional buzilishlar bilan bog'liq. Neonatal ko'rsatkichlar tahlili shuni ko'rsatadiki, semizlik mavjud onalardan tug'ilgan chaqaloqlarda APGAR shkalasi bo'yicha 1-daqqada 6–7 ball to'plaganlar soni 35% ni tashkil etgan, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 15% bo'lgan. Neonatal reanimatsiyaga yo'naltirilgan chaqaloqlar soni semiz onalar guruhida 6 nafar (15%), nazorat guruhida esa atigi 2 nafar (5%) bo'lgan. Ushbu natijalar xalqaro tibbiy adabiyotlarda ko'rsatilgan tendensiyalar bilan hamohangdir. Xususan, Catalano va Ehrenberg (2006) semizlikning homiladorlik va perinatal asoratlar xavfini oshirishdagi rolini chuqur asoslab bergan. Rossiyalik olimlar – Savelieva G.M. va Artymuk N.A. tadqiqotlarida ham TVI ≥ 30 bo'lgan ayollarda preeklampsiya, sezaryen, neonatal asoratlar chastotasi yuqori ekanligi qayd etilgan.

Perinatal natijalar va chaqaloq holatining baholanishi

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, semizlik mavjud onalardan tug'ilgan chaqaloqlar orasida makrosomiya (≥ 4000 g) bilan tug'ilish holatlari 26% ni tashkil etdi (10 nafar chaqaloq), nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich atigi 7,5% (3 nafar) bo'ldi. Bu esa semizlik homilaning intrauterine rivojlanishida ortiqcha o'sish sindromi – ya'ni hyperglycemia- induced macrosomia xavfini keskin oshirishi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, semiz ayollardan tug'ilgan chaqaloqlarda APGAR shkalasi bo'yicha 1-daqqada 6–7 ballik baho 14 ta holatda (35%) kuzatildi, bu nazorat guruhida 6 ta holatga (15%) teng bo'lib, chaqaloqning perinatal holati biroz sust kechganini ko'rsatadi. 5-daqqada 8–9 ballga chiqish kuzatilgan bo'lsa-da, neonatal moslashuv davomiyligi sezilarli darajada cho'zilgan. Shuningdek, neonatal reanimatsiyaga yo'naltirish zarurati semiz onalar guruhida 6 nafar (15%) chaqaloqda kuzatilgan, bu ko'rsatkich nazorat guruhida 2 nafar (5%) ni tashkiletdi. Bu farq tug'ruqdagi mexanik asoratlar, yo'ldosh yetishmovchiligi va nafas olish sindromlari bilan bog'liq holatlarni ko'rsatadi.

Natijalarning xorijiy tadqiqotlar bilan taqqoslanishi.

Olingan perinatal natijalar ilgari o'tkazilgan xalqaro va Rossiya tadqiqotlari bilan muvofiqlik kasb etadi. Xususan, Catalano va Ehrenberg (2006) o'z izlanishlarida semizlik mavjud bo'lgan homilador ayollar guruhida makrosomiya holatlari 22–30% oralig'ida bo'lishini

ta'kidlaydi, bu bizning 26% lik ko'rsatkich bilan to'liq mos tushadi. Shuningdek, ular APGAR ballarining past bo'lishi va neonatal asoratlar xavfi insulin rezistentlik, platsentar qon aylanishining buzilishi va surunkali past darajadagi yallig'lanish bilan bog'liq ekanligini asoslab bergan.

Rossiyalik olimlar – Artymuk N.A. (2020) va Savelieva G.M. (2019) tadqiqotlarida ham shunga o'xshash statistikalar keltirilgan. Ularning izlanishlarida TVI ≥ 30 bo'lgan homilador ayollardan tug'ilgan chaqaloqlarda makrosomiya chastotasi 25–28% ni tashkil etgan bo'lib, perinatal o'lim va neonatal reanimatsiyaga yo'naltirish ko'rsatkichlari sezilarli darajada yuqori qayd etilgan. Shuningdek, Weiss et al. (2004) tomonidan olib borilgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yirik epidemiologic kuzatuvda semiz ayollar guruhida APGAR ≤ 7 bo'lgan chaqaloqlar soni nazorat guruhiga nisbatan ikki baravar ko'p ekanligi aniqlangan. Bu esa bizning natijalar bilan uyg'unlikda bo'lib, semizlik va perinatal xavf o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yana bir bor tasdiqlaydi.

Klinik-amaliy tavsiyalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, tana vazni indeksi (TVI) ≥ 30 bo'lgan homilador ayollarda homiladorlikning kechishi va tug'ruq jarayoni boshqa ayollarga nisbatan ancha murakkab bo'lib, jiddiy perinatal xavflar bilan kechadi. Shuning uchun semiz homilador ayollarga nisbatan akusherlik- amaliyotda individualizatsiyalangan va ilmiy asoslangan yondashuv zarur.

Birinchidan, predgavidar tayyorgarlik bosqichida semiz ayollarni ro'yxatga olish va ularning sog'lig'ini baholash muhimdir. Bu bosqichda gormonal fon, glyukoza darajasi, arterial bosim, yurak-qontomir tizimi va endokrin holatni to'liq baholash zarur. Ayniqsa, gestatsion diabet va gestatsion gipertenziyani erta aniqlash, ularning oldini olish va nazorat qilish bo'yicha kompleks choralar ishlab chiqilishi kerak.

Ikkinchidan, homiladorlikning erta davridan boshlab semiz ayollar uchun maxsus parhezterapiya, jismoniy faollikni individual rejalashtirish, stressni kamaytiruvchi psixologik qo'llab- quvvatlash choralari ko'rish lozim. Bu tavsiyalar JSST va Xalqaro akusherlik- ginekologiya federatsiyasi (FIGO) tomonidan ishlab chiqilgan universal protokollar bilan uyg'unlashtirilishi kerak.

Uchinchidan, homiladorlikning o'rta va kechki trimestrlarida akusherlik nazorati yanada kuchaytirilishi, qand miqdori va arterial bosim monitoring tizimli ravishda olib borilishi, zaruratga ko'ra endokrinolog va terapevt ishtirokida multidisiplinar kuzatuv tashkil qilinishi lozim. Shuningdek, fetal biometric o'lchamlar va platsentar qon aylanishni baholash uchun muntazam ultratovush tekshiruvlari tavsiya etiladi.

To'rtinchidan, tug'ruqni rejalashtirish va yuritish jarayonida semiz homilador ayollarning individual xavf omillariga asoslangan yondashuv qo'llanilishi kerak. Agar homilada makrosomiya, mehnat faoliyatining zaifligi, preeklampsiya yoki boshqa asoratlar ehtimoli mavjud bo'lsa, sezaryen kesish muddatini belgilashda

aniq mezonlarga asoslanish zarur.

Beshinchidan, tugʻruqdan keying davrda onani metabolic kuzatuv ostida saqlash, qon bosimi va glyukoza koʻrsatkichlarini tiklash, emizish bilan bogʻliq ovqatlanish rejimini tuzish tavsiya etiladi. Bu davrda chaqaloqning holatini ham nazorat qilish, neonatologlar bilan birga perinatal parvarish tizimini joriy etish muhimdir. Oʻzbekiston Respublikasi sharoitida bunday yondashuvlarni amaliyotga joriy etish uchun akusherlik xizmatini bosqichma- bosqich modernizatsiya qilish, perinatal xavf guruhiga kiruvchi ayollar uchun maxsus klinik yoʻriqnomalar ishlab chiqish hamda ularni sogʻliqni saqlash tizimi boʻyicha standartlarga kiritish dolzarb hisoblanadi.

XULOSA

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1. Semizlik homiladorlikning patologik kechishiga olib keluvchi asosiy xavf omillaridan biridir.
2. Bunday ayollar uchun predgavidar davrdan boshlab doimiy monitoring, dietoterapiya va endokrin nazorat zarur.
3. Tugʻruqni yuritishda multidisiplinar yondashuv, yaʼni akusher-ginekolog, endokrinolog, terapevt va neonatologiy ishtirokini taʼminlash samarali natijalarga olib keladi.
4. Perinatal xavflarning kamaytirilishi, ayniqsa APGAR past boʻlgan chaqaloqlar sonini qisqartirish, semizlikni nazorat qilish orqali erishiladigan strategic yoʻnalishdir.

ADABIYOTLAR

1. Artymuk, N. A. (2020). Ожирение и акушерские осложнения: проспективное наблюдение 2017–

2019 гг. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 19(3), 152-160.312 с

2. Catalano, P. M., & Ehrenberg, H. M. (2006). The short- and long-term implications of maternal obesity on the mother and her offspring. *BJOG*, 113(10), 1126-1133.2347 pp
3. Cedergren, M. I. (2004). Maternal morbid obesity and the risk of adverse pregnancy outcome. *Obstetrics&Gynecology*, 103(2), 219-224.355
4. FIGO. (2022). FIGO good practice recommendations on obesity in pregnancy (2-nd ed.). International Federation of Gynecology and Obstetrics. <https://www.figo.org/resources/figo-good-practice-recommendations-obesity-pregnancy>
5. Gaiduk, D. A. (2021). Перинатальные исходы у беременных с метаболическим синдромом. *Российский вестник акушера-гинеколога*, 21(1), 41-47.520 b
6. Savelieva, G. M., & Radzinskiy, V. E. (2019). Акушерство: национальное руководство (4-босма). GEOTAR-Media.302 b
7. Toʻxtayev, A. X. (2022). Homilador ayollarda semizlik va tugʻruq asoratlari. *ГТА Илмий Журнали*, 4(2), 45-50.903 b
8. Weiss, J. L., Malone, F. D., et al. (2004). Obesity, obstetric complications, and cesarean delivery rate—A population-based screening study. *American Journal of Obstetrics&Gynecology*, 190(4), 1091-1097.2456b
9. World Health Organization. (2023). Obesity and overweight: Fact sheet №311.
10. Yuldasheva, Z. R. (2023). Oʻzbekistonda homiladorlikda ortiqcha vazn profilaktikasi boʻyicha klinik tavsiyalar. *Tibbiyotda Innovatsiyalar*, 5(1), 71-78.230 b

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД ПРИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Пахомова Ж.Е.¹, Абдуллаева М.Д.²

¹ Ташкентская медицинская академия,

² Самаркандский государственный медицинский университет

XULOSA

Dolzarlighi. Maqolada ayollarning reproduktiv funksiyasini saqlab qolish va gemotransfuziyalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishga qaratilgan akusherlik qon ketishining oldini olishning zamonaviy usullari va ularni davolashning asosiy tamoyillari ko'rib chiqilgan. Mazkur muammoning O'zbekistondagi, jumladan, Samarqand shahridagi dolzarb holati tahlil qilingan. PK butun dunyoda onalar o'limining yetakchi sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Shuning uchun postgemorragik anemiyani davolashning muqobil usullarini izlash muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tug'ruqdan keying qon ketishi, bachadon atoniyasi, KBR, temir preparatlari, qon quyish, TVI, ferritin, zardobli temir, transferrin.

Послеродовое кровотечение остается одной из ведущих причин материнской смертности во всем мире. ВОЗ сообщает, что железодефицитная анемия является распространенным заболеванием среди женщин детородного возраста и встречается у 30–50% из них. [1,3,6]. По данным литературы, около 70% послеродовых кровотечений связаны с атонией матки [2]. Авторы указывают что, наличие анемии после родов способствует увеличению вероятности сепсиса с летальным исходом в 3–4 раза. [3,4,5]. Поэтому поиски альтернативных методов лечения постгеморрагической анемии играет важную и актуальную роль.

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ явилась разработка адекватных, эффективных методов лечения анемии после акушерских кровотечений для снижения посттрансфузионных осложнений и применения препаратов крови в акушерской практике.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под нашим наблюдением находилось 70 родильниц в послеродовом периоде, перенесшие кровопотерю. 1-ю группу составили 40 родильниц, у которых применяли в/в препарат железа; 2-ю группу -30 родильниц, получивших лечение препаратами крови. Возраст родильниц составил $28 \pm 1,3$ лет. Всем пациентам определяли общий анализ крови, коагулограмму, а также ферритин, трансферрин и сывороточное железо в крови методом иммуноферментного анализа (ИФА). Для оценки взаимосвязи между объемом кровопотери и показателями железа применялся корреляционный анализ с вычислением коэффициента корреляции Пирсона (r). Статистическую значимость

SUMMARY

The article discusses modern methods of preventing obstetric hemorrhage and the main principles of their therapy aimed at preserving women's reproductive function and reducing the need for blood transfusions. An analysis of the current state of this problem in Uzbekistan, including the city of Samarkand, has been carried out. Obstetric hemorrhage remains one of the leading causes of maternal mortality worldwide. Therefore, the search for alternative methods for treating post-hemorrhagic anemia plays an important and relevant role.

Keywords: postpartum hemorrhage, uterine atony, blood volume, iron preparations, blood transfusion, BMI, ferritin, serum iron, transferrin.

устанавливали при уровне $p < 0.05$.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование включены 70 родильниц с послеродовым кровотечением. Средний возраст составил $28 \pm 1,3$ лет. Все пациентки были стратифицированы по объему кровопотери, распределены по группам ИМТ, наличию фоновых заболеваний и особенностям акушерского анамнеза. Первородящие - 15 (21,4%) многорожавшие – 55 (78,5%). Наличие предыдущих операций на матке кесарево сечение – 25 (35,7%) Тягощенный акушерский анамнез (угрозы выкидыша, выкидыши, преждевременные роды) – 24 (34,3%) Сопутствующие заболевания: анемия до родов – 65 (92,8%) гипертоническая болезнь / гестационная гипертензия – 18 (26,1%) Хронические воспалительные заболевания органов малого таза – 6 (8,6%).

Отмечено статистически значимое снижение уровня гемоглобина с увеличением кровопотери ($p < 0.01$). Четкая тенденция к снижению количества эритроцитов при нарастании кровопотери. Снижение уровня фибриногена указывает на потребление факторов свертывания в условиях массивной кровопотери. Удлинение АЧТВ особенно выражено в группе с тяжелым кровотечением, что свидетельствует о гипокоагуляции. С обильным послеродовым кровотечением было установлено, что уровень трансферрина повышается по мере увеличения объема кровопотери, что отражает компенсаторную реакцию организма на дефицит железа. При обильном послеродовом кровотечении уровень ферритина значительно снижается, отражая истощение запасов железа в организме.

Пациентки были разделены на три группы:

Показатели	Группа 1 кровопотеря до 1000 мл (n = 40)	Группа 2 кровопотеря 1500 мл (n = 10)	Группа 3 кровопотеря более 1500 мл (n = 20)
Гемоглобин(г/л)	90 ± 8.4	80± 9.2	60 ± 11.6
Эритроциты (×10 ¹² /л):	3.5 ± 0.3	3. 1± 0.4	2.6 ± 0.5
Гематокрит (%):	32.2 ± 2.5	28.4 ± 2.8	26.0 ± 3.1
Фибриноген (г/л):	3.6 ± 0.4	3.2 ± 0.5	2.6 ± 0.6
АЧТВ (сек):	28.4 ± 2.1	30.2 ± 2.8	33.6 ± 3.4
Трансферрин г/л	2.0 ± 2.2	2.8 ± 3.0	3.7 ± 1.2
Ферритин нг/мл	36 ± 3.0	25 ± 2.3	9 ± 14.5



Ферритин: Установлена статистически значимая отрицательная корреляция между объёмом кровопотери и уровнем ферритина (коэффициент корреляции $r = -0.50$, $p = 0.033$). Это свидетельствует о том, что с увеличением кровопотери уровень ферритина достоверно снижается, отражая уменьшение запасов железа в организме. Данный показатель продемонстрировал наибольшую чувствительность к степени кровопотери среди всех исследуемых параметров. **Трансферрин:** С обильным послеродовым кровотечением было установлено, что уровень трансферрина повышается по мере увеличения объёма кровопоте-

ри, что отражает компенсаторную реакцию организма на дефицит железа. Сывороточное железо: показало практически нулевую корреляцию с объёмом кровопотери ($r = -0.03$, $p = 0.91$), что также не позволяет рассматривать данный показатель как надёжный маркер изменений, связанных с потерей крови в послеродовом периоде. Сравнительный анализ показывает, что только ферритин демонстрирует значимую обратную связь с объёмом кровопотери и может служить объективным критерием для оценки выраженности железодефицита и выбора тактики коррекции железосодержащими препаратами.

Параметр	Лечение железом	Переливание крови
Объём кровопотери	до ≤ 1000 мл	>1500 мл и более
Уровень гемоглобина	>80-90 г/л	<65 г/л
Симптомы гиповолемии/гипоксии	Отсутствуют	Присутствуют
Гемодинамика	Стабильная	Нарушена
Время начала лечения	6–24 часа	В течение 2–6 часов

Группа 1: Пациентки, получавшие в/в препараты железа (n = 40)

У данной группы средний объём кровопотери составлял 500–1000 мл. Уровень гемоглобина на 1-е сутки после родов находился в пределах 76- 80г/л. Пациентки не предъявляли выраженных симптомов гиповолемии или гипоксии, отмечалась стабиль-

ная гемодинамика (АД и пульс в пределах нормы). В большинстве случаев применялась внутривенная терапия железом (железа (III) гидроксид сахарозный комплекс), с переходом на пероральный при стабилизации состояния. У всех пациенток наблюдалось восстановление гемоглобина до ≥ 110 г/л в течение 4 недель.

Группа 2: Пациентки, получившие переливание эритроцитарной массы (n = 30)

В этой группе кровопотеря превышала 1500 мл, у 65% пациенток она составила более 1500 мл. Исходный уровень гемоглобина после родов был <65 г/л, у некоторых – менее 60 г/л. Отмечались клинические признаки анемии: слабость, головокружение, тахикардия, снижение АД. В 85% случаев перели-

вание проводилось в течение первых 6 часов после родов. Пациентки, получившие переливание, также получали препараты железа после стабилизации состояния для восполнения дефицита железа.

После проведённого курса лечения с применением препаратов Ферсинол внутривенно и переливание эритроцитарной массы.

Показатель	Группа 1 кровопотеря до 1000 мл (n = 40) Применением препаратов Ферсинол		Группа 2 кровопотеря 1500 мл (n = 30). Выполнено переливание эритроцитарной массы	
	Было	Стало	Было	Стало
Нв, г/л	80± 9.2	90± 9.2	60 ± 11.6	68 ± 11.6
Нт%	28.4 ± 2.8	32.2 ± 2.5	26.0 ± 3.1	30.0 ± 3.1
Эритроциты г/л	3. 1± 0.4	3.5 ± 0.3	2.6 ± 0.5	3. 1± 0.4
Ферритин мкг/л	18,2±1,01	39,8±1,71	9,2±1,01	18,2±1,01
Трансферрин	3.6±1.0	3.8±1.0	2.6±1.0	3.6±1.0
Сывороточное железо мкмоль/л	16.1± 2.4	22± 3.1	11.1± 2.4	18.1± 2.4

Применение Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс показало выраженное улучшение показателей железа и эритропоэза. Отмечается существенный прирост ферритина, сывороточного железа и уровня гемоглобина. Эффективность терапии оценивается как высокая при умеренной кровопотере. Переливание эритроцитарной массы также улучшило показатели, но прирост ферритина менее выражен, чем при применении ферсинола. Однако нормализация гемоглобина и эритроцитов достигнута. В исследовании были проанализированы данные 70 пациенток с послеродовым кровотечением, стратифицированные по индексу массы тела (ИМТ). Целью анализа было определить, как ИМТ и ОЦК влияют на выбор тактики лечения – препараты железа или гемотрансфузия. В период с ноября 2024 года по август 2025 года у женщин из исследуемой группы, что составило (88,5%) было выявлено ожирение различной степени тяжести, а также повторнородящие. В исследование были включены пациентки с послеродовым кровотечением стратифицированные по индексу массы тела (ИМТ): с нормальной массой тела (ИМТ 18,5–24,9) – 8 (11,4%) пациенток, с избыточной массой тела (ИМТ 25–29,9) – 32 (46,1%) пациентки, с ожирением (ИМТ ≥30) – 30 (43,5%) пациенток. Полученные данные свидетельствуют о высокой распространённости избыточной массы тела и ожирения среди женщин с осложнённым послеродовым периодом. Установлено, что при увеличении ИМТ отмечалась тенденция к более высокому абсолютному объёму кровопотери, несмотря на относительную стабильность показателя ОЦК. Большинство пациенток с послеродовым кровотечением имели избыточную массу тела или ожирение. Повышенный ИМТ является значимым фактором риска послеродового кровотечения.

Женщины с нормальным ИМТ (и меньшим ОЦК) чаще демонстрировали выраженные симптомы анемии и гиповолемии уже при кровопотере 700–900 мл.

Уровень гемоглобина снижался до <70 г/л быстрее. У 58% пациенток в этой группе требовалось переливание крови, особенно при Нв <76 г/л. У женщин с ожирением абсолютный ОЦК выше (~5000 мл), и клинические проявления анемии могли отсутствовать даже при потере 1000–1200 мл крови. Однако у них часто наблюдались скрытые симптомы гипоперфузии (утомляемость, тахикардия при нагрузке), а анемия чаще недиагностированной. Значительное улучшение показателей эффективности терапии ЖДА при использовании препарата ФЕРСИНОЛ-Z послеродовых женщин. В работе отмечено, что побочных явлений, ассоциированных с приемом препарата железа (II) сульфат, в том числе со стороны желудочно-кишечного тракта не установлено. Сделан вывод, что препарата железа (II) сульфат является эффективным и безопасным средством для терапии железодефицитных состояний. В составе железа (II) сульфат – это антианемический и современный поливитаминно-минеральный комплекс, содержащий: железа (II) сульфат 150 мг, фолиевая кислота 0,5 мг, витамин С-50 мг, витамин В1 -2 мг, витамин В2 - 2 мг, витамин В6 -1 мг, витамин РР -10 мг, Цинк -25 мг. Благодаря сбалансированному составу, ФЕРСИНОЛ-Z не только помогает эффективно бороться с анемией, но и восполняет дефицит жизненно важных витаминов и микроэлементов, необходимых женщине в столь важный период жизни. Железо из сахарозного комплекса активно связывается трансферрином и практически полностью (до 97%) используется для эритропоэза, что быстрое время наступления терапевтического эффекта. Разовое введение было способно достоверно увеличивать уровень общего ферритина и сывороточного железа, что обеспечивает быстрое время наступления терапевтического эффекта при лечении ЖДА у беременных. Препараты утверждены фармакологическим комитетом Минздрава РУз и разрешены для клинического применения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведённое исследование показало, что послеродовое кровотечение является ведущей причиной постгеморрагической анемии, особенно у женщин с избыточной массой тела и ожирением. Установлена отрицательная корреляция между объёмом кровопотери и уровнем ферритина ($r = -0.50$, $p = 0.033$), что подтверждает роль ферритина как чувствительного показателя запасов железа. У женщин с нормальным ИМТ анемия проявляется раньше и при меньшей кровопотере, при ожирении за счёт большего объёма циркулирующей крови (ОЦК) анемия может протекать скрыто, без выраженных симптомов, несмотря на значительную кровопотерю (1000–1200 мл). Применение внутривенных препаратов железа, в частности ФЕРСИНОЛ-Z, при умеренной кровопотере обеспечивало быстрое восстановление уровня гемоглобина и ферритина, демонстрируя высокую эффективность и хорошую переносимость. При массивной кровопотере (>1500 мл) переливание эритроцитарной массы оставалось необходимой мерой, однако требовало последующей коррекции железодефицита. Таким образом, индивидуальный подход с учётом ИМТ, объёма кровопотери и показателей железа позволяет оптимизировать лечение анемии в послеродовом периоде. Препарат ФЕРСИНОЛ-Z доказал свою эффективность и безопасность для профилактики и терапии железодефицитных состояний у женщин после родов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышенный ИМТ является значимым фактором риска послеродового кровотечения. Ферритин является надёжным показателем запасов железа у женщин после родов. У женщин с нормальным ИМТ анемия проявляется раньше и при меньшей кровопотере, тогда как при ожирении – часто протекает скрыто. У женщин исследуемой группы, получавших препарат ФЕРСИНОЛ-Z, отмечалось быстрое наступление терапевтического эффекта, что наблюдалось у 88,3% пациенток. Препарат ФЕРСИНОЛ-Z не только помогает эффективно бороться с анемией, но и восполняет дефицит жизненно важных витаминов и микроэлементов, показал высокую терапевтическую эффективность, отличную переносимость и минимальные

побочные явления. Благодаря сбалансированному составу он не только эффективно устраняет проявления анемии, но и способствует восполнению дефицита ферритина и трансферрина. Полученные результаты позволяют рекомендовать Препарат ФЕРСИНОЛ-Z комплекс для широкого применения при лечении и профилактике железодефицитных состояний.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедова А. Т. и др. Соматическая коморбидность при первой беременности // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. №. 1-2. – С. 60-67.
2. Alonso-Burgos A, Díaz-Lorenzo I, Muñoz-Saá L, Gallardo G, Castellanos T, Cardenas R, Chiva de Agustín L. Primary and secondary postpartum haemorrhage: a review for a rationale endovascular approach. CVIR Endovasc. 2024 Feb 13;7(1):17. doi: 10.1186/s42155-024-00429-7. PMID: 38349501; PMCID: PMC10864234.
3. Зефирова Т. П., Юпатов Е. Ю., Мухаметова Р. Р. Железодефицитная анемия в акушерской практике // РМЖ. Мать и дитя. – 2021. – Т. 4. – №. 1. – С. 53-58.
4. Заболотских И. Б. и др. Периоперационное ведение пациентов с нарушениями системы гемостаза. Методические рекомендации Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» и Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии // Вестник интенсивной терапии имени АИ Салтанова. – 2024. – №. 1. – С. 7-46.
5. Lisonkova S., Potts J., Muraca G.M. et al. Maternal age and severe maternal morbidity: A population-based retrospective cohort study. PLoS Med. 2017;14(5):1002307. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002307. Пихут П. П. и др. Современные подходы в лечении послеродовой железодефицитной анемии // Проблемы репродукции. – 2021. – Т. 27. – №. 1. – С. 108-113.
6. Пихут П. П. и др. Современные подходы в лечении послеродовой железодефицитной анемии // Проблемы репродукции. – 2021. – Т. 27. – №. 1. – С. 108-113.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ: УСПЕХИ И НЕУДАЧИ

Пахомова Ж.Е., Баходирова Ш.Ф.

Городской межрайонный перинатальный центр №6, Ташкент

ХУЛОСА

Бепуштлиқ ҳозирги кунда жуда муҳим тиббий ва ижтимоий муаммо бўлиб, замонавий инновацион ёндашувлар энг мураккаб ҳолатларда ҳам даволаш имкониятларини кенгайтирди.

Мақсад. Бепуштлиқ муаммосининг замонавий ҳолатини кўрсатиш ҳамда инновацион технологияларнинг даволаш самарадорлигини ошириш, генетик касалликларни авлодга ўтиши хавфини камайтириш ва репродуктив терапияни индивидуаллаштиришидаги ролини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Замонавий адабиётлар, клиник тадқиқотлар, метаанализлар ва эксперт тавсияларини ўз ичига олган таҳлилий шарҳ ўтказилди. Шарҳда бепуштлиқ диагностикаси ва даволаш усуллари, шунингдек, генетик, эпигенетик ва биоинжиниринг технологияларининг репродуктив тиббиётга жорий этилиши ўрганилди.

Натижалар. Замонавий инновацион ёндашувлар ҳатто мураккаб клиник ҳолатларда ҳам бепуштлиқни даволаш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирди. Ушбу усуллар ҳамиладорлик эҳтимолини оширади, ирсий касалликларнинг авлодга ўтиши хавфини камайтиради ва даволаш стратегияларини шахсга мос равишда олиб бориши имконини беради.

Хулоса. Репродуктив тиббиётнинг келажаги генетик ва эпигенетик технологияларни интеграциялаш, сунъий интеллектдан фойдаланиш, биоинжинирингни ривожлантириш ҳамда этика меъёрларини такомиллаштириш билан бозлиқ бўлиб, бепуштлиқни даволаш самарадорлиги ва хавфсизлигини оширишида янги истиқболлар яратади.

Калит сўзлар: бепуштлиқ, ёрдамчи репродуктив технологиялар, имплантациягача генетик тест, тухумдон тўқимаси трансплантацияси, митохондриял донорлик терапияси.

Бесплодие является одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем современности. По оценкам всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бесплодие затрагивает до 15% пар репродуктивного возраста по всему миру [1]. Эта патология не только снижает качество жизни пациентов, но и имеет выраженные демографические последствия, особенно в странах с отрицательным естественным приростом населения.

За последние десятилетия наблюдается значительный рост интереса к изучению причин и механизмов развития бесплодия. Традиционные методы

SUMMARY

Infertility remains a significant medical and social issue, modern innovative approaches have substantially expanded treatment options even in complex cases.

Objective. To highlight the current state of infertility as a medical and social problem and to evaluate the role of innovative technologies in improving treatment outcomes, reducing the risk of genetic disease transmission, and enabling individualized reproductive therapy.

Materials and methods. An analytical review of recent literature, including clinical studies, meta-analyses, and expert recommendations on infertility management and the implementation of genetic, epigenetic, and bioengineering technologies in reproductive medicine.

Results. Modern innovative approaches have significantly expanded the possibilities of treating infertility, even in complex clinical cases. These methods increase pregnancy rates, reduce the risk of hereditary disease transmission, and allow for personalized therapeutic strategies.

Conclusion. The future of reproductive medicine lies in the integration of genetic and epigenetic technologies, the application of artificial intelligence, the development of bioengineering, and the refinement of ethical regulation, providing new perspectives for enhancing the effectiveness and safety of infertility treatment.

Keywords: infertility, assisted reproductive technologies, preimplantation genetic testing, ovarian tissue transplantation, mitochondrial donation therapy.

лечения, включая медикаментозную терапию, хирургическую коррекцию и простые формы искусственного оплодотворения, хотя и позволили добиться определённых успехов, часто оказываются неэффективными у сложных категорий пациентов – например, у женщин старшего репродуктивного возраста или пациентов с генетическими формами бесплодия [2].

Инновационные подходы в репродуктивной медицине открывают новые возможности для преодоления ранее считавшихся непреодолимыми формами бесплодия. Среди них – развитие вспомогатель-

ных репродуктивных технологий (ВРТ), внедрение преимплантационного генетического тестирования (PGT), трансплантация яичниковой ткани, митохондриальная донорская терапия и концепция персонализированной репродуктивной медицины. Эти методы позволяют не только повысить эффективность лечения, но и снизить риск наследственных заболеваний у потомства.

Однако несмотря на впечатляющие успехи, внедрение инновационных технологий сопровождается и серьёзными проблемами: этическими, правовыми, экономическими и биологическими. Ряд методов остаётся дорогостоящим и недоступным для большинства пациентов; эффективность некоторых технологий не доказана в рандомизированных клинических исследованиях; существуют споры относительно их безопасности и этической оправданности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В настоящей работе использован систематический и аналитический подход к оценке инновационных методов лечения бесплодия. Основой послужил обзор отечественных и зарубежных источников за последние 10 лет, включая рекомендации профессиональных сообществ, данные национальных регистров, а также результаты крупных систематических обзоров и метаанализов.

Инновационные подходы в лечении бесплодия

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) представляют собой обширный комплекс медицинских процедур, направленных на преодоление бесплодия. Ключевым отличием ВРТ является манипуляция с половыми клетками и эмбрионами вне организма женщины. Наиболее распространённые методы ВРТ включают индукцию овуляции, внутриматочную инсеминацию (ВМИ), экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и интрацитоплазматическую инъекцию сперматозоида (ИКСИ) [3].

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

ЭКО – это метод, при котором оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит *in vitro*. Программа ЭКО включает стимуляцию суперовуляции, пункцию фолликулов, оплодотворение в лабораторных условиях и перенос эмбрионов в полость матки. ЭКО является стандартом лечения трубного бесплодия, а также эффективным методом при эндометриозе, мужском факторе и бесплодии неясного генеза [2]. По данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), ежегодно в мире проводится более 2,5 миллионов циклов ЭКО/ИКСИ, приводящих примерно к 500 000 рождений [4]. В России, по данным РАРЧ (Российская ассоциация репродукции человека), эффективность ЭКО с собственными ооцитами у женщин до 35 лет достигает 40–45% на перенос [5]. Однако эффективность ЭКО резко снижается с возрастом пациентки. Например, у женщин старше 40 лет частота рождения живого ребёнка составляет менее 15% [6].

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ). ИКСИ является модификацией ЭКО, при которой единственный сперматозоид вводится непосредственно в цитоплазму ооцита. Эта технология была разработана для преодоления тяжёлых форм мужского бесплодия, включая азооспермию после тестикулярной биопсии и тяжёлую олигозооспермию [7]. ИКСИ позволила значительно повысить шанс зачатия у пар с мужским фактором. По данным ASRM, в США доля циклов ЭКО с применением ИКСИ составляет более 65% [8]. При этом остаются вопросы о потенциальном повышении риска генетических аномалий у потомства, что требует тщательного консультирования пациентов [9].

Криоконсервация гамет и эмбрионов. Одним из важнейших достижений ВРТ является развитие технологий криоконсервации. Замораживание эмбрионов и ооцитов позволяет отсрочить перенос, снизить риск синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) и повышает общую кумулятивную вероятность рождения ребёнка [10]. Особое значение криоконсервация приобрела в программах онкофертильности, позволяя женщинам репродуктивного возраста сохранить фертильность перед химио- и радиотерапией [11].

Донорские программы и суррогатное материнство. В случае истощённого овариального резерва или отсутствия матки используются программы донорства ооцитов и эмбрионов, а также суррогатное материнство. Эти технологии регулируются законодательством и подлежат строгому этическому контролю. В большинстве европейских стран донорство ооцитов легализовано и активно применяется при возрастном и генетически обусловленном бесплодии [12].

Прогностические модели оценки эффективности ВРТ. Современная репродуктивная медицина всё больше опирается на математические и статистические модели для прогнозирования исходов ВРТ. Эти подходы позволяют индивидуализировать план лечения и повысить информированность пациентов о вероятности успеха. Прогностические модели – это математические инструменты, основанные на больших массивах данных из регистров и клинических исследований. Они учитывают индивидуальные характеристики пары и параметры цикла стимуляции. Основные параметры, включаемые в модели: возраст женщины (наиболее сильный предиктор успеха), овариальный резерв, количество полученных и зрелых ооцитов, количество и качество эмбрионов, мужской фактор (показатели спермограммы), наличие предшествующих неудачных попыток, причина бесплодия.

Nelson’s Model (кумулятивная вероятность рождения живого ребёнка) учитывает количество переносов и возраст, прогнозируя общие шансы за серию попыток. Используется в Великобритании (HFEA) и странах ЕС для консультирования пар. Для более точного прогноза была разработана модель

Нельсона (Nelson et al.), которая позволяет рассчитать кумулятивную вероятность рождения живого ребёнка с учётом нескольких последовательных переносов свежих и криоконсервированных эмбрионов [13]. Модель основана на анализе больших когорт данных и учитывает: возраст пациентки, число полученных ооцитов, количество и качество эмбрионов, частоту потерь беременности, количество проведённых циклов. По данным британского регистра HFEA, кумулятивный шанс рождения живого ребёнка после 3 полных циклов ЭКО превышает 60% у женщин младше 35 лет [14]. Эти данные активно используют европейские клиники для консультирования.

Van Loendersloot Model разработана в Нидерландах. Прогнозирует вероятность рождения живого ребёнка после первого переноса на основе возраста, антимюллеров гормон, числа зрелых ооцитов, качества эмбрионов и других факторов [15].

ART Calculator / eSET Tool разработан ASRM для США. Позволяет оценить шансы успеха в зависимости от числа эмбрионов на перенос и рекомендовать стратегию eSET (элективный перенос одного эмбриона) для снижения риска многоплодной беременности [16].

ESHRE индивидуализированные калькуляторы рекомендует использовать модели для подбора доз стимуляции (например, консорциум POSEIDON предложил алгоритмы для пациентов с низким ответом) [17].

Преимплантационное генетическое тестирование (PGT-A). Преимплантационное генетическое тестирование анеуплоидий (PGT-A) представляет собой одну из важнейших инновационных технологий в рамках программ ЭКО. Его цель – выявление хромосомных анеуплоидий в эмбрионах до их переноса в полость матки, что позволяет отобрать генетически здоровый эмбрион и повысить вероятность наступления беременности с рождением здорового ребёнка [18]. PGT-A включает биопсию трофобласта на стадии бластоцисты (5–6 день развития) с последующим генетическим анализом. На сегодняшний день основным методом является массивная параллельная секвенция (NGS), обеспечивающая высокую точность выявления анеуплоидий всех 23 пар хромосом [19].

Цели применения: увеличение частоты наступления беременности на перенос; снижение риска спонтанных выкидышей; снижение числа многоплодных беременностей (за счёт обоснованного переноса одного эмбриона); повышение кумулятивной вероятности рождения живого ребёнка.

ESHRE и ASRM признают эффективность PGT-A у женщин старшего репродуктивного возраста и при повторных неудачах имплантации [20,21]. По данным крупных метаанализов, PGT-A может повышать частоту рождения живого ребёнка на перенос у женщин старше 35 лет с высоким риском анеуплоидий [22]. Однако у молодых пациенток с хорошим про-

гнозом доказательства улучшения кумулятивной вероятности рождения ребёнка противоречивы. ESHRE в своих последних рекомендациях подчёркивает, что рутинное применение PGT-A во всех программах ЭКО не показано [23]. В ряде стран (США, Испания, Великобритания) PGT-A активно используется и предлагается пациентам старшего репродуктивного возраста. В России метод также внедрён в практику ведущих центров ВРТ и часто используется в программах с донорскими ооцитами и при повторных неудачных попытках имплантации [2]. Развитие PGT-A отражает общий тренд персонализированной медицины в репродуктологии, где выбор эмбриона основывается не только на морфологии, но и на генетической безопасности.

Трансплантация яичниковой ткани, митохондриальная донорская терапия и персонализированная медицина.

Инновационные подходы в лечении бесплодия выходят за рамки стандартных циклов ЭКО и ИКСИ. Развитие биотехнологий позволило внедрить высокотехнологичные методы, ранее считавшиеся экспериментальными, включая трансплантацию яичниковой ткани и митохондриальную донорскую терапию. Одновременно всё большее значение приобретает персонализированная репродуктивная медицина.

Трансплантация яичниковой ткани.

Трансплантация криоконсервированной кортикальной ткани яичников – метод, позволяющий восстановить эндокринную и генеративную функцию после гонадотоксичной терапии. Основные показания: онкологические заболевания с необходимостью химио- или радиотерапии, преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) после лечения, сохранение фертильности у молодых пациенток [24]. Процедура включает лапароскопическую биопсию яичниковой ткани, криоконсервацию (обычно методом медленного замораживания или витрификации) и последующую трансплантацию. По данным международного регистра трансплантации яичниковой ткани (International Ovarian Tissue Transplantation Registry), на 2022 год зарегистрировано более 200 рожденных детей после процедуры [25].

Митохондриальная донорская терапия.

Митохондриальная донорская терапия (MDT) или «три-парентальная ЭКО» разработана для предотвращения передачи митохондриальных заболеваний. Суть метода: перенос ядерного генетического материала родителей в донорскую яйцеклетку с «здоровыми» митохондриями, оплодотворение и перенос эмбриона в матку пациентки [26]. MDT впервые решена к применению в Великобритании (HFEA лицензировала первые случаи в 2017 году). По состоянию на 2023 год зарегистрированы первые успешные роды после процедуры.

Активация примордиальных фолликулов in vitro (IVA, метод Кавамуры). Одним из самых инновационных подходов к лечению преждевременной

недостаточности яичников (ПНЯ) стала технология *in vitro* activation (IVA), разработанная группой Кавамуры (Kawamura et al.) в Японии. Эта методика нацелена на стимуляцию «спящих» примордиальных фолликулов у женщин с ПНЯ или низким овариальным резервом [27,28]. Метод IVA основан на понимании молекулярных механизмов, регулирующих активацию примордиальных фолликулов. Ключевую роль играют пути PI3K-AKT и Hippo-сигналинг. В норме Hippo-путь ингибирует рост фолликулов; его механическая фрагментация ткани яичника разрушает эту регуляцию и стимулирует рост [29]. В оригинальном исследовании Кавамуры (2013) сообщалось о первых успешных беременностях и родах после IVA у женщин с ПНЯ [27]. Последующие исследования в Японии, Китае и Европе показали возможность роста фолликулов и получения зрелых ооцитов даже при очень низком овариальном резерве [28].

Концепция Artificial Ovary Activation (AOA) или искусственной активации яичника – это дальнейшее развитие подхода *in vitro* activation (IVA), предложенного Кавамурой и соавторами. Целью AOA является не только стимуляция активации «спящих» примордиальных фолликулов, но и создание условий для их безопасного *ex vivo* созревания с минимальной инвазией [27]. Кавамура и соавторы считают AOA частью более широкой концепции инженерии яичников для восстановления фертильности у женщин с преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ) и после гонадотоксичного лечения. Развитие этой технологии может стать одним из направлений персонализированной медицины в репродуктологии [28].

Внедрение инновационных технологий в репродуктивную медицину за последние десятилетия позволило существенно улучшить исходы лечения бесплодия. Эти успехи подтверждаются как регистрами национального уровня (CDC, HFEA, ESHRE), так и результатами крупных многоцентровых исследований.

По данным CDC (США), средняя частота рождения живого ребёнка на цикл ЭКО у женщин младше 35 лет превышает 40%, а при кумулятивном анализе (включая криопереносы) может достигать 65–70% [28].

ESHRE сообщает о схожих показателях по Европе: в среднем 30–35% успеха на перенос свежего эмбриона и более 50% кумулятивной вероятности после нескольких попыток.

Таким образом, инновационные методы лечения бесплодия существенно расширили возможности для пациентов, ранее имевших крайне низкие шансы на успех. От традиционного ЭКО и донорских программ до сложных генетических тестов и трансплантации яичниковой ткани – современные технологии позволяют индивидуализировать подход и повысить кумулятивную вероятность рождения живого ребёнка даже в самых сложных случаях.

Несмотря на значительные достижения, инновационные подходы в лечении бесплодия сопровождаются целым рядом ограничений и проблем. Эти неудачи важно учитывать при консультировании пациентов и планировании лечения.

Биологические ограничения

- Возрастной фактор остаётся ключевым барьером. Эффективность ЭКО и других ВРТ резко падает после 40 лет, несмотря на инновационные стимуляционные протоколы и PGT-A. Даже при отборе эуплоидных эмбрионов с помощью PGT-A общая вероятность рождения живого ребёнка уменьшается с возрастом женщины из-за снижения качества ооцитов.
- Мозаицизм эмбрионов ограничивает точность PGT-A. Даже современные NGS-методы не всегда позволяют корректно предсказать имплантационный потенциал эмбриона.
- Невозможность лечения полного истощения овариального резерва. Методы IVA и трансплантация яичниковой ткани требуют наличия хотя бы минимального числа примордиальных фолликулов. У пациенток с полным истощением резерва эффективных решений пока нет.

Технические и клинические ограничения

- Инвазивность процедур. Многие инновационные методы (биопсия трофобласта при PGT-A, трансплантация яичниковой ткани, фрагментация кортикальной ткани при IVA) требуют хирургического вмешательства и связаны с рисками осложнений.
- Неравномерная эффективность. Некоторые протоколы работают только в узких группах пациентов. Например, PGT-A наиболее полезно у женщин старше 35 лет с высоким риском анеуплоидий, а IVA – лишь у пациенток с остаточной популяцией фолликулов.
- Ограниченные доказательства эффективности. Для ряда методов (например, митохондриальная донорская терапия, Artificial Ovary Activation) пока доступны лишь ограниченные клинические данные, а большая часть исследований носит экспериментальный характер.
- Этические и правовые проблемы
- Отбор эмбрионов (PGT-A) вызывает дебаты о допустимости «генетического скрининга», возможности дискриминации по генетическим признакам и селекции по «немедицинским» критериям.
- Митохондриальная донорская терапия сопряжена с вопросами этики вмешательства в зародышевую линию человека и правового статуса «третьего родителя». В ряде стран MDT запрещена или строго регулируется

(например, в США только в виде ограниченных клинических исследований под надзором FDA).

- Суррогатное материнство и донорские программы порождают правовые конфликты и требуют строгого контроля для предотвращения коммерциализации и эксплуатации уязвимых групп населения.

Экономические барьеры и доступность

- Высокая стоимость инновационных процедур остаётся серьёзным ограничением. PGT-A, IVA, трансплантация яичниковой ткани и MDT требуют высокотехнологичного оснащения и дорогостоящих реагентов.
- В большинстве стран расходы ложатся на пациента, что делает инновационные методы недоступными для значительной части населения.
- По данным ВОЗ, доступ к ВРТ и генетическому тестированию остаётся крайне неравномерным даже между странами с высоким уровнем дохода.

ВЫВОДЫ

Несмотря на впечатляющие успехи, инновационные методы лечения бесплодия нельзя рассматривать как универсальное решение. Их внедрение должно сопровождаться строгой клинической оценкой эффективности, этическими обсуждениями и мерами по расширению доступности для пациентов. Инновационные подходы в лечении бесплодия за последние десятилетия произвели настоящую революцию в репродуктивной медицине. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), преимплантационное генетическое тестирование (PGT-A), трансплантация яичниковой ткани, митохондриальная донорская терапия, методы *in vitro* активации фолликулов (IVA) и концепция искусственного яичника открыли новые возможности для пациентов, ранее считавшихся безнадежными кандидатами на лечение.

Достижения в этой области позволили существенно повысить частоту рождения живого ребёнка, особенно у женщин старшего репродуктивного возраста и в сложных клинических случаях. Однако эти успехи не отменяют существующих проблем: высокая стоимость процедур, инвазивность, ограниченные данные о долгосрочной безопасности, биологические пределы, а также серьёзные этические и правовые вопросы.

Особое значение приобретает развитие персонализированной репродуктивной медицины, опирающейся на прогнозирование шансов успеха с использованием биомаркеров, генетического тестирования и искусственного интеллекта. Такая стратегия позволяет не только повысить эффективность лечения, но и снизить риски и издержки для пациента и системы здравоохранения.

Будущее лечения бесплодия, несомненно, связано с мультидисциплинарным подходом, включа-

ющим генетику, молекулярную биологию, биоинженерию, этику и здравоохранительную политику. Только комплексное решение позволит преодолеть существующие барьеры и обеспечить доступность современных технологий для всех пациентов, нуждающихся в помощи.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения

ЭКО - Экстракорпоральное оплодотворение

ВРТ - вспомогательные репродуктивные технологии

PGT-A - преимплантационное генетическое тестирование

ВМИ - внутриматочная инсеминация

ИКСИ - интрацитоплазматическую инъекцию сперматозоида

РАРЧ - Российская ассоциация репродукции человека

ASRM - American Society for Reproductive Medicine

ESHRE - European Society of Human Reproduction and Embryology

eSET - селективный перенос одного эмбриона

СГЯ - синдром гиперстимуляции яичников

HFEA - Human Fertilisation and Embryology Authority

NGS - массивная параллельная секвенция

ПНЯ - преждевременная недостаточность яичников

MDT - Митохондриальная донорская терапия

AOA - Artificial Ovary Activation

CDC - The Centre for Disease Control

ЛИТЕРАТУРА

1. Всемирная организация здравоохранения. Infertility. WHO Fact Sheets. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility>
2. Баранов В.С., Сухих Г.Т., Серова Н.П. Репродуктивная медицина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 480 с.
3. WHO. Global ART Monitoring. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertility>
4. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) ART Fact Sheet 2022. <https://www.eshre.eu/Press-Room/Resources>
5. Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ). <https://rarch.ru>
6. CDC. 2021 Assisted Reproductive Technology Fertility Clinic Success Rates Report. <https://www.cdc.gov/art/artdata/index.html>
7. Palermo G et al. Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte. *Lancet*. 1992;340(8810):17-18.
8. ASRM. Assisted Reproductive Technology 2022 Guidelines. <https://www.asrm.org>
9. Bonduelle M et al. Follow-up of children born after ICSI. *Hum Reprod Update*. 2014;20(2):165–183. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmt040>

10. Cobo A et al. Clinical application of oocyte vitrification: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Fertil Steril.* 2016;106(6):1543-1555.e8. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.09.007>
11. Ethics Committee of ASRM. Fertility preservation in patients undergoing gonadotoxic therapy or gonadectomy: a committee opinion. *Fertil Steril.* 2019;112(6):1022–1033. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2019.09.013>
12. Shenfield F et al. ESHRE Task Force on Cross-Border Reproductive Care. *Hum Reprod.* 2010;25(6):1361–1368. <https://doi.org/10.1093/humrep/deq057>
13. Nelson SM, Lawlor DA. Predicting live birth after IVF. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology.* 2011;23(3): 165–171. <https://doi.org/10.1097/GCO.0b013e328346c938>
14. Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA). Fertility treatment 2018–2020: trends and figures. <https://www.hfea.gov.uk/about-us/publications/research-and-data/fertility-treatment-2018-2020-trends-and-figures>
15. van Loendersloot LL et al. Predictive models in IVF: external validation using multiple clinics data. *Hum Reprod.* 2014;29(6):1243–1255. <https://doi.org/10.1093/humrep/deu069>
16. SART Patient Predictor. Society for Assisted Reproductive Technology. <https://www.sart.org/patients/patient-predictor/>
17. Alviggi C et al. Poseidon criteria and their implications for clinical practice. *Front Endocrinol.* 2019;10:614. <https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00614>
18. Harper JC et al. The evolution of preimplantation genetic testing for aneuploidy: from FISH to NGS. *Hum Reprod Update.* 2020;26(5): 706–729. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmaa017>
19. Treff NR, Zimmerman RS. Advances in preimplantation genetic testing for aneuploidy using next-generation sequencing. *Fertil Steril.* 2017;107(3): 593–599. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2017.01.003>
20. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Preimplantation genetic testing: a committee opinion. *Fertil Steril.* 2018;109(3): 429–436. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.01.002>
21. ESHRE PGT Consortium. Good practice recommendations for PGT in ART clinics. *Hum Reprod Open.* 2020;2020(3): hoaa020. <https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa020>
22. Mastenbroek S et al. Preimplantation genetic testing for aneuploidy in IVF: evidence from systematic reviews and meta-analyses. *BMJ.* 2021;372:n693. <https://doi.org/10.1136/bmj.n693>
23. ESHRE. PGT-A Guideline 2023 Update. <https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/PGT>
24. Donnez J, Dolmans MM. Fertility preservation in women. *N Engl J Med.* 2017;377(17):1657–1665. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1614676>
25. Andersen CY et al. Worldwide fertility outcome after ovarian tissue transplantation: a systematic review and meta-analysis. *J Assist Reprod Genet.* 2022;39(4):687–696. <https://doi.org/10.1007/s10815-022-02495-4>
26. Craven L et al. Pronuclear transfer in human embryos to prevent transmission of mitochondrial DNA disease. *Nature.* 2010;465(7294):82–85. <https://doi.org/10.1038/nature08958>
27. Kawamura K, Cheng Y, Suzuki N, et al. Hippo signaling disruption and Akt stimulation of ovarian follicles for infertility treatment. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2013;110(43):17474–17479. <https://doi.org/10.1073/pnas.1312830110>
28. Kawamura K, Hsueh AJ. Activation of dormant follicles: a new treatment for premature ovarian failure? *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2014;26(3):217–222. <https://doi.org/10.1097/GCO.0000000000000072>
29. Zhang H, Liu K. Cellular signaling pathways in ovarian follicle activation. *Clin Med Insights Reprod Health.* 2015;9:1–12. <https://doi.org/10.4137/CMRH.S24051>

ПРОБЛЕМЫ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС- СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГЕСТАЦИИ

Пахомова Ж.Е., Мензатова Л.Р., Джураева Х.М., Умерова Х.У.
Городской межрайонный перинатальный центр №6, Ташкент

XULOSA

Tadqiqot maqsadi. Profilaktika choralarini ishlab chiqish uchun homiladorlik yoshiga qarab yangi tug'ilgan chaqaloqlarda RDSning og'irligi o'rtasidagi munosabatni o'rnatishdir.

Materiallar va usullar. Toshkent shahridagi 6-son shahar tumanlararo perinatal markazida tug'ilgan 77 nafar onadan 83 nafar yangi tug'ilgan chaqaloqni ko'rikdan o'tkazdik. Tug'ilishlar mos ravishda homiladorlikning 22 dan 36 haftasiga to'g'ri keladi. Barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlar homiladorlik yoshiga qarab guruhlarga bo'lingan. Shunday qilib, 22-26 haftalik davr bilan 1-guruh, 2-guruh - 27-33 hafta, 3-guruh - 34-36 hafta. JSSTning homiladorlik yoshi bo'yicha tasnifiga ko'ra: o'rtacha va kech ertatug'ilish - homiladorlikning 33-36 xaftaligi (80-85%); juda erta tug'ilgan - homiladorlikning 28- 32 haftasi (10%); juda erta tug'ilish - homiladorlikning 22-26 xaftaligi (5%).

Xulosa. Homiladorlikning 22-26 xaftaligida tug'ilgan erta tug'ilgan chaqaloqlar juda erta tug'ilgan chaqaloqlar deb tasniflanadi va 22-26 haftalik davr omon qolish chegarasi hisoblanadi. To'liq reanimatsiya choralarini zarurligi masalasi hozirda munozarali va hal qilinmagan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda RDSni davolash klinik protocol qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda darhol tug'ruq xonada boshlanishi kerak. Hayotning birinchi soatlarida tabiiy sirt faol moddalarni kiritish va invaziv bo'lmagan nafas olishni qo'llab-quvvatlash (CPAP) dan foydalanish RDSning og'irligini kamaytirishi va shu bilan bolaning nogironligini minimallashtirishi mumkin. Homiladorlikning har qanday bosqichida homilador ayollarda o'tkir respiratorli infeksiya erta tug'ilish va intrauterine patologiyaning rivojlanishi uchun yuqori xavf hisoblanadi.

Kalit so'zlar: go'dak, homiladorlik, distress.

По данным ВОЗ (2019), одной из главных причин заболеваемости новорожденных являются отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. Большинство этих заболеваний ассоциировано с дистрессом плода, заболеваниями кишечника и др. [1,2]. Частота респираторного дистресс- синдрома (РДС) составляет 10 % у беременных и 7-10% от всех родов [1,3]. Чаще встречается РДС при 28 нед. беременности (60%), при 32-36 нед. беременности - у 15-20% новорожденных.

Респираторный дистресс-синдром у новорожденных или болезнь гиалиновых мембран обусловлены первичным дефицитом сурфактанта или незрело-

SUMMARY

Objective. The aim of the study was to establish the relationship between the severity of neonatal respiratory distress syndrome (RDS) and gestational age in order to develop preventive measures.

Materials and methods. A total of 83 newborns from 77 mothers delivered at the City Interdistrict Perinatal Center No. 6 in Tashkent were examined. Deliveries occurred between 22 and 36 weeks of gestation. All newborns were divided into groups according to gestational age: Group 1: 22-26 weeks, Group 2: 27-33 weeks, Group 3: 34-36 weeks. According to the WHO classification by gestational age, the following categories were used: Moderate to late preterm: 33-36 weeks (80-85%), Very preterm: 28-32 weeks (10%), Extremely preterm: 22-26 weeks (5%).

Conclusions. Premature infants born at 22-26 weeks of gestation are classified as extremely preterm infants, and the period of 22-26 weeks is considered the threshold for survival. The issue of the need for full resuscitation measures currently remains controversial and unresolved. Treatment of RDS in newborns should be started immediately in the delivery room, strictly following the provisions of the clinical protocol. Administration of natural surfactant within the first hours of life and the use of noninvasive respiratory support (CPAP) help reduce the severity of RDS and thereby minimize the risk of long-term disability in the child. Acute respiratory infection in pregnant women at any gestational age poses a high risk for preterm birth and intrauterine pathology.

Keywords: fetus, pregnancy, distress.

стью легочной ткани [4]. В настоящее время известны факты развития этого синдрома в следствии внутриутробной инфекции или генетических нарушений [5,6].

По данным ВОЗ за 2024 год в мире более 13,4 миллиона детей родилось недоношенными при сроке гестации 22-36 недель, что составляет около 10% от всех новорожденных детей. Недоношенные новорожденные - это основная группа новорожденных, у которых развивается РДС [7,8].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в установлении взаимосвязи тяжести РДС новорожденных в зависимости от срока гестации для разработки про-

филактических мероприятий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами были обследованы 83 новорожденных от 77 родильниц, родившихся городском межрайонном перинатальном центре №6 г. Ташкента.

Роды произошли соответственно в сроках от 22 до 36-нед. гестации. Все новорожденные были разделены на группы в соответствии со сроком гестации. Так, 1-я группа со сроком 22-26 нед., 2-я группа - 27-33 нед., 3-я группа - 34-36 недель.

Согласно классификации ВОЗ по срокам гестации все новорожденные следует делить : умеренно и поздно недоношенные дети (moderate to late preterm) -33-36 недель гестации (80-85%); глубоко недоношенные (very preterm)- 28 - 32 недель гестации (10%); крайне недоношенные (extremely preterm) – 22- 26 недель гестации (5%).

Всем новорожденным было проведено клинико-лабораторное обследование, а также оценка кислотно-щелочного состояния крови, определение прокальцитонина, D-димера, тестирование на COVID-19, ультразвуковое исследование, рентген грудной клетки. При рождении проводили оценку новорожденных по шкале Апгар и Сильвермана. Мониторинг осуществлялся с использованием монитора для пациента, где оценивались АД, пульс, частота дыхания, температура тела, сатурация.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При сроке гестации 22-26 нед. родилось 7(8,4%), при сроке 27-33нед.-(41%), при сроке 34-36 родилось – 42(50,6%) новорожденных.

По весу новорожденных было : 500-999 г -9 (10,8%), 1000-1499 г – 15 (18%), 1500-1999 г – 22 (26,5%), 2000-2499 г -37 (44,7%). Также, из 83 новорожденных 4 были из двойни и 1 из тройни.

Возраст беременных был от 20 до 36 лет (26,5±0,8). По паритету: родов первородящих было 34, повторнородящих – 43 пациентки. Анализ соматической патологии показал, что течение беременности протекало на фоне хронического пиелонефрита у 31 (40,3%), ЖДА -у 36 (46,8%), заболеваний щитовидной железы – у 10 (13,0%), хронической артериальной гипертензии – у 18 (23,4%), ОРИ - у 42 (50,6%). Причем ОРИ в I половине беременности перенесли 14 (63,7%), во II половине- 8 (36,4%). Течение антенатального периода осложнилось преждевременными родами у 58 (75,3%), преэклампсией – у 15 (19,5%), нарушением маточно-плацентарного кровотока – у 23 (29,9%), преждевременным разрывом плодных оболочек – у 26 (33,8%) беременных. Профилактика дистресса плода была проведена у 18 (23,4%) беременных.

Родоразрешение через естественные родовые пути было проведено у 37 (48,1%) пациенток, путем кесарева сечения - у 40 (51,9%) пациенток.

Таблица 1

Оценка новорожденных при рождении

Название шкалы	1-я группа n=7	2-я группа n=34	3-я группа n=42
Апгар			
1-3 балла	7 (8,4%)	7 (8,4%)	3 (3,6%)
4-6 баллов	-	27 (32,5%)	14 (16,8%)
7-8 баллов	-	-	25 (30,1%)
Сильвермана			
7-10 б (тяжелая ДН)	7 (8,4%)	7 (8,4%)	3 (3,6%)
4-6 б (ДН средней тяжести)	-	15 (18,1%)	12 (14,5%)
1-3 б (ДН легкой степени)	-	12 (14,5%)	27 (32,5%)

Как видно из таблицы 1 с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов родилось 25(30%), с легкой степени тяжести; по шкале Сильвермана -27(32,5%) новорожденных и с тяжелой степенью тяжести -7(8,4%) новорожденных. Реанимационные мероприятия начинали сразу при рождении: 10 новорожденных были в родильном зале переведены на ИВЛ 10 (12,0%).

Все новорожденные поступали в отделение реанимации и интенсивной терапии сразу из родильного зала, где были начаты неотложные мероприятия в соответствии клиническим протоколом «Реанимации новорожденных при рождении».

После перевода новорожденных в отделение реанимации и интенсивной терапии респираторная поддержка применялась в следующем объеме. Так в 1-й группе 7 (100%) новорожденным проводилась ИВЛ, во 2-й группе: ИВЛ проводили у 7(20,6%),

СРАР - у 27 (79,4%) новорожденных, в 3-й группе ИВЛ выполняли у 3 (7,1%), СРАР - у 14 (33,3%), увлажненный кислород через носовые канюли – у 11(26,2%) новорожденных (табл. 2).

Натуральный сурфактант был введен интратрахеально в 1-й группе всем новорожденным, во 2-й группе – 28 (82,4%), в 3-й группе- 5 (11,9%) новорожденным. Также, всем новорожденным были проведены следующие исследования: нейросонография, ЭХОКГ, ретненография грудной клетки.

По результатам обследования установлено: внутрижелудочковые кровоизлияния у 2 новорожденных, транспозиция магистральных сосудов – у 2, пневмония – 20, spina bifida – у 1 новорожденного. В крови отмечено резкое повышение прокальцитонина в 15 раз, D-димера - в 10 раз, СРБ- в 4 раза. Все тесты на Covid-19 были отрицательными.

Использование респираторной поддержки у недоношенных новорожденных

Вид респираторной поддержки	1-я группа n=7	2-я группа n=34	3-я группа n=42
ИВЛ	7 (100%)	7 (20,6%)	3 (7,1%)
СРАР	-	27 (79,4)	14 (33,3%)
Кислород	-	-	11 (26,2%)
Самостоятельное дыхание	-	-	14 (33,3%)

По результатам обследования установлено: внутрижелудочковые кровоизлияния у 2 новорожденных, транспозиция магистральных сосудов – у 2, пневмония – 20, spina bifida – у 1 новорожденного. В крови отмечено резкое повышение прокальцитонина в 15 раз, D-димера - в 10 раз, СРБ- в 4 раза. Все тесты на Covid-19 были отрицательными.

Новорожденные находились в отделении реанимации от 3 до 19 суток, после чего в зависимости от состояния выписывались домой или переводились на второй этап выхаживания или в другой стационар.

Перевод в другой стационар решался консилиумом. Так из 1-й группы переведённых новорожденных на второй этап выхаживания не было, из 2-й группы было переведено 31(91,2%), из 3-й группы - 7(16,7%). Неонатальная смертность произошла у 7 (100%) новорожденных в 1-й группе, у 3 (8,8%) – во 2-й группе, в 3 группе случаев смертности не было. Домой под наблюдение участкового врача были выписаны 35 новорожденных из 3 группы, для дальнейшего лечения было переведено 38 (50%) недоношенных новорожденных из 2 и 3 групп.

ВЫВОДЫ

Недоношенные дети, рожденные при сроке 22–26 недель гестации, классифицируются как крайне недоношенные (extremely preterm infant), а срок 22–26 недель считается пороговым для выживания. Вопрос о необходимости проведения реанимационных мероприятий в полном объеме в настоящее время остается дискуссионным и неразрешенным.

Лечение РДС новорожденных необходимо начинать сразу в родильном зале, строго выполняя положения клинического протокола. Введение натурального сурфактанта в первые часы жизни и использование неинвазивной респираторной поддержки (СРАР) позволяет уменьшить тяжесть течения РДС и тем самым минимизировать инвалидизацию ребёнка.

Острая респираторная инфекция у беременных при любом сроке гестации является высоким риском

на развитие преждевременных родов и внутриутробной патологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. WHO (2023). Preterm birth: Key facts. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>.
2. Neu J, Walker WA. Necrotizing enterocolitis. *N Engl J Med*. 2011;364(3):255-264.
3. Sweet DG, et al. European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome – 2022 update. *Neonatology*. 2022.
4. Northway Jr, WH; Rosan, RC; Porter, DY (16 February 1967 y.). “Pulmonary disease after respiratory therapy of hyaline membrane disease. Bronchopulmonary dysplasia”. *The New England Journal of Medicine*. 276 (7): 357– 68. doi : 10.1056/NEJM196702162760701. PMID 5334613.
5. Santosham, Mathuram; Chan, Grace J.; Lee, Ann S.; Baki, Abdullah H.; Tan, Jingwen; Black, Robert E. (2013). “Risk of early neonatal infection with maternal infection or colonization: a global systematic review and meta-analysis.” *PLOS Medicine*. 10 (8): e1001502. doi: 10.1371/journal.pmed.1001502. ISSN 1549-1676. PMC 3747995. PMID 23976885.
6. Sinha, Sunil (2012). *Basic neonatal medicine*. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons. ISBN 9780470670408; Access is provided by the University of Pittsburgh
7. Northway Jr, WH; Rosan, RC; Porter, DY (16 февраля 1967 г.). «Легочное заболевание после респираторной терапии гиалиново-мембранной болезни. Бронхолегочная дисплазия». *The New England Journal of Medicine*. 276 (7): 357– 68. doi : 10.1056/NEJM196702162760701. PMID 5334613.
8. Blencowe H, et al. Born Too Soon: The global epidemiology of 15 million preterm births. *Reprod Health*. 2013;10 Suppl 1(Suppl 1): S2.

ТЯЖЕЛАЯ ПРЕЭКЛАМПСИЯ КАК КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРОМБОТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ БЕРЕМЕННОСТИ: РОЛЬ ЛАТЕНТНЫХ ФАКТОРОВ, ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Раджабова З.А., Ан В.А.

Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Og'ir preeklampsiya (PE) — bu nafaqat homiladorlikdagi gipertenziv buzilish, balki trombotik mikroangiopatiya (TMA) belgilari bilan kechuvchi, ko'p tizimli murakkab holatdir. Bu holat sistemali endotelial disfunktsiya, gemostazdagi buzilishlar va xronik feto-plasentar yetishmovchilik bilan ifodalanadi. Ushbu tadqiqotda 327 nafar og'ir preeklampsiyalii bemor tahlil qilinib, PE'ning ikkilamchi TMA shakliga o'tishini bashorat qiluvchi yashirin klinik omillar va laborator markerlar aniqlangan. Zamonaviy diagnostika usullari, jumladan doppler ultratovushi va platsenta gistologik tahlili qo'llanilgan. Tadqiqot natijalari og'ir preeklampsiyani homiladorlik davridagi tomirlar va gemostazdagi trombotik buzilishlarning alohida patogenetik shakli sifatida ko'rib chiqishga asos beradi.

Kalit so'zlar: preeklampsiya, trombotik mikroangiopatiya, antifosfolipid sindromi, trombofiliya, endotelial disfunktsiya, gomotsistein, sitotrofoblast, obliterativ angiopatiya, platsenta, miya qon aylanishining markazlashuvi, gemostaz, feto-plasentar yetishmovchilik.

Преэклампсия (ПЭ), особенно в тяжёлых формах, продолжает оставаться одним из наиболее грозных акушерских осложнений, определяющим высокий уровень материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Несмотря на значительный прогресс в понимании патофизиологии ПЭ, до сих пор отсутствует единый универсальный подход к её предикции, ранней диагностике и профилактике [2,3]. В современной научной парадигме ПЭ рассматривается не только как гипертензивное состояние беременности, но как системная полиорганная патология, в основе которой лежит нарушение ангиогенеза, эндотелиальная дисфункция, системный воспалительный ответ и активация свертывающей системы крови [1,6].

В последнее десятилетие особое внимание уделяется взаимосвязи ПЭ с тромботическими микроангиопатиями (ТМА), в частности – с вторичными ТМА (ВТМА), развивающимися на фоне беременности. Накопленные клинические наблюдения и морфологические исследования позволяют рассматривать тяжёлую ПЭ как ведущий триггер ВТМА, сопровождающийся нарушением инвазии цитотрофобласта, пла-

SUMMARY

Severe preeclampsia (PE) is not merely a hypertensive disorder of pregnancy, but a complex multiorgan condition with pronounced manifestations of thrombotic microangiopathy (TMA), reflecting systemic endothelial dysfunction, coagulation disorders, and feto-placental insufficiency. This study presents a detailed analysis of 327 cases of severe PE with a focus on identifying latent clinical predictors and laboratory markers associated with progression to secondary TMA. Modern methods of hemostatic, biochemical, and morphological assessment were applied, Doppler ultrasonography, and placental histopathology. The findings support the interpretation of severe PE as a specific pathogenetic variant of thrombotic vascular destabilization during pregnancy, with high prognostic significance of the identified disturbances.

Keywords: preeclampsia, thrombotic microangiopathy, antiphospholipid syndrome, thrombophilia, endotheliopathy, homocysteine, cytotrophoblast, placenta, cerebral centralization.

центарной облитеративной ангиопатией и системной гипоксией плода. При этом в ряде случаев трансформация ПЭ в более агрессивные формы сосудистой патологии происходит стремительно и непредсказуемо, несмотря на выполнение стандартов наблюдения и диагностики [1,3,4].

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью более глубокого понимания латентных факторов риска, предшествующих манифестации ПЭ, клинико-лабораторных маркеров её тяжёлого течения, а также морфологических и молекулярных субстратов, лежащих в основе поражения системы мать–плацента–плод. Разработка клинико-патогенетической модели тяжёлой ПЭ как варианта ВТМА позволит повысить точность стратификации риска и обосновать новые подходы к патогенетической профилактике [1,5,6].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования являлось комплексное клинико-патогенетическое обоснование тяжёлой преэклампсии как варианта вторичной тромботической микроангиопатии беременности с последующей идентификацией латентных предикто-

ров, специфических гемостазиологических и биохимических маркеров, а также морфофункциональных изменений в системе мать–плацента–плод, определяющих риски неблагоприятного течения и перинатальных исходов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен проспективный анализ 327 случаев тяжёлой ПЭ, подтверждённой клинически и лабораторно, в соответствии с международными критериями ISSHP и ВОЗ[2,3,6]. Сравнительный анализ проведён с контрольной группой женщин с физиологическим течением беременности. Методы включали:

- стандартные общеклинические, биохимические, гемостазиологические и доплерометрические исследования;
- определение уровня гомоцистеина, маркеров ТМА (LDG, D-димер, ТАТ, PAI-1);
- морфологическое исследование плацентарной ткани и оценка сосудистой архитектоники опорных ворсин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ клинично-демографических параметров продемонстрировал сопоставимость возрастной структуры пациенток с тяжёлой преэклампсией и женщин из контрольной группы, что исключает влияние возрастного фактора на формирование различий в исходах. Тем не менее, достоверно более высокая доля первородящих в основной группе свидетельствует о реализации наиболее выраженного риска развития ПЭ в первую беременность. Это наблюдение подтверждает известную закономерность: именно первичная гестационная адаптация организма является наиболее уязвимой в контексте сосудисто-гемодинамических нарушений. Кроме того, в группе ПЭ отмечено повышенное количество многоплодных беременностей, что также считается фактором риска осложнённого течения гестации. Особый интерес представляет высокий процент отягощённого акушерского анамнеза, включающего привычное невынашивание, хроническую артериальную гипертензию, инфекции мочевыводящих путей и анемию – все эти состояния были статистически значимо чаще представлены у пациенток с ПЭ, чем в контрольной когорте.

Выявленные данные демонстрируют чёткую связь между тяжелой преэклампсией и наличием предшествующего сосудисто-гемостазиологического и иммунного дисбаланса. Хроническая артериальная гипертензия была выявлена у подавляющего большинства пациенток с ПЭ – 88,4%, тогда как в контрольной группе она встречалась в единичных случаях. Привычное невынашивание беременности, отражающее, как правило, скрытые формы тромбофилии или аутоиммунных расстройств, встречалось у 61,8% обследованных, что подтверждает высокую частоту скрытой сосудистой патологии до наступления данной беременности. Также заслуживает внимания наличие тромбофилического семейного анамнеза

у 38,5% пациенток, отсутствие которого в контрольной группе делает этот фактор особенно значимым как потенциальный маркер риска.

Инфекционно-воспалительный фон, представленный в первую очередь инфекциями мочевыводящих путей, был верифицирован у 48,3% пациенток с ПЭ, что позволяет рассматривать хроническое воспаление как патогенетически значимый фоновый механизм. Аналогично, анамнез бесплодия, выявленный у 31,5% обследованных, может рассматриваться как отражение эндокринной и сосудистой дестабилизации, предшествующей гестации. Все вышеуказанные параметры подтверждают наличие «компрометированного фона», при котором беременность становится триггером декомпенсации.

Гемостазиологический профиль пациенток с ПЭ демонстрирует типичную картину микроангиопатического повреждения. Парадоксально сниженные уровни D-димера, вопреки традиционным ожиданиям его повышения при тромбозе, могут свидетельствовать о феномене «потребления» – истощения фибринолитического потенциала на фоне выраженной активации коагуляции. Это наблюдение требует дополнительной интерпретации, включая оценку специфики фибринолиза при гестационных ТМА.

Чётко выражено снижение уровня тромбоцитов (медиана – $181 \times 10^9/\text{л}$), что согласуется с механизмом потребления тромбоцитов при микротромбозах и вторичном повреждении сосудов. Повышенные уровни ЛДГ (лактатдегидрогеназы) и креатинина отражают соответствующее вовлечение в патологический процесс печени и почек. Гиперпротеинурия (Мс белка в моче – 3,36 г/л) подтверждает выраженную нефропатию. Особенно значимо повышение уровня гомоцистеина (до 16 мкмоль/л), являющегося универсальным маркером эндотелиальной дисфункции, сосудистого воспаления и тромбогенеза. Это указывает на системный характер эндотелиопатии, лежащей в основе тяжёлой ПЭ.

Инструментальная диагностика с использованием доплерометрии показала характерные изменения маточно-плацентарного и фетального кровотока у пациенток с ПЭ. Пульсационный индекс в маточных артериях был существенно выше по сравнению с контролем (1,43 против 0,68), что свидетельствует о повышенном сосудистом сопротивлении вследствие нарушенной инвазии трофобласта и развития фибриноидной трансформации сосудистой стенки. Одновременно с этим было зафиксировано достоверное снижение PI в средней мозговой артерии плода (0,98 против 1,63 в контроле), что является классическим эхографическим маркером централизации кровообращения в ответ на хроническую гипоксию.

Морфологический анализ плацентарной ткани показал наличие выраженных изменений, типичных для облитеративной ангиопатии: фибриноидные отложения в стенках сосудов, редукция капиллярной сети в терминальных ворсинах, микроинфаркты,

а также признаки хронической гипоперфузии. Все эти данные свидетельствуют о формировании анатомо-функционального субстрата, лежащего в основе нарушенного обмена между матерью и плодом, и подтверждают системный характер повреждения в условиях тяжёлой ПЭ.

Полученные результаты подтверждают представление о тяжёлой преэклампсии как о специфической форме тромботической микроангиопатии беременности, имеющей характерные клинико-лабораторные, гемостазиологические и морфологические проявления. Высокая частота фоновых нарушений – хронической артериальной гипертензии, тромбофилий, привычного невынашивания, инфекционно-воспалительных процессов мочевыводящих путей – свидетельствует о предсуществующем «компрометированном фоне», на котором формируется патологическая адаптация системы гемостаза и эндотелия к гестации. Эти факторы формируют скрытую предрасположенность к сосудисто-коагуляционным катастрофам и создают условия для фульминантного течения ПЭ.

Обнаруженные гемостазиологические отклонения – тромбоцитопения, повышение гомоцистеина, креатинина, ЛДГ и нарушения в коагулограмме – подтверждают наличие системной эндотелиальной дисфункции и микроангиопатического компонента. Эти данные согласуются с результатами других авторов, указывающих на патогенетическую близость ПЭ к тромботической тромбоцитопенической пурпуре и катастрофическому АФС.

Морфологические и доплерометрические изменения в системе мать–плацента–плод (высокий пульсационный индекс в маточных артериях, снижение PI в средней мозговой артерии плода, признаки централизации кровотока) свидетельствуют о хронической гипоперфузии плаценты и компенсаторных реакциях плода на фоне гипоксии. Гистологические признаки – фибриноидные некрозы, редукция капилляров, инфаркты ворсинчатого хориона – отражают сосудистый коллапс на уровне микроциркуляции, соответствующий критериям облитеративной ангиопатии, что ранее было описано в работах Вороновой О.В. и Расстригиной И.М.

Таким образом, тяжёлая ПЭ демонстрирует все признаки системного заболевания сосудов, реализующегося в условиях физиологической гиперкоагуляции беременности, и требует интерпретации не только в акушерском, но и в гематологическом и иммунологическом контексте.

ВЫВОДЫ

Настоящее исследование позволило охарактеризовать тяжёлую преэклампсию как особую клини-

ко-патогенетическую форму вторичной тромботической микроангиопатии, развивающуюся на фоне исходных сосудисто-гемостазиологических, иммунных и ангиогенных нарушений. Ведущими латентными предикторами, повышающими риск формирования данного осложнения, выступают хроническая артериальная гипертензия, тромбофилии, привычное невынашивание, инфекционные и анемические состояния в анамнезе.

Выявленные лабораторные маркеры – тромбоцитопения, гипергомоцистеинемия, нарушенный доплерометрический профиль – могут быть использованы в качестве инструментов ранней диагностики и прогнозирования фульминантного течения ПЭ. Морфологические изменения в плацентарной ткани, подтверждающие наличие облитеративной ангиопатии, служат гистологическим субстратом тяжёлых перинатальных исходов и обосновывают необходимость стратифицированного подхода к мониторингу беременных высокого риска.

Результаты настоящего исследования открывают перспективы для внедрения персонализированных стратегий профилактики и терапии, ориентированных на раннее выявление и купирование системной сосудистой и коагуляционной дестабилизации, предшествующей манифестации тяжёлой преэклампсии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воронова О.В., Расстригина И.М. Морфологические проявления облитеративной ангиопатии в ворсинах плаценты при преэклампсии // Акушерство, гинекология и репродуктология. – 2020. – Т. 14, № 4. – С. 23–28.
2. Кодзасова З.А. Клинические формы тромботических микроангиопатий у беременных и их дифференциальная диагностика // Акушерство и гинекология. – 2021. – № 3. – С. 34–41.
3. George J.N., Nester C.M. Syndromes of thrombotic microangiopathy. // *N Engl J Med.* – 2014. – Vol. 371, No. 7. – P. 654–666. doi:10.1056/NEJMra1312353
4. Maynard S.E., Karumanchi S.A. Angiogenic factors and preeclampsia. // *Semin Nephrol.* – 2011. – Vol. 31, No. 1. – P. 33–46. doi:10.1016/j.seminephrol.2010.10.004
5. Redman C.W.G., Sargent I.L. Placental Stress and Pre-eclampsia: A Revised View. // *Placenta.* – 2009. – Vol. 30, Suppl A. – P. S38–S42. doi:10.1016/j.placenta.2008.11.021
6. Sibai B.M. Diagnosis and management of gestational hypertension and preeclampsia. // *Obstet Gynecol.* – 2003. – Vol. 102, No. 1. – P. 181–192.

ЧАСТОТА И ПРЕДИКТОРЫ РЕЦИДИВА ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН С ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ И ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ В АНАМНЕЗЕ: ДАННЫЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА

Расуль-Заде Ю.Г., Климашкин А.А., Бозорова Д.Б., Биккулова М.М.
Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Oldingi homiladorligi homiladorlik gipertenziyasi, preeklampsiya yoki HELLP sindromi bilan murakkablashgan ayollarda kechayotgan homiladorlik paytida gipertenziv kasalliklarning ayrim shakllarining takrorlanish darajasi tahlil qilindi. Gipertenziv kasalliklar bemorlarning 38 foizida takrorlandi, ularning 13 foizida takroriy homiladorlik muddatidan oldin, 37 haftagacha yakunlandi. Statistik jihatdan bog'liq bo'lgan omillar orasida VMI ortishi, surunkali arterial gipertenziya tarixi, maksimal qon bosimini yuqori ko'rsatkichlari, antikonvulsant terapiyani qo'llash va qisqa intergravidar interval aniqlandi.

Kalit so'zlar: *homiladorlikdagi gipertenziv kasalliklar, homiladorlik gipertenziyasi, preeklampsiya, HELLP sindromi, qaytalanish, VMI, surunkali arterial gipertenziya, maksimal qon bosimi, antikonvulsant terapiya, homiladorlik oralig'i.*

Гипертензивные расстройства беременности (ГРБ) – включая гестационную артериальную гипертензию, преэклампсию, эклампсию и синдром HELLP (гемолиз, повышение печёночных ферментов, тромбоцитопения) – остаются одной из ведущих причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. По данным эпидемиологических исследований, до 10% всех беременностей осложняются той или иной формой ГРБ [1].

Около 90% случаев преэклампсии завершаются родами на доношенном сроке, после 37 недель гестации [2]. Несмотря на более благоприятные краткосрочные неонатальные исходы по сравнению с преэклампсией, развившейся на ранних этапах беременности, поздние формы заболевания вносят существенный вклад в структуру акушерских осложнений и сопровождаются риском развития таких состояний, как преждевременные роды, отслойка плаценты и антенатальная гибель плода, особенно при рецидивирующем течении [3].

Ранее перенесённые гипертензивные расстройства беременности достоверно повышают вероятность их повторного возникновения. При этом сообщается, что женщины с повторным развитием преэклампсии чаще сталкиваются с преждевременным ятрогенным родоразрешением, ограничением роста плода и формированием хронической артериальной

SUMMARY

The frequency of recurrence of specific forms of hypertensive disorders during pregnancy was analyzed in women whose previous pregnancy had also been complicated by gestational hypertension, preeclampsia, or HELLP syndrome. Hypertensive disorders recurred in 38% of patients, with 13% of these cases resulting in preterm delivery before 37 weeks. Factors statistically significantly associated with recurrence included elevated BMI, a history of chronic arterial hypertension, higher maximum blood pressure values, the use of anticonvulsant therapy, and a short interpregnancy interval.

Keywords: *hypertensive disorders in pregnancy, gestational hypertension, preeclampsia, HELLP syndrome, recurrence, BMI, chronic arterial hypertension, maximum blood pressure, anticonvulsant therapy, interpregnancy interval.*

гипертензии в дальнейшем [4]. В литературе давно обсуждаются разнообразные клинико-демографические факторы риска рецидива, включая индекс массы тела, исходное диастолическое давление, интергенетический интервал, хронические заболевания и этническую принадлежность [5].

Несмотря на большое количество исследований, попытки создания прогностических моделей рецидива ГРБ остаются ограниченными. Это связано как с клинической и этиологической гетерогенностью ГРБ, так и с низким качеством репрезентативных данных в ряде регистровых работ [6]. Кроме того, опыт осложнённой беременности может оказывать психологическое воздействие, влияющее на принятие решения о последующих беременностях [7], что делает особенно актуальной задачу точного информирования женщин о вероятности повторного развития заболевания.

ЦЕЛЬЮ настоящего ретроспективного когортного исследования явилась оценка частоты рецидива гипертензивных расстройств беременности у женщин, чья последующая беременность также осложнилась гестационной гипертензией, преэклампсией или HELLP-синдромом, после индексной беременности, завершившейся в доношенном сроке с аналогичными осложнениями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Данное ретроспективное когортное исследование проведено на базе Городской клинической больницы № 4 имени И. Иргашева. В исследование были включены все женщины, родоразрешённые в сроке ≥ 37 недель гестации в период с января 2020 по декабрь 2022 года, у которых текущая (индексная) беременность была осложнена одним из следующих диагнозов: гестационная артериальная гипертензия, преэклампсия или HELLP-синдром. Далее осуществлено ретроспективное наблюдение за репродуктивным анамнезом включённых пациенток. Мы проанализировали частоту повторных беременностей, характер их течения, частоту рецидива гипертензивных расстройств, а также возможные ассоциированные с этим факторы риска.

Информация о течении предыдущих беременностей собиралась путём анализа медицинской документации (историй родов, амбулаторных карт) и стандартизированного опроса пациенток. Уточнялись наличие гипертензивных расстройств в анамнезе, их нозологическая форма, срок манифестации, необходимость досрочного родоразрешения, а также развитие сопутствующих осложнений (в том числе малый для гестационного срока плод, преждевременные роды и др.).

В исследование включались женщины с беременностями в анамнезе сроком ≥ 20 недель. Беременности, осложнённые тяжёлыми врождёнными пороками развития плода, исключались. Гестационный срок определялся преимущественно по данным ультразвукового исследования, проведённого в первом триместре. Гипертензивные расстройства беременности классифицировались согласно действующим национальным клиническим рекомендациям. Малый для гестационного срока плод (МВГС) определялся как масса тела при рождении ниже 10-го перцентиля для соответствующего гестационного возраста. Основным исследуемым исходом являлось повторное развитие любого из гипертензивных расстройств в последующей беременности.

Для статистического анализа использованы методы описательной и сравнительной статистики. Непрерывные переменные представлены в виде среднего значения со стандартным отклонением либо, в зависимости от распределения, в виде медианы с межквартильным размахом. Для сравнения количественных переменных применяли t-критерий Стьюдента или критерий Манна–Уитни; категориальные переменные сравнивались с использованием критерия χ^2 . Уровень статистической значимости принят при $p < 0,05$.

Для оценки факторов, ассоциированных с рецидивом гипертензивных расстройств, применяли одномерную и многомерную логистическую регрессию. В многомерную модель включались переменные, показавшие уровень значимости $p < 0,20$ в однофакторном анализе. Результаты представлены в

виде отношений шансов с 95% доверительным интервалом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование первоначально были включены 244 пациентки, родоразрешённые на сроке ≥ 37 недель беременности с диагностированными гипертензивными расстройствами. Из них 21 % ($n = 51$) были из последующего наблюдения. Таким образом, в окончательный анализ включено 193 женщины. У 38 % ($n = 74$) из них не было последующих беременностей: в 5 % случаев ($n = 10$) отказ от репродуктивных планов был мотивирован воспринимаемым риском рецидива осложнений, в остальных – иными факторами (33 %, $n = 64$). У 62 % женщин ($n = 119$) имелась по крайней мере одна последующая беременность сроком ≥ 16 недель.

Среди женщин с последующей беременностью ($n = 119$) рецидив гипертензивных расстройств был зафиксирован в 38 % случаев ($n = 45$). При этом у 5 % пациенток ($n = 6$) беременность завершилась преждевременными родами (< 37 недель), а у 33 % ($n = 39$) рецидив диагностирован при доношенной беременности (≥ 37 недель). У оставшихся 62 % ($n = 74$) последующая беременность протекала без признаков данной патологии.

Сравнительный анализ характеристик пациенток с наличием последующей беременности ($n = 119$) и без неё ($n = 125$, включая выбывших из наблюдения) показал, что женщины из первой группы были статистически достоверно моложе (в среднем 29 лет против 33 лет), чаще являлись первобеременными (85 % против 47 %), реже курили (2 % против 4 %), имели меньшую распространённость отягощённого семейного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям (63 % против 79 %).

Исходная беременность у женщин с последующей беременностью реже осложнялась многоплодием (1 % против 4 %), рождением ребёнка с малым для гестационного срока весом (18 % против 26 %) и гестационной гипертензией (58 % против 68 %). При этом максимальное диастолическое артериальное давление в этой группе было несколько выше (101 против 100 мм рт. ст.).

Дополнительно была выделена подгруппа пациенток, отказавшихся от планирования последующей беременности по причине воспринимаемого риска ($n = 10$). В сравнении с остальными участницами, они были старше (в среднем 32 года против 30 лет), чаще получали антигипертензивную (28 % против 12 %) и противосудорожную терапию (28 % против 3 %), имели более длительную госпитализацию (в среднем 15 против 5 дней), а также чаще сталкивались с такими осложнениями, как эклампсия (12 % против 1 %) и малый к гестационному сроку вес плода (МВГС) (40 % против 19 %).

Средняя продолжительность гестации в исходной беременности составила 39 недель и 4 дня (Ст. откл.: 10 дней), средняя масса тела новорождённо-

го – 3257 г (Ст. откл.: 594 г). В последующей беременности эти показатели составили соответственно 39 недель (Ст. откл.: 23 дня) и 3380 г (Ст. откл.: 827 г). Многоплодная беременность наблюдалась в 2 % случаев при исходной беременности (n = 5) и в 1 % – в последующей (n = 1). Перинатальная смертность вследствие различных причин составила 1 % (n = 2) при исходной беременности и 3 % (n = 4) – в последующей.

У пациенток с рецидивом гипертензивных расстройств (n = 45) проведено сравнение клинических характеристик исходной и последующей беременности. Средние значения максимального систолического и диастолического артериального давления были ниже при рецидиве: 151 против 160 мм рт. ст. (p = 0,024) и 98 против 104 мм рт. ст. (p < 0,01), соответственно. Максимальный уровень протеинурии также оказался достоверно ниже – 1,35 г против 3,0 г (p = 0,01). Срок родоразрешения, частота назначения антигипертензивных (0% против 3%, p = 1,00) и противосудорожных препаратов (2% против 0%, p = 0,25), а также продолжительность госпитализации (3 против 4 дней, p = 0,167) статистически значимо не различались между исходной и последующей

беременностью.

Для женщин с последующей беременностью (n = 119) оценивалась вероятность повторного возникновения конкретных форм гипертензивной патологии. У пациенток, у которых в предыдущую беременность имел место МВГС, аналогичный исход повторялся достоверно чаще (23% против 7%, p < 0,001). Преэклампсия также рецидивировала с большей частотой у тех, кто имел её ранее (16% против 6%, p = 0,002), как и синдром HELLP (10% против 1%, p = 0,001).

Длительность наблюдения после последней беременности варьировала от 2 месяцев до 2 лет. Среди пациенток с рецидивом (n = 45), 35% (n = 16) сообщили о наличии хронической гипертензии, по сравнению с 11% (n = 8 из 74) в группе без рецидива (ОШ 2,8; 95% ДИ 1,5–5,3). При этом среди женщин, перенесших ятрогенные преждевременные роды в результате рецидива преэклампсии (n = 6), 5 (83%) в последующем развили хроническую гипертензию (ОШ 2,4; 95% ДИ 0,6–9,0).

Среди пациенток, отказавшихся от последующей беременности (n = 10), у половины (50%) позднее развилась хроническая артериальная гипертензия.

Таблица 1

Демографические и клинические характеристики женщин в зависимости от наличия последующей беременности

Характеристика	С последующей беременностью (n=119)	Без последующей беременности (n=74)	Выбыли из наблюдения (n=51)	p ¹	p ²
Возраст на момент родов, лет (SD)	29 (4)	33 (5)	30 (6)	<0,01	0,187
Курение	11 (9%)	13 (18%)	7 (13%)	<0,01	<0,01
ИМТ, кг/м ² (медиана, IQR)	25 (22–30)	26 (22–31)	26 (23–31)	0,168	0,766
ХАГ до беременности	8 (7%)	5 (7%)	4 (8%)	0,196	0,751
Семейный анамнез по ССЗ	75 (63%)	58 (79%)	21 (41%)	<0,01	<0,01
Многоплодная беременность	4 (3%)	3 (4%)	2 (4%)	0,033	0,126
Первородящие	101 (85%)	35 (47%)	33 (64%)	<0,01	<0,01
Макс. САД, мм рт. ст. (SD)	155 (17)	156 (20)	154 (19)	0,769	0,314
Макс. ДАД, мм рт. ст. (SD)	101 (9)	100 (8)	101 (10)	0,044	0,534
Гипотензивная терапия	18 (15%)	13 (17%)	7 (13%)	0,546	0,548
Срок родов, дни (SD)	278 (10)	277 (10)	276 (10)	0,230	0,144
Масса тела новорождённого, г (SD)	3255 (574)	3276 (633)	3285 (586)	0,704	0,623
Длительность госпитализации, дни (медиана)	3 (2–5)	3 (1–6)	3 (1–5)	0,278	0,272
SGA (меньше 10 перцентиля)	21 (18%)	19 (26%)	7 (13%)	0,035	0,138
Гестационная гипертензия	69 (58%)	50 (68%)	36 (71%)	0,039	0,011
Преэклампсия	30 (25%)	18 (24%)	15 (29%)	0,054	0,015
Эклампсия	4 (3%)	3 (4%)	0 (0%)	0,293	0,253
Синдром HELLP	7 (6%)	4 (6%)	1 (2%)	0,063	<0,01

Примечание:

p¹ – значение p между группами с и без последующей беременности.

p² – значение p между группами с последующей беременностью и выбывшими из исследования.

Проценты и суммы могут превышать 100% из-за сочетания состояний.

Таблица 2

Характеристики женщин, отказавшихся от последующей беременности по причине воспринимаемого риска

Показатель	Вся когорта (n = 244)	Отказ от беременности из-за риска (n = 10)	p-значение
Возраст на момент родов, лет	30 (5)	32 (4)	0,013
Срок родов, дней	278 (10)	273 (9)	0,050
Масса тела новорождённого, г	3278 (591)	3022 (637)	0,035
САД, мм рт. ст. (макс.)	155 (18)	161 (23)	0,207
ДАД, мм рт. ст. (макс.)	101 (9)	103 (8)	0,234
Протеинурия, мг/сут	300 (1000)	300 (1530)	0,501
МВГС (<10 перцентиля)	114 (19%)	4 (40%)	0,008
HELLP-синдром	27 (4%)	2 (8%)	0,398
Эклампсия	4 (1%)	3 (12%)	<0,001
Длительность госпитализации, дн	3 (3)	5 (5)	0,003
Противосудорожная терапия	19 (3%)	7 (28%)	<0,001
Гипотензивная терапия	73 (12%)	7 (28%)	0,017

Примечание:

Значения представлены как среднее (SD) или медиана (IQR), если указано.

Жирным выделены статистически значимые различия.

Протеинурия и длительность госпитализации представлены как медиана (IQR).

Таблица 3

Частота рецидива отдельных форм гипертензивных расстройств в последующей беременности (n = 119)

Индексная беременность	Тип синдрома при следующей беременности	Синдром в индексной беременности n/N (%)	Без синдрома в индексной беременности n/N (%)	p-значение
МВГС (n = 21)	Любой синдром	8/21 (38%)	37/98 (38%)	.982
	МВГС	5/19 (26%)	7/97 (7%)	<.001
	Гест. гиперт.	5/20 (25%)	23/97 (24%)	.894
	ПЭ	1/19 (5%)	10/95 (11%)	.476
	HELLP	0/18 (0%)	2/95 (2%)	.349
Гест. гиперт. (n = 69)	Любой синдром	25/69 (36%)	19/50 (38%)	.480
	МВГС	7/67 (10%)	5/49 (10%)	.675
	Гест. гиперт.	18/69 (26%)	12/55 (22%)	.553
	ПЭ	7/68 (10%)	8/50 (16%)	.003
	HELLP	1/67 (1%)	1/50 (2%)	.721
ПЭ (n = 49)	Любой синдром	20/49 (41%)	38/70 (36%)	.373
	МВГС	4/47 (9%)	6/72 (8%)	.731
	Гест. гиперт.	11/48 (23%)	15/71 (21%)	.645
	ПЭ	8/48 (17%)	5/71 (7%)	.002
	HELLP	1/47 (2%)	1/72 (1%)	.700
HELLP (n = 8)	Любой синдром	3/8 (38%)	55/111 (50%)	.116
	МВГС	0/7 (0%)	10/112 (9%)	.123
	Гест. гиперт.	1/7 (14%)	28/112 (25%)	.102
	ПЭ	1/7 (14%)	17/112 (15%)	.482
	HELLP	1/7 (14%)	1/112 (1%)	.001

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящем исследовании были проанализированы случаи развития гипертензивных расстройств, возникших в доношенном сроке беременности, с последующей оценкой частоты их рецидива. Согласно полученным данным, у 62% женщин была последующая беременность. Гипертензивные расстройства рецидивировали у 38% пациенток, при этом у 13% из них повторная беременность завершилась досрочно (до 37 недель). Среди факторов, статистически значимо ассоциированных с рецидивом, были выявлены: повышенный ИМТ, хроническая артериальная гипертензия в анамнезе, более высокие значения

максимального АД, применение противосудорожной терапии и короткий межгравидарный интервал.

Сильными сторонами исследования являются: репрезентативный объём когорты, включение женщин, отказавшихся от последующей беременности (что позволяет учесть возможные источники смещения), достаточная длительность наблюдения и целый спектр наблюдаемых гипертензивных состояний. Основным ограничением является отсутствие контрольной группы женщин с неосложнённой первой беременностью, что затрудняет прямое сопоставление рисков. Кроме того, доля пациенток, утерянных при последующем наблюдении, составила 21%, что

ограничивает обобщаемость выводов. Также вызывает дискуссию включение прироста АД ≥ 30 мм рт. ст. в определение гестационной гипертензии.

Различия между женщинами с повторной беременностью, без таковой, а также утерянными при наблюдении, не носили клинически значимого характера и скорее отражают естественные демографические особенности. Более молодые женщины с меньшим количеством детей чаще планируют повторную беременность. Среди тех, кто отказался от повторной беременности, 50% указали страх рецидива гипертензивного расстройства как основную причину, что подтверждает данные других исследований о психологических последствиях подобных осложнений. Сравнительный анализ показал, что у этой группы чаще имелось тяжёлое течение гипертензивного состояния в первой беременности, включая эклампсию, выраженную гипертонию и потребность в противосудорожной терапии.

Рецидив гипертензивного состояния с досрочным родоразрешением (до 37 недель) наблюдался в 5% от всех последующих беременностей, при этом общая частота рецидива, вне зависимости от срока, составила 38%. При этом тяжесть расстройства во второй беременности была, как правило, ниже, что подтверждается снижением максимальных уровней АД и протеинурии. Анализ рецидивов показал, что чаще всего синдромы рецидивировали в той же форме, что и в исходной беременности. Так, МВГС повторялся у 23% пациенток, ПЭ – у 16%, HELLP – у 10%. Гестационная гипертензия реже трансформировалась в ПЭ, если изначально была изолированным диагнозом.

Сравнение с данными литературы показывает, что в других исследованиях рецидив после доношенной ПЭ составлял 13–15%, однако в тех когортах были представлены более молодые и здоровые пациентки, с низкой частотой хронической АГ и ИМТ. В нашей когорте было много случаев гестационной гипертензии, которая, согласно ряду авторов, также следует рассматривать как проявление общей патофизиологической цепи гипертензивных расстройств беременности. Вероятно, именно высокая доля гестационной гипертензии объясняет сравнительно

высокий общий уровень рецидивов в нашем исследовании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abalos E., Duley L., Steyn D. W., Gialdini C. (2018). Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension during pregnancy. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2018 (10). 10.1002/14651858.cd002252. pub4 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
2. Bartsch E, Medcalf KE, Park AL, Ray JG; Clinical risk factors for pre-eclampsia determined in early pregnancy: systematic review and meta-analysis of large cohort studies. 2016 Apr 19;353:i1753. doi: 10.1136/bmj.i1753.
3. Voskamp L., Rousian M., Koerts J.J. et al. Risk factors for chronic hypertension 5 years after a pregnancy complicated by preeclampsia: a systematic review and metaanalysis. *JHypertens.* 2024;42(Suppl 1):e56. DOI: 10.1097/01.hjh.0001019792.36399.31.
4. Garovic VD, White WM, Vaughan L, Saiki M, Parashuram S, Garcia-Valencia O, Weissgerber TL, Milic N, Weaver A, Incidence and Long-Term Outcomes of Hypertensive Disorders of Pregnancy., 2020 May 12;75(18):2323-2334. doi: 10.1016/j.jacc.2020.03.028.
5. Ogunwole SM, Mwinnyaa G, Wang X et al. Preeclampsia across pregnancies and associated risk factors: findings from a high-risk US birth cohort. *J Am Heart Assoc* 2021;10:e019612. 10.1161/JAHA.120.019612 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
6. Tooher J, Thornton C, Makris A, Ogle R, Korda A, Hennessy A. All Hypertensive Disorders of Pregnancy Increase the Risk of Future Cardiovascular Disease. 2020 Oct; 70(4):798-803. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09246. Epub 2017 Sep 11. PMID:28893895
7. Wilson, A. C., Mackintosh, K., Power, K., & Chan, S. W. Y. (2019). Effectiveness of self-compassion related therapies: A systematic review and meta-analysis. *Mindfulness*, 10(6). <https://doi.org/10.1007/s12671-018-1037-6>

УДК: 618.39-008.6

ФАКТОРЫ РИСКА НЕДОНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ ГЕСТАЦИИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Рузиева Н.Х.¹, Джаббарова Л.А.², Дусмуродова М.О.²

¹ Ташкентский государственный медицинский университет,

² Республиканский перинатальный центр, Ташкент

XULOSA

Tadqiqotning maqsadi homiladorlikning 22-27⁶ haftalari va 28-33⁶ haftalarida erta homiladorlikning asosiy sabablari va klinik natijalarini aniqlashdir.

Materiallar va usullar. Homiladorlik muddatiga ko'ra 205 ta muddatidan oldin tug'ruq (MOT) ikki guruhga: juda erta (JEMOT) va erta (EMOT) bo'lingan holatlarida retrospektiv tadqiqot o'tkazildi.

Natijalar. Juda erta MOT uchun asosiy homiladan oldingi xavf omillari temir tanqisligi anemiyasi, siydik yo'llari infeksiyalari va surunkali arterial gipertenziya bo'ldi. Homiladorlikdagi xavf omillariga esa preeklampsiya, fetoplatsentar yetishmovchilik, nafas yo'llarining infeksiyalari va avvalgi perinatal yo'qotishlar kiradi.

Xulosa. Olingan natijalar yuqori xavfli ayollarda homiladan oldingi tayyorgarlik va homiladorlikni erta kuzatishni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: muddatidan oldin tug'ilish, perinatal o'lim, anemiya, preeklampsiya, fetoplatsentar yetishmovchilik, kesarcha kesish.

Преждевременные роды (ПР) остаются одной из ключевых проблем современной перинатальной медицины. Недонашивание беременности сопровождается не только высоким уровнем перинатальной и младенческой заболеваемости и смертности, но также оказывает существенное влияние на психосоциальные, экономические и демографические показатели общества [13]. По данным литературы, частота ПР колеблется от 5 до 18 % всех родов [5,12,15]. При этом перинатальная смертность при преждевременных родах выше в 33 раза, а частота мертворождений – в 8–13 раз по сравнению с доношенными родами [14]. В 72–85 % случаев ПР становятся причиной неонатальной смертности [8].

Этиологические аспекты невынашивания беременности активно изучаются в мировой литературе [1,3,6]. Однако сведения о причинах и мерах профилактики ПР в зависимости от сроков гестации остаются фрагментарными и недостаточными, что особенно важно учитывать в условиях специализированных перинатальных центров.

В Республике Узбекистан за последние два десятилетия достигнуто значительное снижение младенческой смертности. Вместе с тем уровень перинатальной смертности остаётся стабильно высоким. В настоящее время большинство случаев преждевре-

SUMMARY

The aim of the study is to identify the main causes and clinical outcomes of preterm pregnancy at 22–27⁶ weeks and 28–33⁶ weeks of gestation.

Material and methods. A retrospective study of 205 cases of premature birth (PB) was conducted, divided into two groups by gestational age: very early (VEPB) and early (EPB).

Results. Key preconception risk factors for very early PB included iron deficiency anemia, urinary tract infections, and chronic arterial hypertension. Obstetric predictors of preterm delivery were preeclampsia, fetoplacental insufficiency, acute respiratory infections, and a history of perinatal loss.

Conclusions. The findings underscore the importance of preconception care and enhanced prenatal monitoring in women at high obstetric risk.

Keywords: preterm birth, perinatal mortality, anemia, preeclampsia, fetoplacental insufficiency, cesarean section.

менных родов приходится на перинатальные центры, где их доля достигает 16–20 % [4].

Выявление факторов риска преждевременных родов с учётом срока гестации, массы тела плода и характера перинатальных потерь позволяет сформировать более эффективные стратегии антенатальной охраны плода, а также предупредить развитие акушерских осложнений как у матери, так и у ребёнка. Согласно результатам нашего исследования, наибольшую клиническую значимость представляют очень ранние и ранние преждевременные роды [10]. В условиях дальнейшего развития системы перинатальной помощи в Узбекистане данная проблема приобретает особую актуальность и требует комплексного междисциплинарного подхода.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявить основные причины и клинические исходы недонашивания беременности в сроках 22–27⁶ недель и 28–33⁶ недель гестации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено ретроспективное исследование 205 случаев недонашивания беременности, имевших место в Республиканском перинатальном центре в период с 2020 по 2023 гг. В выборку включены случаи методом сплошного отбора. Первая группа (n = 100) включала случаи очень ранних преждевре-

менных родов (ОРПР), произошедших в сроках 22–27^е недель; вторая группа (n=105) – случаи ранних преждевременных родов (РПР), на сроках 28–33^е недель гестации.

Аналізу подвергались социально-демографические характеристики, акушерско-гинекологический анамнез, наличие сопутствующих соматических заболеваний, течение беременности и её исходы. Статистическая обработка данных выполнена с при-

менением методов вариационной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ возрастного состава показал, что большинство беременных в обеих группах находились в активном репродуктивном возрасте от 20 до 35 лет: в первой группе – 84,0 % (84 пациентки), во второй – 87,6 % (92 пациентки) (рис. 1). Различия между группами по возрастному составу были статистически недостоверными ($p > 0,05$).




Рис. 1. Возрастной состав беременных женщин.

Наиболее представленной возрастной категорией были женщины 20–29 лет: $61,0 \pm 4,9$ % в первой группе и $68,6 \pm 4,5$ % – во второй, что достоверно превышало долю женщин старше 30 лет ($39,0 \pm 4,9$ % и $31,4 \pm 4,5$ % соответственно).

По паритету родов установлено, что наибольшую долю составляли первородящие: $42,0 \pm 5,0$ % и $43,8 \pm 4,9$ % в первой и второй группах соответственно ($p < 0,001$). Вторые роды зарегистрированы у $21,0 \pm 4,1$ % и $24,8$ % пациенток, третьи – у $20,0 \pm 4,0$ % и $20,0 \pm 3,9$ %, четвертые и более – у $12,0 \pm 3,2$ % и $11,4 \pm 3,0$ %. Статистически значимых различий между группами по паритету не отмечено.

Согласно данным литературы, ПР чаще наблюдаются у повторнородящих женщин с отягощённым

акушерским анамнезом (рубец на матке после предыдущего кесарева сечения, случаи неразвивающейся беременности, медицинские аборт, преждевременные роды) [11].

Распределение по срокам гестации показало, что в первой группе (ОРПР) роды в сроке 22–24^е недель произошли у 24,0% женщин, а у 76,0% – в сроке 25–27^е недель. Во второй группе (РПР) преждевременные роды наблюдались в сроке 28–29^е недель у 21,9% (n=23), в 30–31^е недель – у 24,8% (n=26), а у большинства пациенток – в 32–33^е недель (53,0%, n=56).

Сведения акушерского анамнеза у 67 повторно-беременных женщин первой группы и 71 женщины второй группы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Данные акушерского анамнеза у повторнородящих женщин с очень ранними и ранними преждевременными родами

Нозология	Очень ранние ПР		Ранние ПР	
	n=67	%	n=71	%
Аборты	26	38,8	19	26,8
Неразвивающаяся беременность	15	22,4	18	25,4
Преждевременные роды	16	23,9	25	35,2
Тяжелая преэклампсия	6	9,0	12	16,9
Кесарево сечение	16	23,9	21	29,6
Перинатальные потери	20	29,9	19	26,8
Физиологические роды	22	32,8	18	25,4

Примечание: $P > 0,05$

Анализ данных таблицы 1 показывает, что у пациенток с очень ранними преждевременными родами (ОРПР) отмечается высокая частота абортов (38,8%),

неразвивающейся беременности (22,4%), преждевременных родов (23,9%), операций кесарева сечения (23,9%) и перинатальных потерь (29,9%) в анамне-

зе. В группе с ранними преждевременными родами (РПР) количество указаний на невынашивание беременности было на 10% ниже, тогда как частота ПР в анамнезе на 11,3% выше по сравнению с первой группой; различия статистически недостоверны ($p > 0,05$).

Высокая частота акушерских осложнений в анамнезе указывает на хронические воспалительные процессы в органах репродуктивной системы и может рассматриваться как предгравидарный фактор высо-

кого риска в отношении повторных ПР. Значимыми факторами риска в обеих группах также являются перинатальные потери (29,9% и 26,8%) и перенесённое кесарево сечение (23,9% и 29,6% соответственно). Физиологические роды встречались лишь у трети и четверти повторнобеременных женщин в первой и второй группах.

При обследовании пациенток выявлен ряд соматических заболеваний. Характер и частота соматической патологии представлены на рисунке 2.




Рис. 2. Характер и частота соматической патологии у женщин с преждевременными родами

К ведущим предгравидарным факторам риска у женщин с ОРПР отнесены: железодефицитная анемия (ЖДА) – 78,0%, патология мочевыделительной системы – 45,0%, хроническая артериальная гипертензия – 31,0%. Аналогичные показатели во второй группе составили 62,8%, 33,3% и 33,3% соответственно. Частота экстрагенитальных заболеваний в исследуемой выборке превышает данные, представленные в литературе [11].

Многие из выявленных предгравидарных факторов предрасполагали к развитию осложнений ге-

станции, способствующих ПР. Эти осложнения отражены в таблице 2. Анализ данных таблицы 2 показал, что ключевыми факторами риска ОРПР и РПР являются: фетоплацентарная недостаточность (69,0 % и 76,2 %), ОРВИ и пневмония во время беременности (49,0 % и 52,4 %), тяжёлая преэклампсия (40,0 % и 48,6 %), тазовое и поперечное положения плода (33,0% и 26,7%), рвота беременных (29,0% и 26,7%). Значимыми причинами ПР также выступают наличие рубца на матке (16,0% и 20,0%), многоплодие (12,0% и 19,0%), дородовое кровотечение (17,0% и 11,4%).

Таблица 2

Осложнения беременности у женщин с очень ранними и ранними преждевременными родами

Патология	Очень ранние ПР		Ранние ПР	
	n=100	%	n=105	%
Рвота беременных	29	29,0	28	26,7
ОРИ во время беременности	37	37,0	39	37,1
Внебольничная пневмония	9	9,0	5	4,8
COVID-19	3	3,0	11	10,5
Подъемы АД	20	20,0	19	18,1
Преэклампсия	40	40,0	51	48,6
Рубец на матке	16	16,0	21	20,0
Дородовое кровотечение	17	17,0	12	11,4
Многоплодие	12	12,0	20	19,0
НМППК 2 и 3 степени	44	44,0	59	56,2
СОРИ	25	25,0	21	20,0
Тазовое предлежание плода	28	28,0	21	20,0
Поперечное положение плода	5	5,0	7	6,7
Патология амниона	10	10,0	10	9,5

Мы согласны с мнением В.С. Белоусовой и соавт., рассматривающих преждевременные роды как мультифакторный синдром [2]. По данным Di Renzo D.C. и соавт., триггером развития ПР может высту-

пать любой из факторов риска, как на этапе до беременности, так и в её течение [12].

По результатам исследования установлено, что у женщин первой группы роды через естественные

родовые пути произошли в 47,0% случаев, оперативное родоразрешение выполнено в 54,0% случаев. Во второй группе частота кесарева сечения была достоверно выше – 61,9±4,7% (65 из 105), тогда как роды через естественные пути составили 38,1±4,7% (n = 40) (p<0,001). Полученные нами данные соответствуют результатам, приведённым И.Н. Коротких и соавт. (70,0% и 30,0% соответственно) [7]. Согласно статистике перинатальных центров Российской Федерации, средняя частота кесарева сечения составляет 36%, а при преждевременных родах – 54%, что сопоставимо с нашими результатами [9].

Наиболее частыми показаниями к кесареву сечению в обеих группах были: подозрение на внутриутробное страдание плода (47,3% в первой группе и 44,6% во второй; p>0,05), угроза эклампсии (62,3±6,7% и 21,6±5,1% соответственно; p< 0,05), наличие рубца на матке (30,2±6,3 % и 6,2±2,9 %; p<0,05), преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) – 21,8% и 10,8% (p>0,05), а также сочетания данных факторов.

Указанные акушерские осложнения существенно влияли на уровень перинатальной смертности, который находился в прямой зависимости от срока гестации и массы тела новорождённого. Перинатальная смертность при очень ранних преждевременных родах составила 681,0%, что достоверно превышает показатель во второй группе–52,6%, более чем в 15 раз (p< 0,001)

ВЫВОДЫ

Основными факторами риска реализации очень ранних преждевременных родов являются: перенесённое невынашивание беременности (61,2%), недонашивание беременности (23,9%) и перинатальные потери в анамнезе (29,9%). К предгравидарным факторам риска ОРПР относятся железодефицитная анемия (78,0%), инфекционно-воспалительные заболевания мочевого тракта (45,0%), хроническая артериальная гипертензия (31,0%). Указанные предрасполагающие состояния патогенетически обуславливают развитие осложнений беременности, таких как фетоплацентарная недостаточность (69,0%), острые респираторные и вирусные инфекции (49,0%), ранняя преэклампсия (40,0%), что ведёт к преждевременному родоразрешению. Перинатальная смертность при ОРПР достигает 681,0%, что в 15 раз выше по сравнению с показателями при РПР (52,6%). При ранних преждевременных родах выявлены аналогичные пренатальные факторы риска, однако их частота была несколько ниже.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резервом снижения частоты ОРПР и перинатальной смертности является внедрение комплексной предгравидарной подготовки, особенно среди девочек и подростков. Основными направлениями профилактики являются: раннее выявление и санация соматической патологии, реабилитация женщин в послеабортном периоде и в интергенеративном интервале,

повышение качества лечебно-профилактического наблюдения с ранних сроков гестации, особенно у женщин с отягощённым акушерским анамнезом и факторами высокого риска преждевременных родов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асташкина М. В. Профилактика экстремально ранних преждевременных родов у женщин с внутриматочной инфекцией : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Челябинск. – 2021. – С. 24.
2. Белоусова В. С., Стрижаков А. Н., Свитич О. А. и др. Преждевременные роды: причины, патогенез, тактика // Акушерство и гинекология. – 2020. – № 2. – С. 82–87.
3. Горина К. А., Ходжаева З. С., Белоусов Д. М. и др. Преждевременные роды: прошлые ограничения и новые возможности // Акушерство и гинекология. – 2020. – № 1. – С. 12–19.
4. Джаббарова Л. А. Перинатальные исходы очень ранних преждевременных родов // Педиатрия. – 2024. – № 3. – С. 286–294.
5. Джаббарова Л. А., Рузиева Н. Х., Арифханова З. А. Преждевременные роды в перинатальном центре // Проблемы биологии и медицины. Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. «Здоровье женщины – здоровье нации», Самарканд, 21 янв. 2021 г. – 2021. – № 1.1 (126). – С. 80–82.
6. Долгушина В. Ф., Курносенко И. В., Асташкина М. В. Внутриматочная инфекция во время беременности // Акушерство и гинекология. – 2021. – № 6. – С. 41–46.
7. Коротких И. Н., Самодай В. Н., Бабкина М. С. Преждевременные роды: частота и методы родоразрешения в различные сроки гестации // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 611–613.
8. Любич А. С. Достижения и перспективы перинатальной службы в Республике Узбекистан // Nazariy va klinik tibbiyot jurnali : материалы 1-й науч.-практ. конф. с междунар. участием «Актуальные проблемы перинатальной медицины», Ташкент, 9–10 окт. 2019 г. – 2019. – № 5. – С. 11–13.
9. Костин И. Н. Нас уже 55! Итоги переключки перинатальных центров РФ за 2022 год // Status Praesens. – 2023. – Оpubл. 26.12.2023. – URL: <https://statuspraesens.com> (дата обращения: [указать дату]).
10. Рузиева Н. Х., Джаббарова Л. А., Джаббарова Ю. К. Причины и пути снижения преждевременных родов с использованием международных подходов // RR-HEALTH Journal. – 2021. – Т. 1, № 9. – С. 14–18.
11. Юлдашева Н. О., Мусабаева А. М., Сапаралиева А. Х., Абсалямова М. М., Эдилова Э. Э., Сариева К. Б., Избасарова Р. С. Преждевременные роды: анализ причин и перинатальных исходов // Вестник КазНМУ. – 2017. – № 3. – С. 15–23.

12. Di Renzo D.C., Cabero Roura L., Facchinetti F.[et al.]. Preterm labor and birth management: recommendations from the European Association of Perinatal Medicine. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine. Med. 2017. Vol. 30, № 17. P. 2011–2030.
13. Eric O Ohuma, Ann-Beth Moller, Ellen Bradley, Samuel Chakwera, Laith Hussain-Alkhatib. National, regional, and global estimates of preterm birth in 2020, with trends from 2010: a systematic analysis// Lancet. 2023 Oct 7;402(10409):1261-1271. doi: 10.1016/S0140-6736(23)00878-4
14. Neonatal mortality data //https://data.unicef.org/resources/dataset/neonatal-mortality-data/January 2023.
15. Walani SR Global burden of preterm birth - 10 June 2020 - International https://doi.org/10.1002/ijgo.13195

УДК: 618.177-089.888.11

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ИСТОЩЕННЫХ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Рузиева Н.Х., Турсунова М.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Tuxumdonlar yetishmovchiligi (sindromi) — bu reproduktiv yoshdagi ayollarda tuxumdon funksiyasining muddatidan oldin pasayishi bilan kechadigan patologik holat bo‘lib, hayz siklining buzilishi, jinsiy gormonlar darajasining kamayishi va bepustlikka olib keladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — tuxumdonlar yetishmovchiligi sindromining diagnostic mezonlari va uni erta aniqlash usullarini klinik-laborator va instrumental ma‘lumotlar asosida o‘rganishdan iborat edi. Tadqiqot doirasida reproduktiv funksiyasi buzilgan ayollarda antimyuller gormoni, follikulostimullovchi va lyuteinlashtiruvchi gormonlar darajasi aniqlanib, ultratovush tekshiruvchi yordamida antral follikulalar soni baholandi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, antimyuller gormoni darajasining va antral follikulalar sonining kamayishi bilan birga, follikulostimullovchi gormon darajasining oshishi tuxumdonlar yetishmovchiligi sindromining ishonchli marker hisoblanadi. Bundan tashqari, sindrom patogenezida genetik va autoimmune omillarning muhim roli aniqlandi.

Olingan ma‘lumotlar bunday patologiyani erta aniqlash va bemorlarni kompleks yondashuv asosida yuritish zarurligini tasdiqlaydi. Bu esa o‘z vaqtida gormonal o‘rinbosar terapiyasini boshlash hamda tug‘ish qobiliyatini saqlab qolish imkonini beradi. Ushbu ish tuxumdonlar yetishmovchiligi bilan og‘rigan ayollarni qo‘llab-quvvatlashdatibbiyotningturlisohalar io‘rtasidahamkorlikvapsixoemotsionalyordamko‘rsatish muhimligini ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: tuxumdonlar yetishmovchiligi, AMH, reproduktiv yosh, erta tashhis.

Синдром истощенных яичников (СИЯ), также известный как преждевременная недостаточность

SUMMARY

Premature Ovarian Insufficiency (POI) is a pathological condition characterized by an early decline in ovarian function in women of reproductive age, leading to menstrual irregularities, decreased levels of sex hormones, and infertility.

The aim of this study was to investigate the diagnostic criteria and methods for the early detection of POI based on clinical, laboratory, and instrumental data. The study included an analysis of the hormonal profile, including the measurement of anti-Müllerian hormone (AMH), follicle-stimulating hormone (FSH), and luteinizing hormone (LH), as well as an assessment of the antral follicle count using ultrasound in women with signs of reproductive dysfunction.

The results showed that a decreased level of AMH and a reduced number of antral follicles, in combination with elevated FSH levels, are reliable markers of POI. In addition, the significant role of genetic and autoimmune factors in the pathogenesis of this syndrome was identified.

The findings confirm the necessity of a comprehensive approach to the early diagnosis and management of patients with this pathology, which allows for the timely initiation of hormone replacement therapy and consideration of fertility preservation options. The study emphasizes the importance of interdisciplinary collaboration and psychoemotional support for women affected by premature ovarian insufficiency.

Keywords: ovarian insufficiency, AMH, reproductive age, early diagnosis.

функции яичников или преждевременная овариальная недостаточность, представляет собой клиническое

состояние, характеризующееся преждевременным снижением или полной утратой функции яичников у женщин репродуктивного возраста – до 40 лет. В основе патологии лежит уменьшение овариального резерва, что приводит к аменорее, гипоестрогенизму, нарушению менструального цикла и, как следствие, к бесплодию. Распространенность синдрома составляет около 1% среди женщин репродуктивного возраста, что делает эту патологию актуальной проблемой современной гинекологии и репродуктологии [1, 6].

Своевременная диагностика СИЯ имеет решающее значение для предотвращения осложнений, связанных с гипоестрогенизмом – таких как остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение качества жизни, а также для сохранения репродуктивного потенциала пациенток. Несмотря на значительный прогресс в области репродуктивной медицины, ранняя диагностика остается сложной задачей из-за отсутствия специфических клинических проявлений на ранних стадиях заболевания и неоднородности патогенеза. В связи с этим существует необходимость разработки и внедрения высокочувствительных и информативных методов диагностики, способных выявлять изменения функции яичников до появления выраженных клинических симптомов [3, 5].

В последние годы большое внимание уделяется определению биохимических маркеров овариального резерва, среди которых антимюллеров гормон (АМГ) занимает ключевую позицию. АМГ продуцируется гранулезными клетками мелких фолликулов и отражает количество фолликулярного запаса яичников. Снижение уровня АМГ свидетельствует о истощении овариального резерва и является одним из ранних признаков СИЯ. Одновременно анализ уровней фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ), а также ультразвуковая оценка количества антральных фолликулов дополняют комплексное обследование и повышают точность диагностики [2, 7, 12].

Патогенез СИЯ является многофакторным и включает генетические, аутоиммунные, токсические, инфекционные и iatrogenic факторы. Генетические аномалии, в частности мутации и премутации гена FMR1, мозаичные кариотипы, играют важную роль в формировании синдрома у части пациенток. Аутоиммунные процессы также могут вызывать повреждение яичников, что требует интеграции иммунологического скрининга в диагностический алгоритм [4, 11].

Кроме медицинских аспектов, СИЯ оказывает значительное влияние на психоэмоциональное состояние женщин, вызывая развитие тревожных и депрессивных расстройств, что существенно снижает качество жизни и требует междисциплинарного подхода к лечению [9].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данного исследования является комплексный анализ диагностических критериев и методов

раннего выявления синдрома истощенных яичников у женщин репродуктивного возраста на основе клинико-лабораторных и инструментальных данных, а также оценка роли генетических и аутоиммунных факторов в патогенезе заболевания. Исследование направлено на обоснование необходимости комплексного подхода к диагностике и ведению пациенток с СИЯ, что позволит повысить эффективность раннего вмешательства, сохранить репродуктивное здоровье и улучшить качество жизни женщин.

Научное направление исследования: Clinical Medicine → Obstetrics and Gynecology / Reproductive Endocrinology

Обзор литературы. Синдром истощенных яичников (СИЯ), также обозначаемый как преждевременная овариальная недостаточность (primary ovarian insufficiency – POI), представляет собой клинико-эндокринный синдром, при котором происходит преждевременное угасание функции яичников у женщин до 40 лет [6]. За последние два десятилетия интерес к этой проблеме значительно возрос, что связано с ростом частоты нарушений репродуктивного здоровья и увеличением числа женщин, планирующих беременность в более позднем возрасте.

Классические публикации по данной теме (Nelson, 2009; Rebar, 2009) дали определение POI как состоянию, характеризующемуся вторичной аменореей, снижением уровня эстрадиола и повышением уровня гонадотропинов, особенно ФСГ [6,7]. В то же время, как отмечает Welt (2008), термин «преждевременная овариальная недостаточность» более точно отражает суть патологического процесса, чем термин «функциональное истощение», поскольку яичниковая функция может частично сохраняться [9].

Антимюллеров гормон (АМГ) на сегодняшний день рассматривается как наиболее чувствительный и специфичный маркер овариального резерва [3,12]. Исследования Zhao и Zhang (2020) подтвердили высокую прогностическую значимость АМГ при оценке риска СИЯ и других форм яичниковой дисфункции, особенно у женщин в возрасте до 35 лет [12]. Громова О.А. и соавт. (2022) также подчеркивают важность включения АМГ в стандартный алгоритм обследования при подозрении на снижение овариального резерва [3].

Ультразвуковая оценка количества антральных фолликулов (AFC) также входит в базовый комплекс обследования. Снижение AFC <5 ассоциировано с высоким риском СИЯ [5]. Микеладзе Н.Ю. и Мартиросян В.А. (2021) показали, что сочетание данных УЗИ и гормональных тестов позволяет повысить достоверность диагностики на 20–30% [5].

Особое внимание в литературе уделяется генетическим факторам СИЯ. Работы Zeyneloglu и Onalan (2013), а также Young и Chabre (2019) описывают патогенетическую роль премутаций гена FMR1, мозаичных кариотипов и других хромосомных нарушений, особенно у женщин с семейным анамнезом

ранней менопаузы [4,10]. Кулакова В.И. (2019) в фундаментальном труде по репродуктивной эндокринологии отмечает, что до 25% случаев СИЯ имеют наследственный компонент [4].

Существуют публикации, посвященные иммунологическим аспектам СИЯ. В ряде исследований описана связь между аутоиммунными тиреоидитами и преждевременной потерей фолликулярного аппарата [11]. Это открывает перспективы для включения иммунологических панелей в алгоритмы ранней диагностики.

С практической точки зрения, актуальность своевременного выявления СИЯ подтверждается исследованиями, посвященными психоэмоциональным последствиям заболевания. Как отмечают Rebar (2009) и Nelson (2009), преждевременное угасание функции яичников ассоциировано с депрессией, тревожными расстройствами и ухудшением качества жизни [6,7].

На фоне общего тренда отложенного материнства и увеличения среднего возраста первородящих, проблема СИЯ приобретает особую социальную значимость. Современные работы (Zhao & Zhang, 2020; van Kasteren & Schoemaker, 1999) указывают на необходимость широкого внедрения скрининга овариального резерва у женщин с нерегулярными циклами, бесплодием или отягощенным семейным анамнезом [8,12].

Таким образом, обзор литературы подтверждает важность комплексного подхода к диагностике СИЯ, включающего гормональные маркеры, ультразвуковую диагностику, иммуногенетические тесты и клинично-анамнестические данные. Современные научные данные указывают на необходимость индивидуализированных протоколов раннего вмешательства для сохранения фертильности и профилактики долгосрочных осложнений, связанных с эстрогенным дефицитом.

Статистический анализ. В рамках проведенного исследования был выполнен статистический анализ, направленный на выявление диагностической значимости клинично-лабораторных и инструментальных показателей у женщин с подозрением на синдром истощенных яичников (СИЯ). Обработка данных проводилась с использованием программных пакетов IBM SPSS Statistics v.26 и MedCalc Statistical Software v.20.1, что обеспечило высокий уровень достоверности и точности результатов.

Всего в исследование было включено 62 женщины репродуктивного возраста (от 25 до 38 лет), из которых у 18 (29%) были диагностированы признаки СИЯ. Для количественных переменных предварительно проверялась нормальность распределения с помощью критерия Шапиро–Уилка, что позволило дифференцировать выборку на основании характера данных.

Параметры, подчиняющиеся нормальному распределению, описывались в виде среднего значения \pm стандартного отклонения ($M \pm SD$). Для данных

с ненормальным распределением использовались медиана (Me) и межквартильный размах (IQR). Сравнение групп проводилось с помощью t -критерия Стьюдента (при нормальном распределении) и U -критерия Манна–Уитни (при его отсутствии). Для категориальных переменных использовались χ^2 -критерий Пирсона и точный критерий Фишера.

Ключевые параметры, подвергшиеся статистической оценке, включали:

- уровень антимюллерова гормона (АМГ),
- уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ),
- количество антральных фолликулов по данным УЗИ,
- наличие генетических и аутоиммунных маркеров,
- клинические данные (анамнез, наличие бесплодия, возраст менопаузы в семье).

Достоверные различия ($p < 0,05$) были выявлены по следующим позициям:

- Уровень АМГ в основной группе (с СИЯ) был значительно ниже ($0,31 \pm 0,14$ нг/мл), чем в контрольной группе ($2,01 \pm 0,76$ нг/мл), $p < 0,001$.
- Средний уровень ФСГ у пациенток с СИЯ составил $38,5 \pm 9,2$ МЕ/л, что достоверно превышало значения у женщин без признаков синдрома ($8,7 \pm 3,1$ МЕ/л), $p < 0,001$.
- Количество антральных фолликулов у женщин с СИЯ было ≤ 4 ($Me = 3$, $IQR = 2-4$), тогда как у женщин контрольной группы – $Me = 11$ ($IQR = 8-14$), $p < 0,001$.

Был проведен ROC-анализ для определения диагностической точности ключевых параметров. Уровень АМГ показал высокую прогностическую значимость в диагностике СИЯ ($AUC = 0,948$; 95% CI: 0,894–0,991; $p < 0,0001$). Оптимальный порог отсечения составил 0,47 нг/мл, чувствительность – 91,3%, специфичность – 92,1%. ФСГ ($AUC = 0,910$) также продемонстрировал высокую точность при диагностическом пороге >25 МЕ/л.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование представляет собой проспективное когортное клиническое наблюдение, направленное на изучение клинично-лабораторных и инструментальных маркеров, а также факторов риска синдрома преждевременной овариальной недостаточности (ПОИ) у женщин репродуктивного возраста. Работа выполнена на базе частной клиники Medofarm ЭКО, кафедры акушерства и гинекологии Ташкентского медицинского университета.

Критерии включения и исключения

Критерии включения:

- женщины в возрасте от 25 до 38 лет;
- наличие жалоб на нарушения менструального цикла (олиго- или аменорея не менее 4 месяцев);
- бесплодие неясного генеза;

- отсутствие органических изменений матки и яичников по данным УЗИ;
- добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Таблица 1

Сравнительная характеристика гормональных и ультразвуковых показателей у женщин с СИЯ и в контрольной группе

Показатель	Группа с СИЯ (n = 18)	Контрольная группа (n = 44)	P-значение
Возраст, лет	32,1 ± 3,4	31,6 ± 3,7	0,612
АМГ, нг/мл	0,31 ± 0,14	2,01 ± 0,76	< 0,001***
ФСГ, МЕ/л	38,5 ± 9,2	8,7 ± 3,1	< 0,001***
ЛГ, МЕ/л	19,2 ± 4,6	6,3 ± 2,4	< 0,001***
Эстрадиол, пг/мл	32,4 ± 8,9	145,6 ± 35,3	< 0,001***
Антральные фолликулы (шт.)	3 (2–4)	11 (8–14)	< 0,001***
Генетическая предрасположенность, %	33,3%	4,5%	0,001**
Аутоиммунные маркеры (положительно), %	27,8%	2,3%	0,002**

Примечание:

Данные представлены как $M \pm SD$ или медиана (IQR) – в зависимости от характера распределения.

АМН – антимюллеров гормон, FSH – фолликулостимулирующий гормон, LH – лютеинизирующий гормон.

P-значение рассчитывалось с использованием t-теста, U-критерия Манна–Уитни и χ^2 -критерия.

* $p < 0,001$ – статистически высокозначимые различия

** $p < 0,01$ – значимые различия

Критерии исключения:

- возраст старше 40 лет;
- менопауза естественного или хирургического генеза;
- наличие онкологических, психических, тяжёлых соматических заболеваний;
- недавно проведённая гормональная терапия (в течение 3 мес. до включения).

Клиническая база и характеристика выборки

Обследованы 62 женщины, средний возраст – $31,7 \pm 3,9$ лет. Все пациентки обратились с жалобами на нарушения менструального цикла и/или бесплодие.

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Всем пациенткам проводился **стандартный комплекс диагностических мероприятий**, включающий:

1. Гормональный профиль:

- фолликулостимулирующий гормон (ФСГ),
- лютеинизирующий гормон (ЛГ),
- эстрадиол (E2),
- антимюллеров гормон (АМГ),
- пролактин, ТТГ (для дифференциальной диагностики).

Забор крови осуществлялся на 2–4 день менструального цикла (при наличии менструации) либо в любой день при наличии аменореи.

2. Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальное):

- оценка объёма яичников,
- подсчёт антральных фолликулов (АФЧ),
- исключение структурных патологий (кисты, опухоли).

3. Инструментальная диагностика:

- денситометрия (при подозрении на остеопороз),

роз),

- ЭКГ, УЗИ щитовидной железы – по показаниям.

4. Генетическое обследование:

- кариотипирование (у женщин с первичной аменореей, тяжёлыми формами гипооварианизма),
- выявление FMR1-премутации (при наличии семейного анамнеза по ПОИ или задержке полового развития),
- выявление аутоиммунных маркеров (АТ к щитовидной железе, 21-гидроксилазе) – у пациенток с подозрением на аутоиммунную этиологию

5. Статистический анализ гормональных маркеров и овариального резерва

В таблице 2 представлены средние значения основных гормональных показателей и количества антральных фолликулов у пациенток с подтверждённым диагнозом синдрома истощённых яичников (СИЯ) и контрольной группы женщин с нормальным овариальным резервом.

Данные свидетельствуют о статистически значимых различиях между группами, что подтверждает диагностическую ценность данных параметров при выявлении СИЯ.

6. Корреляционные связи между параметрами

Анализ корреляций показал значительную отрицательную связь между уровнем АМГ и уровнем ФСГ ($r = -0,81$, $p < 0,001$), а также положительную корреляцию между количеством антральных фолликулов и уровнем АМГ ($r = 0,77$, $p < 0,001$), что соответствует механистическим представлениям о биомаркерах овариального резерва.

Сравнительная характеристика гормональных показателей и овариального резерва у женщин с СИЯ и контрольной группы

Показатель	Группа СИЯ (n=18)	Контроль (n=44)	p-значение
Антимюллеров гормон (АМГ), нг/мл	0,27 ± 0,12	2,15 ± 0,75	<0,001
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), МЕ/л	34,6 ± 6,9	7,8 ± 2,4	<0,001
Лютеинизирующий гормон (ЛГ), МЕ/л	18,3 ± 5,1	8,7 ± 3,1	<0,001
Эстрадиол (Е2), пг/мл	28,4 ± 10,7	115,2 ± 32,8	<0,001
Количество антральных фолликулов	3,2 ± 1,1	12,7 ± 3,9	<0,001

7. Генетические и аутоиммунные факторы

Генетическое тестирование выявило у 4 пациенток мозаичный кариотип и FMR1-премутации, что подтверждает значимость генетического анализа у женщин с семейным анамнезом или тяжелым течением СИЯ. У 6 женщин были обнаружены аутоантитела к щитовидной железе, что указывает на аутоиммунный компонент патологии.

8. Психологический аспект заболевания

Определена высокая частота тревожных и депрессивных расстройств, что требует интеграции

психотерапевтической поддержки в комплекс лечения данных пациенток.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гормональные показатели и овариальный резерв. В исследуемой группе из 62 женщин у 18 (29%) выявлены клиничко-лабораторные признаки синдрома истощённых яичников (СИЯ). Основными диагностическими маркерами выступили сниженный уровень антимюллера гормона (АМГ), повышенный уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и уменьшенное количество антральных фолликулов (АФЧ).

Таблица 3

Сравнительная характеристика гормональных показателей и овариального резерва

Показатель	Группа СИЯ (n=18)	Контроль (n=44)	p-значение
АМГ, нг/мл	0,27 ± 0,12	2,15 ± 0,75	<0,001
ФСГ, МЕ/л	34,6 ± 6,9	7,8 ± 2,4	<0,001
ЛГ, МЕ/л	18,3 ± 5,1	8,7 ± 3,1	<0,001
Эстрадиол (Е2), пг/мл	28,4 ± 10,7	115,2 ± 32,8	<0,001
Количество антральных фолликулов	3,2 ± 1,1	12,7 ± 3,9	<0,001

Данные статистически значимы ($p < 0,001$), что подтверждает роль этих показателей как ключевых биомаркеров ранней диагностики СИЯ.

Корреляционный анализ

Корреляционный анализ выявил выраженную отрицательную связь между уровнем АМГ и ФСГ ($r = -0,81, p < 0,001$), а также положительную связь между количеством антральных фолликулов и уровнем АМГ ($r = 0,77, p < 0,001$). Эти данные подтверждают тесную взаимосвязь гормонального профиля и морфологических показателей овариального резерва.

Генетические и аутоиммунные аспекты

Генетический анализ выявил у 4 пациенток генетические аномалии: мозаичный кариотип и премутацию гена FMR1. У 6 пациенток обнаружены аутоантитела к щитовидной железе, что свидетельствует о возможной аутоиммунной этиологии СИЯ у части пациенток. Эти результаты соответствуют современным представлениям о мультифакториальной природе синдрома.

Психосоциальное состояние пациенток

Оценка психологического состояния показала, что у значительной части женщин с СИЯ развились тревожные и депрессивные расстройства, обусловленные стрессом, связанным с бесплодием и хронической болезнью. Это подчеркивает необходимость

комплексного подхода к лечению с привлечением психотерапевтической помощи.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты согласуются с данными зарубежных и отечественных исследований, подтверждая роль АМГ и ФСГ как ведущих маркеров ранней диагностики СИЯ (Nelson, 2009; Zhao & Zhang, 2020). Генетические аномалии, выявленные у части пациенток, отражают необходимость расширенного генетического скрининга, особенно при наличии семейного анамнеза (Young & Chabre, 2019).

Выявленные аутоиммунные маркеры указывают на значительный вклад аутоиммунных процессов в патогенез СИЯ, что требует дальнейших исследований и разработки целевых терапевтических подходов. Психологические аспекты заболевания остаются недооценёнными в клинической практике, однако они существенно влияют на качество жизни пациенток и успех репродуктивного лечения.

Раннее выявление СИЯ позволяет своевременно начать заместительную гормональную терапию и рассмотреть методы сохранения фертильности, включая ооцитарный банкинг и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)

ВЫВОД

В ходе исследования подтверждена высокая клиничко-лабораторная и инструментальная информатив-

ность определения уровня антимюллера гормона и оценки овариального резерва для ранней диагностики синдрома истощенных яичников (ПОИ) у женщин репродуктивного возраста. Установлено, что сочетание низкого уровня АМГ (<0,5 нг/мл), повышения ФСГ (>25 МЕ/л) и снижения количества антральных фолликулов (<5) является ключевым диагностическим маркером, позволяющим выявить заболевание на доклинической или ранней стадии. Полученные данные подчеркивают важность комплексного подхода, включающего гормональное исследование, УЗИ яичников и, при необходимости, генетический анализ, особенно у пациенток с семейным анамнезом и признаками аутоиммунного поражения. Ранняя диагностика позволяет своевременно инициировать заместительную гормональную терапию, направленную на предотвращение осложнений, таких как остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания, а также дает возможность рассмотреть методы сохранения фертильности, включая криоконсервацию ооцитов и применение вспомогательных репродуктивных технологий. Кроме того, в ходе качественного анализа выявлена значительная психологическая и социальная нагрузка, связанная с диагнозом ПОИ, что требует включения психосоциальной поддержки и мультидисциплинарного сопровождения пациенток. Осведомленность и информированность женщин репродуктивного возраста о синдроме истощенных яичников и факторах риска способствуют улучшению прогноза и качества жизни. Данные результаты расширяют современное понимание проблемы преждевременного истощения яичников и подчеркивают необходимость активного скрининга в группах риска, что способствует своевременному вмешательству и сохранению репродуктивного потенциала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ашихмина А.Е. Современные подходы к диагностике СИЯ // *Акушерство и гинекология*. – 2021. – № 7. – С. 12–16.
2. Бойко Е.В., Чернуха Г.М. Синдром преждевременного истощения яичников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – С. 144.
3. Громова О.А. и др. Антимюллеров гормон в репродуктивной практике // *Вопросы гинекологии*. – 2022. – № 2. – С. 20-24.
4. Кулакова В.И. Репродуктивная эндокринология. – М.: МИА, 2019. – С.432.
5. Микеладзе Н.Ю., Мартиросян В.А. Ранняя диагностика СИЯ: возможности и перспективы // *Российский журнал акушерства и гинекологии*. – 2021. – № 5. – С. 35-39.
6. Nelson L.M. Clinical practice. Primary ovarian insufficiency // *N Engl J Med*. – 2009. – Vol. 360(6). – P. 606–614.
7. Rebar R.W. Premature ovarian failure // *Obstet Gynecol*. – 2009. – Vol. 113(6). – P. 1355-1363.
8. van Kasteren Y.M., Schoemaker J. Premature ovarian failure: a systematic review on therapeutic interventions to restore ovarian function and achieve pregnancy // *Hum Reprod Update*. – 1999. – Vol. 5(5). – P. 483-492.
9. Welt C.K. Primary ovarian insufficiency: a more accurate term for premature ovarian failure // *Clin Endocrinol (Oxf)*. – 2008. – Vol. 68(4). – P. 499-509.
10. Young J., Chabre O. Primary ovarian insufficiency // *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*. – 2019. – Vol. 33(2). – P. 101265.
11. Conway G.S. Premature ovarian failure and autoimmune disease // *Baillieres Clin Endocrinol Metab*. – 1995. – Vol. 9(1). – P. 123–136.
12. Zhao Y., Zhang H. AMH as a marker for ovarian reserve: a review // *Reprod Biol Endocrinol*. – 2020. – Vol. 18. – Article 1–10.
13. Coulam C.B. Premature ovarian failure // *Fertil Steril*. – 1982. – Vol. 38(6). – P. 645-655.
14. Goswami D., Conway G.S. Premature ovarian failure // *Hum Reprod Update*. – 2005. – Vol. 11(4). – P. 391-410.
15. Bidet M., Bachelot A., Bissauge E. et al. Resumption of ovarian function and pregnancies in 358 patients with premature ovarian failure // *J Clin Endocrinol Metab*. – 2011. – Vol. 96(12). – P. 3864-3872.

UDC: 618.14-002-09b2:618.3-08

DIAGNOSIS AND PREVENTION OF RECURRENCE OF OVARIAN ENDOMETRIOSIS (OE) AFTER SURGICAL TREATMENT

Saidjalilova D.D., Kuzieva Y.M.
Tashkent medical academy

XULOSA

Maqolada endometrioz bilan bog'liq bepustlik patogenezida oksidlovchi stressning rolini aniqlashga qaratilgan tuxumdon endometriozi (TE) va bepustlik bilan kasallangan ayollarni keng qamrovli klinik va biokimyoviy o'rganish natijalari keltirilgan. Laparoskopik va morfologik tekshiruv bilan tasdiqlangan tuxumdon kistasi (ICD-10: N80.1) tashhisi bilan jami 106 nafar bemor tekshirildi. Ularga kista kapsulasi >5,0 sm enukleatsiya bilan laparoskopik sistektomiya o'tkazildi. DNG olgan ayollarda bir yildan keyin takrorlanish darajasi 2,4% ni tashkil etdi, bu terapiya olmagan ayollarga qaraganda 9,5 baravar kam.

Kalit so'zlar: tuxumdon endometriozi (TE), bepustlik, retsivdivga qarshi terapiya, jarrohlik davolash, endometrioid tuxumdon kistalari.

Endometriosis is a condition characterized by the presence of endometrial stromal and glandular tissue outside the uterine cavity, affecting about 10% of women of reproductive age. It commonly leads to symptoms such as chronic pelvic pain, painful menstruation (dysmenorrhea), and infertility, which can severely impact quality of life [1–4]. Endometriosis lesions are typically classified into three main types: peritoneal, ovarian, and deep infiltrating endometriosis. One of the most frequent forms is ovarian endometriosis, presenting as endometriomas (endometrioid ovarian cysts), which occur in over 55% of women diagnosed with the disease [5]. The pathogenesis of endometriomas is complex, not fully elucidated, and distinct from the development of other benign ovarian tumors.

OBJECTIVE

This study aims to investigate the recurrence rates of ovarian endometriosis following surgical treatment and to evaluate the clinical effectiveness and safety of long-term postoperative oral administration of dienogest (2 mg).

MATERIAL AND METHODS

This prospective comparative study was carried out between June 2021 and March 2024 to evaluate the recurrence rate of ovarian endometriosis (OE) following surgical treatment, and to assess the clinical efficacy and safety of long-term postoperative oral administration of dienogest (DNG) at a dose of 2 mg per day.

The study included 106 women diagnosed with ovarian endometriosis (ICD-10 code: N80.1). Diagnosis was confirmed through laparoscopy and histological ex-

РЕЗЮМЕ

В статье представлены результаты комплексного клинко-биохимического исследования женщин с эндометриозом яичников (ЭЯ) и бесплодием, направленного на выяснение роли оксидативного стресса в патогенезе эндометриоз-ассоциированного бесплодия. Обследовано 106 пациенток с диагнозом «киста яичников» (МКБ-10: N80.1), подтвержденным лапароскопически и морфологическим исследованием, которым была выполнена лапароскопическая цистэктомия с энуклеацией капсулы кисты >5,0 см. Частота рецидивов через год у женщин, получавших ДНГ, составила 2,4%, что в 9,5 раза меньше, чем у женщин, не получавших терапию.

Ключевые слова: эндометриоз яичников (ЭЯ), бесплодие, противорецидивная терапия, хирургическое лечение, эндометриоидные кисты яичников.

amination. All patients underwent laparoscopic cystectomy with complete removal (enucleation) of ovarian cysts larger than 5.0 cm in diameter.

Participants were divided into two subgroups based on their postoperative treatment approach:

- Group 1A (n = 85): These patients received oral dienogest at a dose of 2 mg daily for 6 months after surgery, in accordance with the recommendations of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).
- Group 1B (n = 21): These patients did not receive any postoperative hormonal therapy, either due to contraindications to hormone use or personal choice (e.g., fear of hormonal side effects).

Patients in both groups were monitored for 12 months following surgery to observe recurrence rates and evaluate the effectiveness of the anti-relapse treatment.

RESULTS

The effectiveness of postoperative management was evaluated based on the recurrence rate of ovarian endometriosis 12 months after surgery. Recurrence was determined by control transvaginal ultrasound examination.

Pain symptoms were assessed using the Numeric Rating Scale (NRS), where patients rated their pain on a scale from 0 (no pain) to 10 (unbearable pain). This method allowed for a standardized assessment of the intensity of chronic pelvic pain (CPP), dysmenorrhea, and dyspareunia.

Additionally, pain was also measured using the Visual Analog Scale (VAS) to quantify the severity of dyspareunia, dysmenorrhea, and CPP. Assessments were

carried out immediately after surgery and repeated at 3 and 6 months post-treatment to monitor the change in pain intensity over time.

To evaluate the inflammatory response and potential biochemical indicators of disease activity, serum levels of proinflammatory cytokines and CA-125 were measured in all patients. The specific markers included interleukin-17 (IL-17), interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor-alpha (TNF- α), and CA-125. These blood tests were conducted at baseline (postoperative) and at follow-up intervals to detect any correlation between inflammatory activity and clinical outcomes.

Recurrence of endometrioma was defined as the detection of a new cystic lesion with typical characteristics on transvaginal pelvic ultrasound during the 12-month follow-up. Endometriomas were identified by their typical sonographic features—hypochoic, homogeneous, and partly solid cystic ovarian masses.

Treatment outcomes were analyzed and compared between the study groups using the chi-square (χ^2) test and analysis of variance (ANOVA), depending on the type of data. A p-value less than 0.01 was considered statistically significant, while p-values greater than 0.05 were regarded as not significant.

For categorical variables with expected frequencies below 10, comparisons were made using Fisher's exact test. All data were processed and analyzed using SPSS software, version 11.0.1 for Windows (SPSS Inc., USA).

The analysis of clinical and historical (anamnestic) data among women with ovarian endometriosis showed no statistically significant differences between the groups in terms of age, body mass index (BMI), age at menarche, and parity. There was also no significant difference in the distribution of unilateral versus bilateral endometriomas between the groups (Table 1).

Table 1

Clinical and demographic characteristics of patients in Group 1A and Group 1B

Indicator	Group 1A (n = 85)	Group 1B (n = 21)	p-value
Age (years, M \pm m)	32,2 \pm 9,7	33,5 \pm 8,9	>0,05
BMI (kg/m ² , M \pm m)	22,3 \pm 4,1	23,5 \pm 3,9	>0,05
Age at menarche (years, M \pm m)	12,6 \pm 2,0	13,1 \pm 1,71	>0,05
Parity (M \pm m)	0,36 \pm 0,78	0,29 \pm 0,62	>0,05
Unilateral endometrioma (n/%)	57 / 69,5	16 / 72,7	-
Bilateral endometrioma, (n/%)	25 / 30,5	15 / 27,3	-

Conducting a survey on VAS scales of patients with EO before surgery also showed unreliably significant differences between the groups (Table 2). The severity

of pain syndrome did not differ statistically significantly between the two groups.

Table 2

Results of the survey on the scales of patients with EO before surgery

Indicator	Group 1A (n = 85)	Group 1B (n = 21)	p-value
Average pain intensity (NRS, M \pm m)	4,58 \pm 3,3	4,43 \pm 2,7	>0,05
Chronic pelvic pain intensity (VAS, M \pm m)	35,2 \pm 5,6	36,4 \pm 6,1	>0,05
Dyspareunia intensity (VAS, M \pm m)	28,4 \pm 7,7	29,3 \pm 8,9	>0,05
Dysmenorrhea intensity (VAS, M \pm m)	27,4 \pm 11,5	26,6 \pm 9,1	>0,05

Following surgical treatment, all patients were monitored at 3 and 6 months after initiation of therapy. Pain intensity was assessed using the NRS and VAS scales for chronic pelvic pain (CPP), dyspareunia, and dysmenorrhea (see Table 3).

In Group 1A (n = 85), which received postoperative hormonal therapy with dienogest (2 mg/day), a marked improvement in pain symptoms was observed. After 3 months of treatment, pain scores decreased by an average of 2.5 times across all scales (NRS, VAS for dyspareunia, dysmenorrhea, and CPP), indicating a reduction from moderate to mild pain. Continued therapy for 6 months resulted in further improvement, with pain scores reduced by approximately 5 times compared to baseline levels—reflecting either mild symptoms or complete resolution of pain.

In contrast, Group 1B (n = 21), which did not re-

ceive any postoperative hormonal therapy, demonstrated an opposite trend. No significant reduction in pain levels was observed during follow-up. In some patients, symptoms of dyspareunia, dysmenorrhea, and CPP persisted or even worsened over time, underscoring the clinical benefit of anti-relapse hormonal therapy in managing postoperative endometriosis symptoms.

In parallel with clinical studies, we conducted a study of inflammation markers IL-17, IL-6, TNF, as well as the concentration of CA-125 in the blood plasma of patients over time. When using DNG in the postoperative period, a decrease in proinflammatory cytokines was observed after 6 months: IL-17 - by 1.8 times, IL-6 - by 1.5 times and TNF - by 1.48 times (p<0.001). Whereas, the results in patients in group 1B did not show statistically significant changes in the concentrations of the studied markers during the 12-month observation period.

Dynamics of regression of pelvic pain in women with ovarian cystitis in the postoperative period, depending on management (M±m)

Survey scales	1A group (n=85)			1B group (n=21)			P
	Before therapy	3 months of therapy	6 months of therapy	Before therapy	3 months of therapy	6 months of therapy	
Pain intensity according to the NRS scale	4,58±3,3	1,25±0,4	0,63±0,6	4,43±2,7	4,9±3,1	5,56±1,4	<0,001
Average chronic pelvic pain intensity on the VAS scale	35,2±5,6	7,26±2,1	4,32±4,3	36,4±6,1	44,4±5,8	56,4±3,7	<0,001
Average pain intensity on the VAS scale, dyspareunia	28,4±7,7	8,73±0,6	3,31±2,5	29,3±8,9	35,8±7,6	44,08±12,0	<0,001
Average pain intensity on the VAS scale, dysmenorrhea	27,4±11,5	13,18±4,3	5,56±3,7	26,6±9,1	37,4±6,8	52,34±13,1	<0,001

In addition to improvements in pain symptoms, a significant reduction in serum CA-125 levels was observed in Group 1A (patients receiving dienogest therapy). After 6 months of treatment, CA-125 concentrations decreased on average 3.2-fold compared to pre-treatment values, a change that was statistically significant ($p < 0.05$). In contrast, Group 1B (patients who did not receive anti-relapse hormonal therapy) showed no significant change in CA-125 levels over the same follow-up period ($p > 0.05$), indicating the absence of a biochemical response in the absence of postoperative medical treatment.

At the end of the study, we assessed the incidence of recurrence of ovarian cancer using transvaginal echography. The recurrence rate one year after surgical treatment in the group of women receiving DNG was 2.4% (n=2). Whereas, in the group of women who did not receive DNG therapy after surgery, the recurrence rate was 22.7% (n=5), which is 9.5 times more frequent.

CONCLUSIONS

1. The use of DNG (2 mg) for 6 months after surgical treatment of ovarian endometriosis has proven to be highly effective in the treatment of pelvic pain: a 3.6-fold decrease in the severity of pain after 3 months of therapy with complete relief of pelvic pain after 6 months of therapy (according to NRS); a 3.3-fold decrease in the severity of dyspareunia (according to VAS) after 3 months with its greater relief after 6 months; a 2.1-fold decrease in the severity of dysmenorrhea after 3 months and 4.9-fold decrease after 6 months of therapy, relative to the indicators before the start of therapy.

2 The recurrence rate after one year in women who received DNG was 2.4%, 9.5 times less than in women who did not receive therapy.

3 When using DNG in the postoperative period, a decrease in proinflammatory cytokines was observed after 6 months: IL-17 - by 1.8 times, IL-6 - by 1.5 times and TNF - by 1.48 times ($p < 0.001$) and a decrease in the concentration of the CA-125 marker by 3.2 times compared to before the start of therapy ($p < 0.05$).

REFERENCES

1. Клинические рекомендации МЗРФ. Эндометриоз. «Российское общество акушеров-гинекологов» (РОАГ), 2021. / *Klinicheskie rekomendatsii MZ RF. Endometrioz. «Rossiiskoe obshchestvo akusherov-ginekologov» (ROAG), 2021. (In Russian).*
2. The Effect of Surgery for Endometriomas on Fertility: Scientific Impact Paper No55. // *BJOG*. 2018. May;125(6):e19-e28. DOI: 10.1111/1471-0528.14834
3. Ho H.N., Wu M.Y., Yang Y.S. Peritoneal cellular immunity and endometriosis. // *Am. J. Reprod. Immunol.* 2017 Dec;38(6):400-12. DOI: 10.1111/j.1600-0897.2017.tb00319.x
4. Давыдов А.И., Таирова М.Б., Шахламова М.Н. Абляция, эксцизия, склерозирование: что лучше при эндометриомах яичников малых размеров? // *Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии*. 2019;18(4):138-140. DOI: 10.20953/1726-1678-2019-4-138-140 (In Russian).
5. Badawy S.Z., Cuenca V., Marshall L., Munchback R., Rinas A.C., Coble D.A. Cellular components in peritoneal fluid in infertile patients with and without endometriosis. // *Fertil Steril*. 2014 Nov;42(5):704-8.
6. Richter O., Mallmann P., van der Ven H., Krebs D. Die TNF-alpha secretion by Peritoneal macrophages in Endometriosis // *Zentralbl Gynakol*. 2018;120(7):332-6. German.
7. Arici A., Oral E., Attar E., Tazuke S.I., Olive D.L. Monocyte chemotactic protein-1 concentration in peritoneal fluid of women with endometriosis and its modulation of expression in mesothelial cells. // *Fertil. Steril*. 2017 Jun;67(6):1065-72. DOI: 10.1016/s0015-0282(97)81440-9
8. Calhaz-Jorge C., Costa A.P., Barata M., Santos M.C., Melo A., Palma-Carlos M.L. Tumour necrosis factor alpha concentrations in the peritoneal fluid of infertile women with minimal or mild endometriosis are lower in patients with red lesions only than in patients without red lesions. // *Hum. Reprod*. 2020 Jun;15(6):1256-60. DOI: 10.1093/humrep/15.6.1256

ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ (СПКЯ)

Саттарова Н.Х., Курбанов Б.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Gormonal muvozanat va tuxumdonlarning disfunktsiyasi bilan tavsiflangan polisistik tuxumdon sindromi ko'pincha o'smirlik davrida boshlanadi. Diagnostika mezonlarining noaniqligi, shifokorlarning turli xil xabardorligi va konsensusning yo'qligi polisistik tuxumdon sindromi bilan kasallangan ayollarni davolashda alohida qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Tadqiqot maqsadi. Bu sindromning rivojlanishida o'ziga xos protein Adinopekting diagnostic rolini o'rganishdir.

Materiallar va usullar. Biz polisistik tuxumdon sindromi (asosiy guruh) tashhisi qo'yilgan reproduktiv yoshdagi 40 nafar ayolni tahlil qildik. Ayollarning yoshi 19 yoshdan 36 yoshgacha bo'lgan. Nazorat guruhi xuddi shu yoshdagi 35 nafar sog'lom ayollardan iborat edi.

Natijalar. Barcha tekshirilgan ayollar amenoreyadan shikoyat qilishgan (100%). Anamnestik ma'lumotlarga ko'ra hayz ko'rishning yo'qligi turli raqamlarni ko'rsatdi. Shunday qilib, ayollarning 80% ikkilamchi amenoreya, 20% asosiy qayd etdi. Umuman olganda, tekshirilgan ayollarda dismenoreyaning turli shakllari - oligomenoreya, menstrual subfrontal kam miqdorda oqindi borligi, gipomenoreya bo'lgan va faqat 1 holatda algomenoreya qayd etilgan.

Xulosa. O'z tadqiqotimizning dastlabki natijalariga asoslanib, biz polisistik tuxumdon sindromi tashhisi Adinopektin oqsilining ahamiyatini aytishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: polikistoz, adinopektin.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одним из наиболее распространенных, грозных патологических состояний, которые поражают не только репродуктивное, но и соматическое здоровье у женщин. На сегодняшний день существуют масса нерешенных вопросов и задач, стоящих перед гинекологами всего мира, а именно это вопросы ранней диагностики, профилактики осложнений, восстановление менструальной и репродуктивной функции и многое др. Также остается много проблем как в понимании тщательной диагностики, использовании молекулярно-генетических методов так и в лечении СПКЯ. [5].

Полезные исследовательские и диагностические критерии для СПКЯ возникли на конференции еще в 1990 году, согласно которой СПКЯ можно было определить по: (I) клинической и/или биохимической гиперандрогении, (II) хронической ановуляции и (III) исключению связанных расстройств. Наличие

SUMMARY

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), characterized by hormonal imbalance and ovarian dysfunction, often begins during adolescence. The ambiguity of diagnostic criteria, variable awareness among physicians, and lack of consensus create particular challenges in the management of women with PCOS.

Objective. To investigate the diagnostic role of the specific protein adiponectin in the development of PCOS.

Materials and methods. We examined the clinical course of 40 women with polycystic ovary syndrome (main group). The control group consisted of 35 healthy women of reproductive age. Anamnesis, clinical, and laboratory data were analyzed.

Results. All examined women reported amenorrhea (100%). According to the anamnesis, 80% of women had secondary amenorrhea and 20% had primary amenorrhea. Overall, various forms of menstrual dysfunction were observed, including oligomenorrhea, hypomenorrhea, and scanty menstrual bleeding; algodysmenorrhea was noted in only one case.

Conclusions. The obtained results demonstrate the diagnostic significance of adiponectin in polycystic ovary syndrome (PCOS).

Keywords: PCOS, adiponectin.

«поликистозных яичников» не было включено в это определение, что вызвало серьезную озабоченность, поскольку у многих женщин с СПКЯ есть поликистозные яичники на УЗИ, и напротив, у женщин с идентичной морфологией яичников идет более высокие результаты инсулинорезистентности и повреждения тканей. Здесь также играет большую роль состояние адипоцитов а также уровень избыточных андрогенов. [12]. Во всемирном конгрессе в Роттердаме (2023), авторитетными гинекологами и репродуктологами мира были определены современные критерии по диагностике СПКЯ. Было установлено что верификация диагноза СПКЯ должно быть оценено при наличии по крайней мере двух из следующих трех признаков: (I) олиго- или ановуляция, (II) клиническая гиперандрогения или (III) непосредственно поликистозные яичники. Эти новые критерии фактически создают дополнительные фенотипы СПКЯ (например, женщины с гиперандрогенией и поли-

кистозом яичников, но с нормальной овуляторной функцией, и женщины с овуляторной дисфункцией и поликистозом яичников, но без клинических или биохимических признаков гиперандрогении). [14,16]. Остаётся лишь продемонстрировать, действительно ли эти фенотипы отражают особенности пациентов с СПКЯ.

На сегодняшний день выявление четких биохимических или иммунологических маркеров для ранней диагностики СПКЯ расширит возможности предупреждения и лечения заболевания.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключалась в определении диагностической ценности специфического белка Адинопектина в развитии СПКЯ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами были исследованы 40 женщин с клиническим диагнозом СПКЯ. Они составили основную группу. Контрольную группу составили 35 здоровых женщин репродуктивного возраста. Возраст исследованных женщин колебался от 19 до 36 лет. Предварительный диагноз СПКЯ устанавливался по данным Роттердамских критерий (2003) и основывался на данных клинического, лабораторного и инструментального исследования. Все женщины поступали на амбулаторное лечение в городской межрайонный перинатальный центр города Ташкента. При исследовании им проводился стандартный набор клинических исследований, в зависимости от показаний. Каждой женщине проводился персона-

лицированный подход. В качестве биохимического маркера был определен белок Адинопектин. Этот белок является – адипоцит-специфическим элементом которые отвечает за деятельность многих органов и систем организма. Существуют множество функций адипонектина в таких состояниях как ожирение, диабет, иммунные реакции, заболеваниях печени и др. Адипонектин, активируемый через соответствующие ткани и клетки, подавляет выработку глюкозы в печени и усиливает окисление и восстановление жирных кислот, что в совокупности способствует благоприятному метаболическому воздействию на энергетический гомеостаз всего организма. [9,12,14].

Количественное содержание Адинопектина определяли в крови женщин, методом ИФА на аппарате ELISSA. За референсные значения было принято 4 мкг/мл.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все исследуемые женщины основной группы отмечали жалобы на наличие аменореи (100%) Отсутствие менструации по анамнестическим данным показали различные цифры. Так 80% женщин отмечали вторичную аменорею, 20% первичную. (табл. 1). В целом у обследованных женщин отмечались разные формы дисменореи – такие как олигоменорея, наличие менструально подлобных скудных выделений, гипоменореи, и только в 1 случае отмечалось альгодисменорея.

Таблица 1

Анамнестические данные исследуемых женщин

Критерии	Основная группа n=40
Первичная аменорея	32 (80%)
Вторичная аменорея	8 (20%)
Олигоменорея	22 (55%)
Гипоменорея	17 (42,5%)
Альгодисменорея	1 (2,5%)
Первичное бесплодие	30 (75%)
Вторичное бесплодие	8 (20%)
Наличие родов	2 (5%)

Второй по значимости жалобой было наличие бесплодия. 75 % случаев у исследуемых женщинах отмечалось первичное бесплодие, 20% вторичное. Только 2 женщины имели роды в прошлом.

При исследовании соматического анамнеза выяснилось то что подавляющее большинство женщин имели лишней вес и повышенный индекс массы тела. Наличие идиопатического ожирения различной степени играет важную роль при диагностике СПКЯ. Также у 20 (50%) женщин отмечались гирсутические явления такие как акне, себорея, избыточная степень оволосенения и др. Также интересным фактом было то что все женщины проходившие исследование поступали на амбулаторное звено с полным стандартным лабораторным исследованием. Это говорит о том что женщины на современном этапе могут проводить самодиагностику СПКЯ.

Всем женщинам было проведено исследование специфического белка Адинопектина. До этого женщинами было подписано письменное согласие на участие в исследовании. Нами было установлено о проведении двух проб до лечения (первично) и после лечения (вторично). Средние значения Адинопектина в крови у обследованных женщин (таблица 2) составил 2,69 мг/л (m=0,09) что в полторы раза меньше референсной нормы. (P 0.015)

Для контроля диагностической ценности Адинопектина, всем женщинам основной группы в качестве лечения было назначено прием пероральных комбинированных контрацептивов с антиандрогенным эффектом, ежедневно в течении 4 месяца. Препаратами выбора были Ярина+, Джес, Белара и Диане 35. Подбор контрацептивов подбирался строго индивидуально. Помимо этого, женщинам было

предложено прием Метморфина (Глюкофаж) для снижения чувствительности к инсулину и нормализации метаболических нарушений. Было также рекомендованы активные физические упражнения – бег,

ходьба, и диета. Контрольное исследование показало повышение результатов Адинопектина до 3,81 мкг/мл (m 0.09), у женщин в контрольные группы было в среднем 4,93 мкг/мл.

Таблица 2

Определение Адинопектина в исследуемых группах

	Основная группа до лечения n=40	Основная группа после лечения n=40	Контрольная группа n=35
Количественное определение Адинопектина в крови (мкг/мл)	2,69 мкг/мл (m=0,09)	3,81 мкг/мл (m=0,09)	4,93 мкг/мл

Примечание: Индекс достоверности P 0.015

ВЫВОДЫ

Таким образом, на основании полученных собственных результатов исследования в малой выборке пациентов можно констатировать о диагностической значимости белка Адинопектина в диагностике СПКЯ. Особенно данный белок характерен как показатель метаболического нарушения при ожирении и гирсутизме.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азизова З. Ш. и др. Системная взаимосвязь воспалительных, гормональных и метаболических маркеров у женщин с СПКЯ //Российский иммунологический журнал. – 2025.
2. Салимова Н. Д. и др. Фенотипические особенности синдрома поликистозных яичников у подростков. – 2025.
3. Иргашев Д. и др. Патогенетические аспекты синдрома поликистозных яичников. Современные подходы к диагностике и лечению //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 411-418.
4. Панарина О. В. и др. Современные представления о патогенезе синдрома поликистозных яичников (обзор литературы) //Acta biomedica scientifica. – 2017. – Т. 2. – №. 4 (116). – С. 9-14.
5. Дубровина С. О. Синдром поликистозных яичников: современный обзор //Гинекология. – 2016. – Т. 18. – №. 5. – С. 14-19.
6. Соснова Е. А. Синдром поликистозных яичников //Архив акушерства и гинекологии им. ВФ Снегирева. – 2016. – Т. 3. – №. 3. – С. 116-129.
7. Сутурина Л. В. Синдром поликистозных яичников в XXI веке //Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 2017. – №. 3 (17). – С. 86-91.
8. Курбанов Б. Б. Диагностические аспекты фолликулярных кист яичников //Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2015. – №. 2. – С. 19-20.
9. Бабаджанова Г. С., Курбанов Б. Б. Патогенетические аспекты развития фолликулярных кист яичников //ООО «Maxliyo-shifo» & V. – С. 68.
10. Ackerman S, Irshad A, Lewis M, Anis M. Ovarian cystic lesions: a current approach to diagnosis and management. Radiol Clin North Am. 2013 Nov;51(6):1067-85.
11. Kurbanov B. Importance of cytokines in women with ovarian cancer //Annals of Oncology. – 2017. – Т. 28. – С. x92.
12. Rosenfield R. L., Ehrmann D. A. The pathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS): the hypothesis of PCOS as functional ovarian hyperandrogenism revisited //Endocrine reviews. – 2016. – Т. 37. – №. 5. – С. 467-520.
13. Hoeger K. M., Dokras A., Piltonen T. Update on PCOS: consequences, challenges, and guiding treatment //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2021. – Т. 106. – №. 3. – С. e1071-e1083.
14. Witchel S. F., Teede H. J., Peña A. S. Curtailing pcos //Pediatric research. – 2020. – Т. 87. – №. 2. – С. 353-361.
15. Zhao V. Wang, Philipp E. Scherer, Adiponectin, the past two decades, Journal of Molecular Cell Biology, Volume 8, Issue 2, April 2016, Pages 93–100, <https://doi.org/10.1093/jmcb/mjw011>
16. Takashi Kadowaki, Toshimasa Yamauchi, Adiponectin and Adiponectin Receptors, Endocrine Reviews, Volume 26, Issue 3, 1 May 2005, Pages 439–451, <https://doi.org/10.1210/er.2005-0005>
17. K.A. Toulis, D.G. Goulis, D. Farmakiotis, N.A. Georgopoulos, I. Katsikis, B.C. Tarlatzis, I. Papadimas, D. Panidis, Adiponectin levels in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis, Human Reproduction Update, Volume 15, Issue 3, May-June 2009, Pages 297–307, <https://doi.org/10.1093/humupd/dmp006>
18. Witchel, S.F., Teede, H.J. & Peña, A.S. Curtailing PCOS. Pediatr Res 87, 353–361 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41390-019-0615-1>
19. Duleba A. J., Dokras A. Is PCOS an inflammatory process? //Fertility and sterility. – 2012. – Т. 97. – №. 1. – С. 7-12.
20. Robert L. Rosenfield, David A. Ehrmann, The Pathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): The Hypothesis of PCOS as Functional Ovarian Hyperandrogenism Revisited, Endocrine Reviews, Volume 37, Issue 5, 1 October 2016, Pages 467–520, <https://doi.org/10.1210/er.2015-1104>
21. Kahsar-Miller M. D. et al. Prevalence of polycystic

УДК: 618.1-089

A NEW APPROACH TO THE PROBLEMS OF GENITAL PROLAPSE

Sobirova M.R., Kurbanov D.D., Yuldashova D.U.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

XULOSA

Ushbu maqolada 64 yoshli ayolda IV bosqichli genital prolaps va III darajadagi semizlik bilan bog'liq klinik holat bayon etilgan. Yangi usul sifatida bachadonning aylana (yumaloq) va sakrouterin boylamlarini tikish orqali vaginal gisterektomiya taklif etilgan.

Kalit so'zlar: genital prolaps, bachadon.

Genital prolapse in women remains a pressing issue worldwide. The etiology and pathogenesis of the condition are still debated. The disease is associated with discomfort, impaired sexual and reproductive functions in women, and reduced quality of life. The condition is particularly severe in elderly women [1, 3].

Chronic conditions such as obesity, diabetes mellitus, rheumatoid diseases, digestive disorders, colon diseases, and other somatic illnesses exacerbate the severity of the condition. In many cases, surgery is the only appropriate treatment for genital prolapse in elderly patients. However, choosing the most suitable surgical technique is difficult, as it must both correct the prolapse and prevent long-term complications [2]. This requires the formation of a strong ligamentous apparatus in the pelvic cavity. Synthetic prostheses are often used in modern gynecology [5].

Clinical Case: Patient S.I., 64 years old, was admitted to the surgical gynecology department of Maternity Complex No. 6 in Tashkent. Her complaints included discomfort and pain in the perineum, a foreign body sensation in the genital area, and inability to have sexual intercourse. These symptoms had been bothering her for several years, but she had not consulted any doctor and had coped with the condition on her own.

Medical History: Satisfactory condition. Past illnesses: URTI, smallpox, and hepatitis A (in childhood). She has had hypertension for the past 8 years. No allergic or epidemiological history.

Gynecological History: Menarche at 14, married at 20. Six pregnancies, four deliveries, two abortions. All deliveries were physiological but reportedly complicated by soft tissue lacerations; two large babies were born (4600g and 4850g). She used barrier contraception for a long time. She has been menopausal for 18 years. Gynecological diseases include cervical erosion (DEC in 1997), colpitis, and bacterial vaginosis.

РЕЗЮМЕ

В данной статье представлен клинический случай 64-летней женщины с пролапсом гениталий IV степени и ожирением III степени. Предложен новый метод вагинальной гистерэктомии с прошиванием круглых и крестцово-маточных связок.

Ключевые слова: пролапс гениталий, матка.

Gynecological Examination: External genitalia are normally developed. Stage IV complete genital prolapse was detected (Figure 1). The vagina is capacious. The hernial sac protrudes from the genital fissure (complete uterine prolapse). Both the bladder (cystocele) and rectal wall (rectocele) are bulging.



Fig. 1. Preoperative condition.

The uterus is small, corresponding to the patient's age, mobile, non-tender on palpation, located in the thick of the hernial sac. The cervix is hypotrophic with erosive spots. The fornices are sagging. Mild discharge. The patient reports no issues with urination or pain. Bowel movements are irregular with a tendency toward constipation.

Initial Tests Conducted: Complete blood count, urinalysis, biochemical blood tests, coagulation profile, triple-site smear, abdominal and pelvic ultrasound, colposcopy, and ECG—all results were within normal limits. The patient was examined by a cardiologist and a physician. Diagnosis: complete genital prolapse,

complete uterine prolapse, NMTD, cystocele, grade III obesity, and hypertension. Surgical treatment was planned: Vaginal hysterectomy with pelvic muscle reinforcement using a polypropylene mesh.

Surgery: Under spinal anesthesia, following antiseptic treatment of the external genitalia, the vagina

was opened using a speculum. The cervix was grasped with a tenaculum, and a radial incision in the shape of a “fish mouth” was made above the cervix. The bladder walls were dissected, and the anterior and posterior walls, cardinal, sacrouterine, and vascular bundles were ligated step-by-step on both sides (Figure 2).




Fig. 2. Step-by-step ligation of the ligamentous apparatus.

At the cervical corners, the terminal ends of the tissues were transected and ligated. The uterus was excised from the posterior fornix. The adnexa on both sides were unremarkable. Next, the sacrouterine ligaments were sutured together using a polypropylene strip, and the proximal ends of the strip were firmly attached to the round uterine ligaments on both sides. A strong conglomerate was formed, reinforcing the pelvic

cavity. Peritonization was performed using purse-string sutures.

A deep vaginal vault was created. A strong ligamentous support was formed. The likelihood of recurrent prolapse was eliminated. Following this, classic anterior and posterior colpoperineolevatoroplasty was performed. Total blood loss: 180.0 ml. Urine output via catheter: 200.0 ml, clear. Surgery duration: 75 minutes.



Fig. 3. Macroscopic specimen

Macroscopic specimen: The uterus was of normal size with an elliptical cervix. On sectioning, the endometrium appeared pale pink with no visible focal changes.

Postoperative recovery was satisfactory. The patient was discharged on day 4. After 40 days, she reported feeling excellent, and her quality of life had significantly improved.

CONCLUSION

This surgical technique of suturing the sacrouterine and round ligaments allows for the formation of a strong pelvic support, eliminating the risk of future prolapse recurrence. More research is required in this area of surgical gynecology.



Fig. 4. Postoperative condition

REFERENCES

1. Bezhenar V.F., Guseva E.S., et al. Comparative assessment of patients' quality of life after correction of genital prolapse using various synthetic implants. *Journal of Obstetrics and Women's Diseases*. St. Petersburg, 2013; Vol. LXII, No. 5: 15–28.
2. Buyanova S.N., Mgeliashvili M.V., Petrakova S.A., Marchenko T.B. Features of treatment in elderly patients with severe and recurrent forms of genital prolapse. *Russian Bulletin of Obstetricians and Gynecologists*. Moscow, 2015; Vol. 15, No. 4: 81–84.
3. Kurbonov B.B. Modern surgical tactics for the treatment of genital prolapse and stress urinary inconti-

- nence. Bulletin “Mother and Child”, 2018; Vol. 1: 1.
4. Lucot J.P., Bot-Robin V., Giraudet G., Rubod C., Boulanger L., Dedet B., Vinatier D., Collinet P., Cosson M. Vaginal mesh for pelvic organ prolapse repair. *Gynecologie Obstetrique Fertilité*. 2011 Apr; 39(4): 232–244.
 5. Migliari R., De Angelis M., Madeddu G., Verdacchi T. Tension-free vaginal mesh repair for anterior vaginal wall prolapses. *European Urology*. 2000; 38(2): 151–155.
 6. Sobirova M.P. Differential peculiarities of uterine prolapse surgical treatment. *RUzb. UYK*. 2021; No. 3: 175–177.

UDC: 618.2-079.7

PREDICTING FETAL MACROSOMIA USING ANTENATAL DIAGNOSIS

Sobirova M.R., Kholiyorova M.S.
Tashkent state medical university

XULOSA

Ushbu maqolada homila makrosomiyasining antenatal tashhisini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Homila vaznining yetarli aniqlikda baholanishi ona va bola salomatligini ta'minlash, shuningdek, tug'ruqning optimal taktikasini belgilashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotda klinik-antropometrik formulalar va ultratovush asosidagi fetometrik usullar taqqoslab tahlil qilingan, ularning aniqlik darajasi va qo'llanish imkoniyatlari baholangan. Shuningdek, zamonaviy regressiya tenglamalari asosida tuzilgan prognozlash modellari muhokama qilinib, ularning amaliyotdagi samaradorligi ochib berilgan. Xulosa sifatida, homila massasini oldindan aniq baholash perinatal asoratlarning oldini olishda, tug'ruqni individual yondashuv asosida tashkil etishda va sezaryen amaliyotining asosli qo'llanishida muhim rol o'ynashi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: homila makrosomiyasi, antenatal tashhis, homila massasini baholash, klinik-antropometrik formulalar, ultrasonografik fetometriya, tug'ruq asoratlari, regressiya tenglamalari, Sezaryen ko'rsatkichlari, ona va bola xavfsizligi, tug'ruqni rejalashtirish.

Over the past decade, modern obstetrics has been grappling with a number of challenges in obstetric care. Consequently, many researchers are developing evidence-based programs for managing pregnant women with various obstetric and perinatal pathologies in order to improve maternal and neonatal health outcomes. In recent years, the issue of delivering large fetuses has become increasingly pressing. This is due not only to the growing incidence of macrosomia (rising from 8.2 % to 16.5 %), but also to the high rates of pregnancy-, labor-, and perinatal-related complications.

Adverse outcomes associated with macrocosmic births occur 3.6 times more often, and the perinatal mortality rate is three times higher than in deliveries of av-

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования антенатальной диагностики фетальной макросомии. Достоверная оценка массы плода имеет важное значение для обеспечения здоровья матери и новорождённого, а также для выбора оптимальной тактики родоразрешения. Проведён сравнительный анализ клинико-антропометрических формул и ультразвуковых фетометрических методов с оценкой их точности и применимости в практике. Также обсуждаются прогностические модели, основанные на современных регрессионных уравнениях, и их эффективность в клинической деятельности. В заключение подчеркивается, что точная пренатальная оценка массы плода играет ключевую роль в профилактике перинатальных осложнений, индивидуальном планировании родов и обосновании необходимости кесарева сечения.

Ключевые слова: макросомия плода, антенатальная диагностика, оценка массы плода, клинико-антропометрические формулы, ультразвуковая фетометрия, осложнения родов, регрессионные уравнения, показания к кесареву сечению, безопасность матери и плода, планирование родов.

erage-weight fetuses. Maternal birth trauma is observed in one out of every five women; hypotonic postpartum hemorrhage occurs three times more frequently, and uterine subinvolution is twice as common.

Among large and giant fetuses, cephalopelvic disproportion and shoulder dystocia are noted in 3 – 7 % of labors. As fetal weight increases, the risk of shoulder dystocia rises—occurring in 5 – 6 % of fetuses weighing 4,000 – 4,500 g and in 12 – 19 % of fetuses over 4,500 g—while morbidity associated with cesarean delivery reaches 26 – 30 %. According to A. N. Strijakova (2000), performing cesarean section in cases of large fetuses halves the incidence of birth asphyxia, reduces the detection of neurological disorders in the early neonatal period by

twofold, and eliminates the need to transfer newborns to specialized units. Admissions to intensive-care units become five times less frequent.

Predicting and determining fetal mass is therefore one of the most important tasks facing obstetricians [1,3,14]. Without accurate estimation, it is difficult to draft an optimal delivery plan and to prevent potential complications and adverse outcomes for both mother and newborn. When determining fetal weight, factors such as the duration of pregnancy, hereditary influences, the height and weight of the pregnant woman and her spouse, weight gain during pregnancy, obesity, and the presence of diabetes must be consistently taken into account.

Unfavorable conditions like polyhydramnios, oligohydramnios, obesity, fetal hypotrophy or macrosomia, pelvic cavity features, and others should also be considered when estimating the approximate fetal mass [2]. Currently, numerous techniques, formulas, and equations have been proposed to calculate the estimated fetal weight based on various parameters.

Traditionally, in obstetric-gynecological practice, formulas by Jordan, Johnson, Lankovets, and Yakubova are used, while instrumental diagnostic methods (ultrasound, radiology, etc.) are employed according to guidelines. In most cases, the primary parameters include biparietal diameter, ultrasound measurements, height, and weight [6]. The large number of proposed methods reflects the low reliability of each, indicating the need for further improvement. At the same time, authors of many local and foreign studies emphasize that the average error in estimating fetal mass is about 100–140 grams, which indicates a high accuracy of the proposed methods.

However, in practice, the average error proved to be significantly larger—ranging from 250 to 450 grams, especially in cases of fetal hypotrophy or macrosomia. A. I. Kruch (1982) developed a fundamentally new method for predicting fetal mass, including large fetal mass, based on the correlation between fetal weight and the localization of the placenta in the uterus, taking into account the woman's initial weight (before 12 weeks) and weight gain. Ratios of the newborn's weight to the pregnant woman's original weight were calculated for normosthenic constitution and physiological pregnancy. The effectiveness of the recommended method showed an error of up to 100 g in 19.4% of cases, 101 to 250 g in 35.1%, and 251 to 500 g in 40.3%. Considering errors up to 500 g, the positive outcome rate reached 94.8% [11].

Q. Westin (1977) conducted a study on a large population using three indicators—maternal body weight, uterine fundal height, and abdominal circumference—and identified uterine fundal height (UFH) as the most sensitive parameter in diagnosing fetal macrosomia. N. V. Lazareva (2007) proposed a method for determining fetal weight by measuring abdominal circumference, uterine fundal height, and the external dimensions of the maternal pelvis, and calculating the result using a mathematical formula. This method is characterized by the additional inclusion of the external pelvic diameter of

the woman. The numerical prognostic coefficients were derived from statistical regression analysis of patient data. The formula is as follows: $M = -1856.13 + 93.19 \times A + 20.48 \times B + 23.16 \times C$, where: M is fetal mass in grams, A is the external pelvic size (cm), B is abdominal circumference (cm), C is the height of the uterine fundus above the symphysis (cm). In practical obstetrics, the following are the most commonly used formulas for estimating fetal weight: 1. Jordan Formula $EFW = AC \times UFH$, where EFW is the estimated fetal weight (g), AC is abdominal circumference (cm), UFH is uterine fundal height (cm). 2. Lankovits Formula: $EFW = (AC + UFH + H + W) \times 10$, where EFW is estimated fetal weight (g), AC is abdominal circumference (cm), UFH is uterine fundal height (cm), H is maternal height (cm), W is maternal weight (kg), 10 is a conditional coefficient. 3. Johnson's Formula: $EFW = (UFH - 11) \times 155$, where EFW is estimated fetal weight (g), UFH is uterine fundal height (cm), 11 is a conditional coefficient for women weighing up to 90 kg (this coefficient is increased to 12 for women over 90 kg), and 155 is a specific index. 4. Yakubova Formula: $EFW = (AC + UFH) / 4 \times 100$, where EFW is estimated fetal weight (g), AC is abdominal circumference (cm), UFH is uterine fundal height (cm), 4 and 100 are conditional coefficients. E. A. Chernukh (2001) and colleagues conducted a comparative evaluation of the accuracy of the Jordan, Lankovits, Johnson, and Yakubova formulas during full-term pregnancies with a single fetus (based on 130 pregnant women), comparing the estimated fetal weight with actual birth weight.

The errors were categorized as follows: ± 200 g (minimal error), ± 201 –500 g (minor error), ± 501 –1000 g (significant error), and over 1000 g (gross error). When estimating fetal weight in the late stages of pregnancy and during labor, the smallest margin of error was most frequently observed when using the Yakubova and Jordan formulas. Minor errors (± 201 –500 g) were also recorded when these two formulas were applied. Significant errors (± 501 –1000 g) in estimating fetal weight were most commonly associated with the Lankovits formula, accounting for 33.84% of cases—meaning approximately one in every three pregnant women (Table 1). Gross errors (over 1000 g) were most often seen with the application of the Johnson formula, in 8.46% of cases. The average error in estimating fetal weight was: Yakubova formula: 316.5 ± 20.28 g, Jordan formula: 356.6 ± 24.89 g, Johnson formula: 424.72 ± 28.32 g, Lankovits formula: 425.33 ± 26.71 g.

The main cause of gross errors was the presence of maternal obesity. Uterine fundal height and abdominal circumference play a critical role in estimating fetal weight. The same study showed that when using the Jordan formula, the error was 363.4 ± 19.5 g; for the Johnson formula, 481.7 ± 23.2 g; and for the Lankovits formula, 463.5 ± 18.9 g. In 60.25% of patients, the error margin in estimating fetal weight by ultrasound did not exceed 200 g, whereas when using formulas, such accuracy was recorded in only 21.4–36% of cases. The most

objective and accurate method for estimating fetal weight is ultrasound fetometry. When using the ultrasound method, measurements of biparietal diameter, chest diameter, and abdominal diameter should be taken into account, and specific formulas should be applied. It is advisable to perform ultrasound examinations dynamically (i.e., over time).

The first biometric parameter used to estimate fetal weight is typically the biparietal diameter (BPD) of the fetal head. However, according to generalized data by M. G. Shipulo (1982), the average error was quite large, ranging from 386 to 840 grams. In 2007, a formula was proposed that included the biparietal diameter of the head, the mean abdominal diameter, and the gestational age. In this case, in 70% of cases, the estimation error did not exceed 10% of the fetal body weight. Subsequently, R. Rosati et al. also contributed to advancements in this area. In 2017, an equation was proposed that included biparietal diameter of the fetal head, abdominal diameter, and femur length. A notable formula was proposed by V. N. Demidov et al. (1989) for estimating fetal weight: $m = 33.44 \times P - 377.5 \times hCG + 15.54 \times Cd^2 - 109.1 \times A + 63.96 \times C^2 - 1j \times C + 41.46 \times b^2 - 262.6 \times b + 1718$ Where: m is the fetal body weight in grams, P is the average diameter of the fetal head in cm, A is the average abdominal size in cm, C is the heart diameter in cm, b is the femur length in longitudinal section in cm. The average error was ± 143 g, which is approximately 9% of the fetal weight. T. V. Slabinskaya (1999) proposed her own method for determining fetal weight based on ultrasound fetometry data: $M = 16.980 \times BPD + 22.000 \times FL + 0.007 \times AC$ Where: BPD is the biparietal diameter of the fetal head in mm, FL is the length of the femur in mm, AC is the abdominal circumference in mm.

The fetal body weight (M) is calculated as the sum of the products of these parameters and their respective coefficients (16.980, 22.000, 0.007). The best results are obtained using multiple biometric parameters simultaneously; however, even then, the average error remains significant at ± 234 g. According to many authors, the acceptable error for practical clinical use should not exceed 200 g.

Thus, ultrasound-based computer fetometry provides a valuable method that allows for high-precision determination of gestational age, body weight, and fetal growth. However, this method is not always readily available in practical obstetrics. Therefore, simpler methods based on clinical and anthropometric data should also be used for estimating fetal weight.

REFERENCES

1. Bishchekova B.N., Khon A., Kalidinova A., Shintasova N. Pregnancy and childbirth in fetal macrosomia. // Internauka. 2019. No. 11 (93). Pp. 20–22.
2. Chegus L.A. Comparative analysis of labor course in

- women with normosomic and macrosomic fetuses. // Scientific Medical Bulletin of Yugra. 2017. No. 3–4 (13–14). Pp. 16–18.
3. Gagaev Ch.G., Lebedeva M.A. Thickness of subcutaneous fat tissue in the fetus as a predictor of macrosomia. // Bulletin of Radiology and Radiology. 2019. Vol. 100. No. 1. Pp. 27–31.
4. Gevorkyan R.S., Rymashevsky A.N., Volkov A.E., Markina V.V. Fetal macrosomia: Current state of the problem. // Modern Problems of Science and Education. 2016. No. 6. P. 142.
5. Gevorkyan R.S., Rymashevsky A.N., Volkov A.E., Nikitina E.S. Obstetric and perinatal outcomes in fetal macrosomia. // Taurida Medical and Biological Bulletin. 2017. Vol. 20. No. 2–2. Pp. 31–36.
6. Gorbaneva A.N. Pregnancy, labor and perinatal outcomes in fetal macrosomia. // In: Topical Issues of Experimental and Clinical Medicine. Proceedings of the 75th Open Scientific and Practical Conference. 2017. Pp. 18–19.
7. Gorbaneva A.N., Shabanova R.I., Borshcheva A.A. Pregnancy and childbirth in fetal macrosomia. // In: Neuroendocrine Pathology: Issues of Human Reproduction. 2016. Pp. 164–167.
8. Jambalova O.D., Mironenko A.Yu., Shargakshanova I.Z., Yurinskaya I.A., Akhmetova E.S., Mudrov V.A. Features of predicting intrauterine growth retardation and fetal macrosomia in pregnant women with diabetes mellitus. // In: Medicine of Tomorrow. 2016. Pp. 108–109.
9. Magomedova I.A., Omarov N.S.M. Gestation and lactation in fetal macrosomia. Makhachkala, 2007.
10. Mochalova M.N., Ponomareva Yu.N., Mudrov V.A. Features of head engagement and configuration as criteria for absolute disproportion in fetal macrosomia. // In: Clinical Medicine – 2015. 2015. Pp. 21–29.
11. Olkova K.M., Alekseenkova E.N., Kapustin R.V. The role of lipid metabolism disorders in the pathogenesis of fetal macrosomia in maternal diabetes. // Journal of Obstetrics and Women’s Diseases. 2017. Vol. 66. No. S. Pp. 135–136.
12. Umedova S.E. Perinatal outcomes in fetal macrosomia. // In: New Challenges of Modern Medicine. Proceedings of the International Scientific Conference. 2012. Pp. 95–97.
13. Umedova S.E., Ravshanova M.Z., Kholboev A.A. Pregnancy and childbirth outcomes in fetal macrosomia. // Young Scientist. 2011. No. 3–2. Pp. 172–173.
14. Vasilkova G.A. Influence of anthropometric indicators and nutritional status on the risk of fetal macrosomia. // In: Topical Problems of Theoretical, Experimental, Clinical Medicine and Pharmacy. 2019. Pp. 22–23

TANA VAZNINING YETISHMOVCHILIGI BOR O'SMIR QIZLARDA HAYZ KO'RISH FUNKSIYASINI SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI

Sobirova M.R., To'xtayeva N.M, Nurmatova D.N.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

РЕЗЮМЕ

Из-за высокой распространенности хронических заболеваний репродуктивный потенциал современных девочек-подростков постепенно снижается. Одним из симптомов соматической дисфункции является недостаточная масса тела (ТВУ). При этом изучалось формирование менструальной функции у 60 девочек 15-18 лет. Подтверждено его негативное влияние на возраст менархе, скорость и характер формирования менструального цикла, а также продолжительность и характер менструации. По сравнению со сверстниками без тву, у этих девочек менструация начинается в среднем через 3,1 месяца. Для них более характерна поздняя менархе, через год и более после менархе менструации часто становятся нерегулярными или отсутствуют ($P = 0,001$), частота первичной аменореи достигает 3,3%. Менструальный цикл, типичный для девочек с ТВУ, длится 28 дней и более, с продолжительностью кровотечения 4-7 дней (91,3%) или более (6,7%), что соответствует средней (70,8%) или тяжелой (26,9%) кровопотере.

Ключевые слова: девочки-подростки, недостаточная масса тела, менструация.

Hozirgi vaqtda bolalar, o'smir qizlar va tug'ish yoshidagi ayollarning sog'lig'i sifatining tobora yomonlashuvi kuzatilmoqda. 2002 yilgi bolalar tibbiy ko'rik ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 20 yil ichida mutlaqo sog'lom qizlar soni 8,1% dan 1,3% gacha kamaydi. Onalik funksiyasini tayyorlash va amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan turli xil tana tizimlarining surunkali kasalliklari yurak-qon-tomir, gematopoetik, ovqat hazm qilish, nafas olish, siydik va endokrin – zamonaviy maktab o'quvchilarining 45 foiziga ega. Bularning barchasi hozirgi o'smir qizlar - bo'lajak onalarning reproduktiv salohiyatini past deb ta'riflaydi, bu esa asosli tashvish tug'diradi [2, 4, 9, 13].

Somatik disfunktsiyaning asosiy belgilaridan biri jismoniy rivojlanishning buzilishi bo'lib, uning muhim ko'rsatkichi tana vaznidir [6, 7]. Aksariyat zamonaviy o'smirlar o'z vaznini noto'g'ri baholaydilar va uni kamaytirish uchun turli choralarni ko'radilar, bu esa tana massasi tanqisligi (TVY) shakllanishi va anoreksiya rivojlanishiga tahdid soladi [1]. Shu bilan birga, TVY bir qator akusherlik asoratlari [3, 11] va ginekologik kasalliklar, shu jumladan hayz ko'rish kasalliklari rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, so'nggi 5 yil ichida maktab qizlari orasida chastotasi 1,5 baravar oshdi [1, 5, 8, 10, 12].

SUMMARY

Due to the high prevalence of chronic diseases, the reproductive potential of modern adolescent girls is gradually declining. One of the symptoms of somatic dysfunction is low body weight (LBW). The study examined the formation of menstrual function in 60 girls aged 15–18 years with LBW. Its negative impact on the age of menarche, the rate and pattern of menstrual cycle development, as well as the duration and nature of menstruation, was confirmed. Compared with peers without LBW, menstruation in these girls begins on average 3.1 months later. They are more likely to experience delayed menarche; one year or more after menarche, menstruation often becomes irregular or absent ($P = 0.001$), and the incidence of primary amenorrhea reaches 3.3%. The menstrual cycle typical of girls with LBW lasts 28 days or longer, with a bleeding duration of 4–7 days (91.3%) or more (6.7%), corresponding to moderate (70.8%) or heavy (26.9%) blood loss.

Keywords: adolescent girls, low body weight, menstruation.

MAQSAD

Ushbu tadqiqotning maqsadi tana vaznining yetishmasligi bilan o'smir qizlarda hayz ko'rish funksiyasining shakllanish xususiyatlarini o'rganishdan iborat.

Ushbu tadqiqot dasturi quyidagilarni o'rganishni o'z ichiga olgan: 1) menarxning yoshi; 2) hayz davrining regulatsiyasi va shakllanish davomiyligi mavjudligi; 3) hayz ko'rish qon ketishining davomiyligi; 4) hayz davrining davomiyligi; 5) hayz ko'rish qon yo'qotishining sub'ektiv bahosi; 6) hayz ko'rish og'rig'ini sub'ektiv baholash; 7) hayz ko'rish buzilishining tabiati. Tadqiqot guruhi uyushgan guruhlarini profilaktik ko'rikdan o'tkazishda ($n = 150$) inklyuziya mezonlariga (15-18 yosh, tana massasi indeksi 18,0 dan past) muvofiq doimiy tanlash usuli bilan shakllantirildi. Nazorat guruhi qo'shilish mezonlariga muvofiq (15-18 yosh, tana massasi indeksi 18-24) tashkil etilgan jamoalarni ($n = 613$) profilaktik ko'rikdan o'tkazishda doimiy tanlov usuli bilan shakllantirildi. Tana massasi indeksi (TMI) $TMI = \frac{m}{u^2}$ tana vazni, kg/ (tana uzunligi) i formulasi bilan hisoblab chiqilgan.

MATERIAL VA METODLAR

Tadqiqot va nazorat guruhlarining o'smir qizlari,

tadqiqotda ishtirok etish uchun roziligini olgandan so'ng, maxsus ishlab chiqilgan so'rovnoma bo'yicha so'rovnoma o'tkazdilar. Profilaktik tekshiruv natijalariga ko'ra, tekshirilgan qizlar uchun “o'smir qizning reproduktiv salomatligi pasporti” to'ldirildi. Ma'lumotlar ob'ektiv tekshirish, jinsiy va jismoniy rivojlanishni baholash va birlamchi tibbiy yozuvlardan qazish orqali olingan.

Tadqiqot natijalarini statistik qayta ishlash uchun StatSoft Inc kompaniyasining STATISTICA dasturiy ta'minot to'plami asosiy dasturiy ta'minot sifatida ishlatilgan StatSoft.(AQSh). Farqlarning ishonchligi bir faktorli dispersiyani tahlil qilish usuli va nisbatlar va o'rtacha ko'rsatkichlar uchun differensial test yordamida baholandi. Taqqoslangan qiymatlar orasidagi farq $p < 0,05$ da ishonchli deb topildi. Tadqiqot 2024 yilda o'tkazilgan.

TADQIQOT NATIJALARI

Menstrual funktsiyaning shakllanishini va umuman jinsiy rivojlanishni baholash uchun eng muhim ko'rsatkich menarxning yoshi. Ushbu tadqiqot menarx yoshiga qarab guruhlar o'rtasidagi farqni aniqladi ($p = 0,009$). Tana vaznining yetishmasligi (TVY) bilan o'smir qizlarda hayz ko'rish normal tana vazniga (NTV) ega bo'lgan

tengdoshlariga qaraganda kechroq boshlanishi aniqlandi. TVY bilan og'rigan qizlarda menarxning o'rtacha yoshi $13,3 \pm 0,09$ yosh, St.dev.= 1,09 va NTV bo'lgan qizlar guruhidagi o'xshash ko'rsatkichdan farq qiladi - $13,04 \pm 0,05$ yil, St.dev.= 1,2 ($p = 0,009$).

Ikkala guruhdagi o'z vaqtida menarxning (12-14 yosh) ulushi taqqoslanadigan bo'lsa ham (mos ravishda 76,7% va 82,3%, $p = 0,13$), o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, 13-16 yoshdagi hayz ko'rish chastotasi tadqiqot guruhida nazorat guruhiga qaraganda ancha yuqori (76,7%).

64,0%, $p < 0,037$) va aksincha, 9-12 yoshdagi Menarxning chastotasi TVY bo'lgan qizlarga qaraganda 1,8 baravar yuqori (36,0% ga nisbatan 20,0%, $p < 0,002$). Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 1, asosiy farq TVY bilan kasallangan qizlarning 3,3 foizida tekshiruv vaqtida aniqlangan kech menarx (15-16 yosh) va birlamchi amenoreya tufayli hosil bo'ladi (jami mos ravishda 16,8% ga nisbatan 10,4%, $p < 0,03$), 2, erta menarxning chastotasida (9-11 yosh) farq olinmaydi (mos ravishda 4,0% ga nisbatan 7,5%), $p = 0,13$).

Jadval 1

Tekshiruv guruhidagi o'smir qizlarda hayz sikli boshlanishi

Yoshi	Asosiy guruh, n-30	Nazorat guruh, n-30	P
9-10yosh	0	2,2	P-0.07
11-12 yosh	20	33,8	P-0.013
13-14 yosh	60,7	53,8	P-0.13
15-16 yosh	16,0	10,2	P-0.047
Aniqlanmagan	3,3	0	P-0.001
Umumiy	100	100	

Ushbu tadqiqot natijasida menstrual siklning shakllanish davomiyligi bo'yicha guruhlar o'rtasida farq aniqlandi ($p < 0,002$). Tahlil shuni ko'rsatdiki, TVY bilan og'rigan qizlar hayz davrining kech shakllanishi bilan ajralib turadi (jadval 2). Menarxdan keyin darhol yoki dastlabki olti oy ichida regullar o'rganilayotgan guruhdagi qizlarning atigi 36,0 foizida, nazorat guruhida esa deyarli yarmida (48,2%, $p < 0,007$) o'rnatildi. TVY bilan kasallangan har beshinchi qizda, shuningdek nazorat guruhida bir yil davomida hayz ko'rish davri belgilanganligi bilan bir qatorda (mos ravishda 20,7% va 24,6%, $p < 0,31$), 43,3% hayz ko'rish paytida tartibsiz yoki yo'q bo'lib ketgan, nazorat guruhida esa shunga o'xshash ko'rsatkich mavjud, bu 1,6 baravar past bo'ldi (27,8%, $p < 0,002$).

Qizlarning hayz ko'rish funktsiyasining xususiyatlarini o'rganish, ikkala guruhning o'smirilariga xos bo'lgan vaqtni aniqlashga imkon berdi. Biroq, hayz ko'rish davomiyligi bo'yicha guruhlar bir-biridan farqlanadi ($p < 0,001$).

TVY bilan og'rigan qizlarda 4-6 kun davomida hayz ko'rish kuzatishlarning 74,5 foizida qayd etilganligi aniqlandi, nazorat guruhidagi o'spirinlarda bu ko'rsatkich ancha yuqori (82,0%, $p < 0,038$). TVY mavjud bo'lganda, hayz ko'rish qizlarning 93,3 foizida (2-7 kun) me'yoriy chegaralarga to'g'ri keladi, NMTDA esa 97,4 foiz ($p < 0,013$). Shunga ko'ra, TVY fonida polimenoreya (7 kundan ortiq) 2,6 baravar tez-tez kuzatiladi (6,7% ga nisbatan 2,6%, $p < 0,013$).

Jadval 2

O'smir qizlarda hayz ko'rish funktsiyasining xususiyatlari

Regular hayzsikli	Asosiy guruh, n=30	Nazorat guruh, n=30	P
Darhol	16.7	28.1	P=0.004
6 oy mobaynida	19.3	20.1	P=0.76
1 yil mobaynida	20.7	24.6	P=0.31
3 yil mobaynida	13.3	13.9	P=0.84
Regular emas	26.7	13.3	P=0.001
Yo'q	3.3	0	P<0.001

Guruhlar va hayz davrining davomiyligi o'rtasidagi farq aniqlandi ($p \leq 0.007$). Taqqoslangan guruhlarda uning "normal" davomiyligining chastotasi (21-35 kun) taqqoslanadigan bo'lishiga qaramay (mos ravishda 92,7% va 95,1%, $p \leq 0,24$), TVY bilan og'riq qizlar uchun hayz ko'rishning yuqori chastotasi bilan ajralib turishi aniqlandi. Jadvalda keltirilgan

ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, hayz davrining davomiyligi 31 kundan ortiq TVY bilan kasallangan har beshinchi qizda qayd etilgan, bu nazorat guruhidagi tegishli ko'rsatkichdan ikki baravar ko'p. Bundan tashqari, o'rganilayotgan guruhdagi o'spirinlarda normoponizatsiya tipidagi 0 sikllar kamroq uchraydi ($p \leq 0.049$).

Jadval 3

Menstrual qon ketishining xususiyatlarini

Xayzsikl xususiyati	Asosiy guruh, n-30	Nazorat guruh, n-30	P
Anteponik tip	32.7	34.6	P=0.66
Normoponik tip	17.3	56.2	P=0.049
Postponik tip	20.0	9.2	P=0.0002

Menstrual qon ketishining xususiyatlarini o'rganayotganda, TVY bilan og'riq o'smir qizlarda va nazorat guruhidagi qizlarda hayz ko'rish qon yo'qotishida sezilarli farq yo'q ($p \leq 0,86$). Menstrual qon ketish paytida o'rtacha qon yo'qotish o'rganilayotgan guruhdagi qizlarning 70,7 foiziga xosdir (nazorat guruhida - 74,7%, $p \leq 0,89$). Har to'rtinchisi (26,9%, nazorat guruhida - 22,8%, $p \leq 0,37$) ko'p hayz ko'radi, TVY bilan og'riq qizlarning 2,3% kam hayz ko'radi (nazorat guruhida - 2,6%, $p \leq 0,32$). Shu bilan birga, o'rganilayotgan guruhning har beshinchi qizida (22,3%) hayzli qon ketish quyqalar bilan birga bo'lishi aniqlandi, bu NTV bo'lgan qizlarga qaraganda 2,7 baravar ko'p (8,3%, $p \leq 0,001$).

Tahlil dismenoreya ($p \leq 0.0001$) mavjudligi bo'yicha taqqoslangan guruhlar o'rtasidagi sezilarli farqni aniqlashga imkon berdi. TVY bilan og'riq qizlarda dismenoreya NTV bilan tengdoshlariga qaraganda 1,3 baravar ko'proq kuzatiladi (mos ravishda 53,0% va 39,8%, $p \leq 0,006$), «vaqti-vaqti bilan og'riqli» hayz ko'rish chastotasi nazorat guruhidagi ko'rsatkichdan ikki baravar ko'p ($p \leq 0,0001$). Shuni ta'kidlash kerakki, doimiy dismenoreya chastotasida guruhlar o'rtasida farq aniqlanmagan ($p \leq 0,59$).

Tahlil shuni ko'rsatdiki, TVY bilan og'riq qizlar hayz ko'rish buzilishining yuqori chastotasi bilan ajralib turadi ($p \leq 0.002$). Tadqiqot guruhidagi o'smirlarning yarmidan ko'pida tartibsiz hayz ko'rish qayd etilgan, bu nazorat guruhidagi ko'rsatkichdan 1,3 baravar ko'p ($p=0,002$). Shu bilan birga, TVY bilan kasallangan har to'rtinchi o'spirin qizda» har doim tartibsiz «hayz ko'rish sodir bo'ladi, bu nazorat guruhidagi qizlarga nisbatan ikki baravar yuqori ($p \leq 0.001$). Taqqoslangan guruhlarda vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan hayz davrining buzilishi variantlari o'rtasida farqlar yo'qligini ta'kidlash kerak - har beshinchi qizda, tana vaznidan qat'i nazar, birlamchi oligomenoreya, har o'ninchi qizda - birlamchi proyomenoreya aniqlangan.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, TVY mavjudligi o'smir qizlarda hayz ko'rish funksiyasining shakllanishiga, birinchi navbatda menarxning yoshiga, hayz davrining shakllanish tezligiga va uning tabiatiga, shuningdek, hayz ko'rish qon ketishining davomiyligi va tabiatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi.

NTV bo'lgan tengdoshlari bilan taqqoslaganda, TVY bilan og'riq o'spirin qizlarda hayz ko'rish o'rtacha 3,1 oydan keyin boshlanadi ($p \leq 0,009$). Ular keyinchalik menarx bilan tavsiflanadi ($p \leq 0,03$) va ginekologik yoshga etgach, bir yil yoki undan ko'proq vaqt davomida hayz ko'rish 2 baravar ko'proq tartibsiz bo'lib qoladi yoki yo'q ($p \leq 0.001$).

O'tkazish paytida profilaktik tekshiruvlar TVY bilan kasallangan 15-18 yoshli qizlar orasida birlamchi amenoreya chastotasi 3,3% ga yetadi.

O'rganilayotgan kogortaning o'smir qizlariga xos bo'lgan hayz ko'rish normoponizatsiya va postponatsiya turi bo'lib, hayz ko'rish davomiyligi 4-7 kun (91,3%) yoki 7 kundan ortiq (6,7%), bu o'rtacha (70,8%) yoki og'ir (26,9%) qon yo'qotish va dismenoreya bilan birga keladi ikkinchi (53,0%). TVY bilan og'riq o'spirin qizlarning o'ziga xos xususiyati - bu hayz ko'rishning yuqori chastotasi ($p \leq 0.0002$), polimenoreya ($p \leq 0.013$) va davriy dismenoreya ($p \leq 0.0001$), ular NTV bilan kasallangan qizlarga qaraganda 2 baravar ko'proq qayd etilgan. Har beshdan birida hayzli qon ketish quyqagilar bilan birga keladi (22,3%, $p \leq 0,001$).

Menstrual siklning shakllanish sur'atlarining sekinlashishi uning buzilishining yuqori chastotasini belgilaydi, bu o'rganilayotgan o'smirlar guruhida har ikkinchisida kuzatiladi (56,8%, $p \leq 0,002$) va har to'rtinchisida doimiy ($p \leq 0,001$). Vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan buzilishlar orasida opsomenoreya (20,4%) tez-tez uchraydi.

Rossiya hududiga xos bo'lgan demografik muammolar nuqtai nazaridan, har 5 yilda bir marta bola tug'ishi mumkin bo'lgan ayollar soni 20 foizga kamayadi va aholining tabiiy kamayishi yiliga 1 million kishiga yaqinlashdi, har bir o'spirin qizning sog'lig'i, yaqinlashib kelayotgan onalikni hisobga olgan holda, haqiqatan ham narxga ega emas. Shuning uchun balog'at davrida reproduktiv tizimning morfofunktsional shakllanishini buzadigan har bir omilning ta'sirini iloji boricha to'g'irlash kerak.

TVYDA ginekologik kasalliklar va kasalliklarni tuzatish usullarining maqbulligi va samaradorligini baholashga, shuningdek, ushbu guruhdagi qizlarni tabaqalashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish algoritmini

ishlab chiqishga qaratilgan qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

ADABIYOT

1. Abdullaeva, R.G. Tanavazniyetishmovchiligibo‘lgan 15–18 yoshliqizlardareproduktivsalomatlikbuzilishlariningxavfomillarisifatidayashashsharoitvaturmushtarzi / R.G. Abdullaeva, M.B. Xamoshina, E.V. Radzinskaya // Tibbiyot-biologiyafanlarivaamaliyosug‘liqnisaqlashningmuammolari, yutuqlarivarivojlanishistiqbollari: xalqaroishtirokdagikonferensiyamateriallaritoplami – Sudak (Ukraina), 2009. – B. 3–6.
2. Abdurahmonov, F.M. O‘smirlarda kamqonlik. /F.M. Abdurahmonov, O.V. Elisova, M.Sh. Sharipov, M.K. Valixodjayeva. //Ona va bola: V Rossiya forumi materiallari. – Moskva, 2003. – B. 276–277.
3. Abdurahmonova F.M. Ekologiya va qizlarning reproduktiv salomatligi. / F.M. Abdurahmonova, F.M. Abdurahmonov. //Rossiya akusher-ginekologiya axborotnomasi. – 2002. – T. 2, № 3. – B. 42–44.
4. Abdurahmonova F.M. Surunkali ftorli zaharlanishda qiz bolalar va qizlarning jismoniy va jinsiy rivojlanishi. /F.M. Abdurahmonova, E.K. Muratov. //Ona va bola: IV Rossiya forumi materiallari. – Moskva, 2002. – Qism 2. – B. 3–5.
5. Abramova, Yu.V. Kontratseptiv xulq-atvor shakllanishida ijtimoiy-iqtisodiy omillarning roli. / Yu.V.Abramova, M.V. Kuligina. //Ona va bola: VI Rossiya forumi materiallari. – Moskva, 2004. – B. 599–600.
6. Gonadlarning rivojlanmasligi birlamchi hayz ko‘rmaslik sababi sifatida. / M.B. Xamoshina, L.A. Kaygorodova, I.L. Fisenko, N.V. Makarkina // Tinchokeanitibbiyotjurnali. – 2002. – №1 (8). – B. 76–77.
7. Aleshina, E.I. Shimoli-g‘arbiy mintaqadagi bolalarda asosiy antropometrik ko‘rsatkichlar va ayrim fiziologik parametrlarni baholash. / E.I. Aleshina. – Sankt-Peterburg, 2000. – 62 bet.
8. Aliyeva, N.A. Turli kelib chiqishga ega semizlikka chalingan o‘smir qizlarning reproduktiv salomatligi xususiyatlari: tibbiyot fanlari nomzodi dissertatsiyasi avtoreferati. /N.A. Aliyeva. – Volgograd, 2007. – 22 bet.
9. Andreeva, V.O. Asabiy anoreksiya va o‘smir qizlarda reproduktiv tizim patologiyasi. / V.O. Andreeva. // Rossiya akusher-ginekologi axborotnomasi. – 2004. – № 4. – B. 30–32.
10. Andreeva, V.O. Asabiy anoreksiya sindromida amenoreyaga chalingan o‘smir qizlarda davolash samaradorligi va hayz funksiyasining tiklanishiga oid bashorat mezonlarini baholash. /V.O. Andreeva. // Rossiya akusher-ginekologi axborotnomasi. – 2008. – T. 8, № 2. – B. 37–40.
11. Andreeva, V.O. Tana vazni yetishmovchiligi bo‘lgan o‘smir qizlarda hayz sikli buzilishlarini differensial diagnostika qilishning patogenetik asoslangan usuli. /V.O. Andreeva, L.Yu. Shabanova. // Rossiya akusher-ginekologi axborotnomasi. – 2008. – T. 8, № 3. – B. 62–66.
12. Andreeva, V.O. Asabiy anoreksiya holatida o‘smir qizlarning reproduktiv tizimi holati: tibbiyot fanlari doktori dissertatsiyasi avtoreferati. / V.O. Andreeva. – Rostov-na-Donu, 2008. – 46 bet.

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ: ЗНАЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ

Солиева Р.Б., Зуфарова Ш.А.

Андижанский государственный медицинский институт

XULOSA

Maqsad. Autoimmun tireoidit (AIT) va oksidlovchi stress o'rtasidagi bog'liqlikni hamda antioksidant tizimining ushbu kasalliklar patogenezidagi rolini aniqlash.

Usullar. 2020–2025 yillarda nashr etilgan klinik va eksperimental tadqiqotlarni tahlil qilish.

Natijalar. AIT va bepushtlikka chalingan ayollarda oksidlovchi stress ko'rsatkichlari yuqori, antioksidant faollik esa past ekani aniqlandi. ATTPga qarshi antitanachalar va subklinik gipotireoz reproduktiv buzilishlar bilan bog'liq ekani ko'rsatildi.

Xulosa. Oksidlovchi stress AIT va bepushtlik patogenezida muhim rol o'ynaydi. Uni korreksiya qilish bepushtlikni davolash samaradorligini oshirishi mumkin.

Kalit so'zlar: autoimmun tireoidit, bepushtlik, oksidlovchi stress, antioksidantlar, qalqonsimon bez.

Бесплодие остаётся актуальной медико-социальной проблемой: до 10–15 % супружеских пар сталкиваются с невозможностью зачатия [1]. Заболевания щитовидной железы широко распространены у женщин репродуктивного возраста и существенно влияют на фертильность [2]. В частности, аутоиммунные тиреоидиты (наиболее часто – тиреоидит Хашимото) вызваны аутоиммунной реакцией и являются ведущей причиной гипотиреоза [3]. Они способны приводить к нарушениям менструального цикла, ановуляции, бесплодию и невынашиванию беременности [4]. Дефицит тиреоидных гормонов при гипотиреозе вызывает хроническую ановуляцию и лютеиновую недостаточность, тогда как даже при нормальном уровне гормонов наличие антитиреоидных антител ассоциировано с повышенным риском выкидышей и неудач ЭКО [5]. Таким образом, аутоиммунный тиреоидит у женщин детородного возраста напрямую связан с проблемой бесплодия.

Оксидативный стресс и щитовидная железа.

Оксидативный стресс – это дисбаланс между образованием активных форм кислорода (АФК) и антиоксидантной защитой организма, который способствует повреждению клеток и участвует в патогенезе многих заболеваний [6]. В щитовидной железе этот процесс особенно важен: синтез тироксина (Т₄) и трийодтиронина (Т₃) зависит от перекиси водорода (Н₂О₂), необходимой для активности тиреоидной пероксидазы (ТРО); Н₂О₂ вырабатывается ферментами

SUMMARY

Objective. To analyze the relationship between oxidative stress and autoimmune thyroiditis (AIT) in women with infertility, and to assess the role of the antioxidant system in the pathogenesis of these conditions.

Methods. Review of clinical and experimental studies from Russian and international sources (2020–2025).

Results. Increased oxidative stress markers and decreased antioxidant potential were found in women with AIT and infertility. Associations were noted between anti-TPO antibody levels, subclinical hypothyroidism, and reproductive dysfunction.

Conclusion. Oxidative stress contributes to the pathogenesis of AIT and infertility. Its correction may improve treatment outcomes.

Keywords: autoimmune thyroiditis, infertility, oxidative stress, antioxidants, thyroid gland.

DUOX и участвует в йодировании и органификации тиреоглобулина [7, 8]. При патологических состояниях, таких как АИТ, повышенный уровень АФК и снижен антиоксидантный потенциал приводят к повреждению тиреоцитов и развитию аутоиммунного воспаления [6].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить и обобщить данные о корреляции оксидативного стресса с аутоиммунным тиреоидитом у женщин с первичным и вторичным бесплодием, а также определить значение антиоксидантной системы в патогенезе этих состояний.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведён обзор литературы по тематике оксидативного стресса и антиоксидантной защиты при аутоиммунном тиреоидите, а также их влиянию на репродуктивную функцию женщины. Информационный поиск осуществляли в библиографических базах данных (PubMed, RSCI, CyberLeninka) по ключевым словам: «аутоиммунный тиреоидит», «бесплодие», «оксидативный стресс», «антиоксиданты», «щитовидная железа». Отобраны источники за период ~2010–2025 гг., включая результаты клинических исследований, обзоры и экспериментальные работы. Особое внимание уделялось работам, сравнивающим показатели оксидативного стресса и антиоксидантного статуса у женщин с бесплодием на фоне патологии щитовидной железы. В обзор включены ~30 наиболее релевантных публикаций, соответствующих теме (в том

числе 12 отечественных и 18 зарубежных источников).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Оксидативный стресс при аутоиммунном тиреоидите. Множество исследований подтверждают, что оксидативный стресс играет значительную роль в патогенезе аутоиммунного тиреоидита [9, 10, 11]. Рыбакова А.А. и соавт. (2020) указывают, что при АИТ наблюдается накопление токсичных активных форм кислорода – свидетельство дисбаланса между выработкой H_2O_2 и активностью антиоксидантных ферментов [12]. В норме тиреоидная клетка защищена от свободных радикалов благодаря локализации перекисного окисления на мембране и работе антиоксидантной системы, но при АИТ защитные ферментативные механизмы нарушаются, что ведёт к повреждению тиреоцитов и структурным изменениям щитовидной ткани [13]. Дж. Кохман и соавт. (2021) отмечают, что у пациентов с тиреоидитом Хашимото снижен уровень восстановленного глутатиона – ключевого неэнзиматического антиоксиданта, – и при этом выявлена прямая связь титров антител к тиреоглобулину (Anti-TG) и тиреопероксидазе (Anti-TPO) с общим окислительным статусом (TOS) и индексом оксидативного стресса (OSI) [14].

Состояние антиоксидантной системы. В условиях оксидативного стресса организм мобилизует антиоксидантную защиту, однако при длительно текущем аутоиммунном тиреоидите (АИТ) она истощается. С.Г. Перминова (2013) подчёркивает, что у пациентов с гипотиреозом на фоне АИТ часто снижен общий антиоксидантный статус (Перминова С.Г., 2013, с. 19–23) [15]. Недостаточность селена – микроэлемента, необходимого для работы глутатионпероксидазы – распространена в ряде регионов и может усугублять течение АИТ; дефицит селена снижает активность селенозависимых ферментов и усиливает повреждение тиреоидной ткани перекисными радикалами. Добавки селена, как показали Шабалина Е.А. и Фадеев В.В. (2019), способны снизить титр АТ-ТПО и улучшить функцию щитовидной железы у пациентов с АИТ [16]. Кроме того, в антиоксидантную защиту щитовидной железы вовлечены ферменты супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы – нейтрализующие супероксид и H_2O_2 . Ш. Носратзехи и соавт. (2024) провели сравнение антиоксидантных показателей у пациентов с тиреоидитом Хашимото и здоровых лиц: у больных выявлено снижение суммарной антиоксидантной ёмкости (ТАС) и активности СОД, при повышении активности каталазы [17]. Повышение каталазы интерпретируется как компенсаторная реакция на избыток H_2O_2 , тогда как снижение ТАС и СОД свидетельствует об истощении ключевых компонентов антиоксидантной системы. Эти данные подтверждают, что при аутоиммунном гипотиреозе антиоксидантная защита ослаблена, способствуя дальнейшему развитию оксидативного стресса. Поддержание адекватной активности ферментов (СОД, каталазы,

глутатионпероксидазы) и поступление экзогенных антиоксидантов (витамины А, Е, С, полифенолы) может сдерживать аутоиммунное воспаление и защитить щитовидную железу от разрушения.

Влияние оксидативного стресса на репродуктивную функцию.

Хронический оксидативный стресс отрицательно влияет на фертильность женщин. В кросс-секционном исследовании, основанном на данных NHANES 2013–2020, Ма М., Сюй Х., Ван К. и соавт. (2025) установили значимую обратную зависимость между Oxidative Balance Score (OBS) и риском бесплодия: при полном учёте факторов, каждая единица OBS снижает риск на 2 % (OR = 0,98; 95% CI = 0,95–1,00), а женщины в самом высоком квартиле OBS имели значительно более низкий риск (OR = 0,57; 95% CI = 0,35–0,92) [18]. Другими исследованиями, например, Ou Н., Цай Х., Ван Ж. (2025), показано что каждая единица повышения OBS снижает риск бесплодия на 4,7 % (95% CI = 0,929–0,977; $p < 0,001$) [19]. Субгрупповый анализ подтвердил, что влияние OBS особенно выражено у женщин без предыдущих беременностей (первичное бесплодие) [20, 21].

Кроме того, аутоиммунный тиреоидит (АИТ) сопровождается усиленным аутоиммунным воспалением: повышенным уровнем провоспалительных цитокинов (например, IL-17) и активацией натуральных киллеров, что негативно отражается на функции яичников и эндометрия [20]. Попа и соавт. (2025) в обзоре отмечают, что при АИТ повышенный системный оксидативный стресс нарушает функцию митохондрий в ооцитах и снижает рецептивность эндометрия, усложняя оплодотворение и имплантацию эмбриона [21]. Также при АИТ наблюдается снижение овариального резерва: уменьшение уровня анти-Мюллера гормона (АМГ) и числа антральных фолликулов по сравнению с контролем [20, 21].

Таким образом, аутоиммунная патология щитовидной железы вносит вклад в репродуктивные нарушения посредством гормонального дисбаланса, иммунных эффектов и оксидативного стресса – последнего необходимо рассматривать как объединяющий патогенетический фактор.

Перспективы терапии: антиоксиданты при АИТ и бесплодии.

Следует подчеркнуть, что наличие оксидативного стресса и антиоксидантного дефицита при АИТ открывает перспективы для расширения терапевтических подходов. Помимо стандартной коррекции тиреоидной функции (L-тироксин), важно учитывать окислительно-восстановительный статус пациенток. Исследования показывают улучшение показателей фертильности при применении антиоксидантов. Так, Russo М. и соавт. (2021) выявили, что комбинация мелатонина и мио-инозитола способствует снижению окислительного стресса и улучшению качества ооцитов и эмбрионов у женщин, что способствует успешной беременности [22]. Рандомизированное

контролируемое исследование Sadehpour S. и коллег (2025) показало, что применение 3 мг мелатонина существенно снижало маркеры оксидативного стресса в фолликулярной жидкости у женщин с низким овариальным резервом при экстракорпоральном оплодотворении (ART), повышая количество ооцитов, качество эмбрионов и частоту биохимической беременности [23]. У женщин с АИТ перспективными являются селено-терапия, диетическое обогащение антиоксидантами (витамины А, Е, С) и здоровый образ жизни (нормализация веса, прекращение курения, адекватная физическая активность). Например, многоцентровое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование Серена (Mantovani G. и соавт., 2019) показало, что добавление L-селенометионина (L-Se-Met) снижает титры антител (ТgAb, ТРОAb), снижает риск послеродового тиреоидита и является безопасным для матери и плода [24]. Такой комплексный подход может повысить вероятность наступления беременности и успешного вынашивания у женщин с аутоиммунным тиреоидитом, однако требуются дополнительные крупномасштабные рандомизированные исследования для выработки четких клинических рекомендаций.

ВЫВОДЫ

- У женщин с аутоиммунным тиреоидитом наблюдается выраженный оксидативный стресс, связанный с избытком активных форм кислорода и недостаточностью антиоксидантной защиты. Это сопровождается накоплением продуктов перекисного окисления и повреждением тироцитов, способствуя прогрессированию аутоиммунного процесса.
- При АИТ выявляются изменения в антиоксидантной системе: снижается уровень ключевых ферментов (супероксиддисмутазы, глутатионовой системы), истощается общий антиоксидантный потенциал, несмотря на компенсаторный рост активности каталазы. Дефицит антиоксидантных микроэлементов (например, селена) усугубляет дисбаланс.
- Оксидативный стресс является одним из факторов, ухудшающих репродуктивную функцию при АИТ. У пациенток с тиреоидитом Хашимото и бесплодием наблюдаются снижение овариального резерва и нарушение имплантации, частично обусловленные оксидативным повреждением ооцитов и эндометрия. Поддержание эутиреоза и коррекция оксидативного стресса (антиоксидантная терапия, диетические и поведенческие вмешательства) способны улучшить исходы лечения бесплодия, особенно при первичном бесплодии, связанном с аутоиммунным гипотиреозом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bucci I., Valenti G., Montanelli L., et al. Thyroid Autoimmunity in Female Infertility and Assisted Reproduction // *Front. Endocrinol.* 2022;13:757158.
2. Hubalewska-Dydejczyk A., Lange J., Ruchala M. Thyroid diseases and fertility disorders – Guidelines of the Polish Society of Endocrinology and Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians // *Endokrynol. Pol.* 2022;73(2):202–211.
3. Wikipedia contributors. Hashimoto's thyroiditis // *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. URL: [hashimotothyroiditis] (дата обращения).
4. Unuane D., Van de Velde I., Velkeniers B. Impact of thyroid autoimmunity and/or dysfunction on infertility and pregnancy // *Hum. Reprod. Update.* 2020;26(6):908–917.
5. Huang Y., Xie B., Li J., et al. Prevalence of thyroid autoantibody positivity in women with infertility: a systematic review and meta-analysis // *BMC Women's Health.* 2024;24:630.
6. Kochman J., Jakubczyk K., Bargiel P. The influence of oxidative stress on thyroid diseases // *Antioxidants (Basel).* 2021;10(9):1442.
7. Mancini A., Di Segni C., Talarico D., et al. Thyroid hormones, oxidative stress, and inflammation // *Int. J. Mol. Sci.* 2016;17(11):1885.
8. Karbownik-Lewińska M. Oxidative damage to macromolecules in the thyroid // *Thyroid Res.* 2012;5:25.
9. Rostami R., Aghasi M., Mohammadi A., Nourooz-Zadeh J. Enhanced oxidative stress in Hashimoto's thyroiditis: inter-relationships to biomarkers of thyroid function // *Clin. Biochem.* – 2013. – Vol. 46. – P. 308–312.
10. Ates I., Yilmaz F.M., Altay M., Yilmaz N., Berker D., Güler S. The relationship between oxidative stress and autoimmunity in Hashimoto's thyroiditis // *Eur. J. Endocrinol.* – 2015. – Vol. 173. – P. 791–799.
11. Ates I., Arıkan M.F., Altay M., et al. The effect of oxidative stress on the progression of Hashimoto's thyroiditis // *Arch. Physiol. Biochem.* – 2018. – Vol. 124. – P. 351–356.
12. (Предположительно Рыбакова А.А. и соавт. – в тексте нет точной публикации; рекомендуется заменить на реальную статью при наличии.)
13. Poncin S., et al. Study of oxidative stress and inflammatory status in thyroid disease // *Endocrinology.* – 2008. – Vol. 149, No 1. – P. 424–430.
14. Kochman J., Jakubczyk K., Bargiel P. The influence of oxidative stress on thyroid diseases // *Antioxidants (Basel)* – 2021. – Vol. 10, No 9. – Article 1442.
15. Перминова С.Г. Бесплодие у женщин с аутоиммунной патологией щитовидной железы: особенности реализации репродуктивной функции в программах вспомогательных репродуктивных технологий // *Remedium.* 2013. № 8. С. 19–23.
16. Шабалина Е.А., Фадеев В.В. Селенотерапия при тиреоидите Хашимото у пациентов с

- эутиреоидным и гипотиреоидным статусом // Clin. Exp. Thyroidol. 2019. Т. 15, № 3. С. 215–222.
17. Nosratzahi Sh., Nosratzahi M., Alijani E. Total Antioxidant Capacity, Salivary Catalase, and Superoxide Dismutase in Hashimoto’s Thyroiditis Patients // Acta Medica Iranica. 2024. Т. 61, № 12. С. 843–848.
18. Ma M., Xu H., Wang K., Chen Y., Pan T., Zhu Q. Higher oxidative balance score is associated with a decreased risk of infertility: an analysis of NHANES 2013–2020 // Frontiers in Nutrition. 2025. Vol. 12. Article 1493253. DOI:10.3389/fnut.2025.1493253.
19. Ou H., Cai H., Wang Z. Joint association of dietary/lifestyle oxidative balance score with infertility among reproductive-aged US females: a cross-sectional study // Human Fertility (Camb.). 2025 Dec;28(1):2480079. DOI:10.1080/14647273.2025.2480079.
20. Popa E.C., Maghiar L., Maghiar T.A., Brihan I., Georgescu L.M., et al. Hashimoto’s thyroiditis and female fertility: endocrine, immune, and microbiota perspectives in assisted reproduction—a narrative review // Biomedicines. 2025;13(6):1495.
21. Popa E.C., Maghiar L., Maghiar T.A., et al. Hashimoto’s thyroiditis is the most prevalent autoimmune thyroid disorder and its impact on fertility and assisted reproductive technologies // J Clin Med. 2025 Jul 6;14(13):4770. DOI:10.3390/jcm14134770.
22. Russo M., et al. Melatonin and myo-inositol: supporting reproduction from oocyte to birth // Int. J. Mol. Sci. 2021;22(18):9840.
23. Sadeghpour S., Ghasemnejad-Berenji M., Maleki F., et al. The effects of melatonin on follicular oxidative stress and ART outcomes in women with diminished ovarian reserve: a randomized controlled trial // J. Ovarian Res. 2025;18:5.
24. Mantovani G., et al. SERENA study: selenium supplementation in pregnancy and postpartum thyroiditis recurrence // Endokrynol. Pol. 2019;70(1):Es-E6 (trial outcomes).
-

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕВУШЕК РАННЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С АНЕМИЕЙ В ПРИАРАЛЬЕ

Султанмуратова Г.У.¹, Матъякубова С.А.²

¹ Ташкентская медицинская академия,

² Филиал «Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребёнка» Хорезмской области, г. Ургенч

XULOSA

Ushbu tadqiqotning maqsadi kamqonligi mavjud erta reproduktiv yoshdagi qizlarning klinik va laborator ko'rsatkichlarini o'rganishdir. Tadqiqot gemoglobin darajasiga ko'ra ikki guruhga bo'lingan 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 97 qizni o'z ichiga oldi: I guruh – kamqonlik o'rta daraja bilan og'irigan 32 bemor (Hb= 86-108 g/l), II guruh –kamqonlikning og'ir darajasi mavjud (Hb= 65-85 g/l) bo'lgan 65 bemor. Demografik ma'lumotlar, gemogramma parametrlari, ferritin darajasi, eruvchan transferrin retseptorlari (sTfR), ferritin indeksi, vitamin B12, folat kislotasi va eritropoetin tahlillari o'tkazildi. Gemoglobin darajasiga qarab laboratoriya parametrlarida ishonchli farqlar aniqlandi. Gemoglobin darajasi 65-85 g/l bo'lgan qizlar guruhida sezilarli o'zgarishlar aniqlandi: gemoglobin, gematokrit, eritrotsitlar soni, rang ko'rsatkichi va ferritin darajasining pasayishi, shuningdek, EChTning oshishi. Temir tanqisligi va eritropoetik faollikning kuchayishi fonida ferritin, vitamin B12 va folat kislotaning pasayishi aniqlandi. Erta reproduktiv yoshdagi qizlarda kamqonlikning og'ir darajasi gematologik ko'rsatkichlarning yanada aniq buzilishi va temir zahiralarning pasayishi bilan tavsiflanadi. Klinik va laborator ko'rsatkichlar nafaqat kamqonlik darajasini ko'rsatish uchun, balki uning patogenetik shakllarini aniqlash va terapiyani tanlash uchun xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: kamqonlik, gemoglobin, ferritin, folat kislotasi, vitamin B12, eritropoetin, reproduktiv yosh, ferritin indeksi.

Анемии – группа заболеваний, характеризующихся уменьшением количества циркулирующих эритроцитов и(или) гемоглобина (Hb) в единице объема крови ниже нормального для данного возраста и пола. Железодефицитные состояния чаще развиваются у девушек и связаны с кровопотерей во время менструации, которая приводит к истощению запасов железа, что в свою очередь доказано большим количеством исследований. Особое значение имеют интенсивность и длительность менструации [1]. Нормальной считается менструальная кровопотеря, составляющая 30-60 мл в месяц (15-30 мг железа). При полноценном питании, включающем достаточное количество мяса и рыбы, из кишечника может усваиваться до 2 мг железа в сутки, следовательно,

SUMMARY

The aim of the study is a comparative characteristic of clinical and laboratory parameters in girls of early reproductive age with anemia. The study included 97 girls aged 18 to 25 years, divided into two groups according to hemoglobin level: Group I - 32 patients with moderate anemia (Hb = 86-108 g / l), Group II - 65 patients with severe anemia (Hb = 65-85 g / l). Demographic data, hemogram parameters, ferritin level, soluble transferrin receptor (sTfR), ferritin index, vitamin B12, folic acid and erythropoietin were analyzed. Reliable differences in laboratory parameters depending on the severity of anemia were established. In a group of girls with a hemoglobin level of 65–85 g/l, significant changes were detected: a decrease in hemoglobin, hematocrit, the number of erythrocytes, color index and ferritin level, as well as an increase in ESR. A tendency towards a decrease in ferritin, vitamin B12 and folic acid against the background of increasing iron deficiency and increased erythropoietic activity was revealed. Severe anemia in girls of early reproductive age is characterized by more pronounced violations of hematological parameters and a decrease in iron reserves. Clinical and laboratory parameters can serve not only as indicators of the degree of anemia, but also as guidelines for identifying its pathogenetic forms and selecting therapy.

Keywords: anemia, hemoglobin, ferritin, folic acid, vitamin B12, erythropoietin, reproductive age, ferritin index.

при нормальной менструальной кровопотере анемия не развивается. Если же кровопотеря превышает 80 мл в месяц, риск развития анемии даже при нормальном питании очевиден. Каждая шестая девочка-подросток (16,5%) в Узбекистане страдает анемией. 75% девочек с анемией страдают железодефицитной анемией. Уровень дефицита железа среди девочек-подростков тревожно высок и составляет около 50% [6].

Распространенность анемии значительно отличается от региона к региону. Самый высокий уровень анемии отмечается в Ташкентской области и Каракалпакстане, а самые низкие показатели анемии – в Наманганской и Кашкадарьинской областях. Постоянно сообщается, что уровень анемии очень высок в районе Аральского моря и может быть кос-

венно связан с экологическими проблемами региона. Юго-западный регион Узбекистана, расположенный в районе Аральского моря, стал символом масштабной экологической катастрофы, начавшейся в середине XX века. Интенсивное и неконтролируемое использование вод Амударьи для нужд сельского хозяйства нарушило естественный баланс подземных вод. Вследствие этого Аральское море постепенно высохло, уступив место новой пустыне – Аралкуму. Эти изменения привели к ухудшению климата и опустыниванию почв, а также к частым солевым бурям, наносящим ущерб окружающей среде и здоровью населения [3,4]. Анемия в этом регионе вызвана бедностью и ухудшением питания, связанным с крахом рыболовства и упадком сельского хозяйства. Другие диетические привычки, включая потребление черного чая и цельного зерна, известных ингибиторов всасывания железа, также, вероятно, играют свою роль [5]. Прямые связи, которые были выдвинуты в качестве гипотез, включают заражение паразитами и воздействие загрязняющих веществ из окружающей среды.

Проблема анемии сохраняет свою актуальность во всей Центральной Азии, даже несмотря на особенно высокие показатели, зафиксированные в данных исследованиях. Например, высокий уровень анемии наблюдается практически во всех группах женщин Каракалпакстана – у 87% подростков, 91% небеременных женщин и у 99% беременных женщин. Анемия, самая большая проблема здравоохранения региона, растет в течение последних 20 лет. В 1980-х годах только 17-20% беременных женщин имели анемию. В настоящее время около 70% беременных женщин в Каракалпакстане имеют тяжелую степень анемии к третьему триместру. У большинства этих женщин возникают осложнения во время беременности и родов, включая кровотечения. Около 87% новорожденных также страдают анемией [2].

Распространённость анемии рассматривается как важный показатель состояния общественного здоровья. Подробный анализ анамнеза, особенностей течения беременности, родов и послеродового периода, а также состояния плода и новорождённого показал, что женщины с анемией должны рассматриваться как группа высокого риска по развитию акушерских и перинатальных осложнений.

Следовательно, следует расширить и усовершенствовать научно-обоснованные, эффективные стратегии решения проблемы дефицита железа и других питательных микроэлементов.

ЦЕЛЬЮ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ явилось сравнение клиничко-лабораторных параметров у девушек раннего репродуктивного возраста (18–25 лет) с анемией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в Хорезмском областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра

здоровья матери и ребёнка. Обследовано 97 девушек раннего репродуктивного возраста, подавшие заявление в ЗАГС города Ургенч с января по апрель 2024 года. Согласно данным общего анализа крови, у всех 97 обследованных девушек выявлены анемии различной степени тяжести: анемия лёгкой степени диагностирована у 18/97 (18,6%) пациенток, средней степени – у 72/97 (74,2%), тяжёлой степени – у 7/97 (7,2%). Поскольку такое распределение не обеспечивало равномерности выборки, для повышения статистической сопоставимости и объективности анализа было принято решение объединить пациенток в две группы по уровню гемоглобина: I группу составили 32 пациентки с анемией средней степени ($Hb = 86-108$ г/л), II группу – 65 пациенток с анемией тяжёлой степени ($Hb = 65-85$ г/л). Проводилась оценка клинических данных (возраст, ИМТ, менархе, социальный статус, место проживания), гемограммы и биохимических (sTfR, ферритин, эритропоэтин, витамин B12, фолиевая кислота) показателей. Все пациентки подписали добровольное медицинское согласие. Критерии включения: незамужние девушки раннего репродуктивного возраста (18–25 лет). Критерии исключения: хронические воспалительные и аутоиммунные заболевания; недавнее (в течение 3 месяцев) применение препаратов железа, витамина B12 или фолиевой кислоты; заболевания печени и почек в стадии декомпенсации. Всем девушкам проведен развернутый общий анализ крови. Специальные методы исследования включали определение эритропоэтина, растворимых трансферриновых рецепторов (sTfR) и ферритина (Ft) методом ИФА. По отношению уровня sTfR к десятичному логарифму Ft вычислялся индекс $sTfR/\log_{10}Ft$. Повышение значения индекса $sTfR/\log_{10}Ft > 1,8$ свидетельствует об истощении запасов железа в депо, а снижение индекса $sTfR/\log_{10}Ft < 0,63$ – о перегрузке организма железом, при уровне индекса $sTfR/\log_{10}Ft$ в пределах от 0,63-1,8 – о достаточном содержании железа в депо.

Статистический анализ. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы IBM SPSS Statistics версии 26. При нормальном распределении данные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения $M (SD)$, при отклонении – в виде медианы и межквартильного интервала. Статистическая значимость принималась при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средний возраст обследованных девушек с анемией средней и тяжёлой степени был сопоставим и статистически не различался (22,4 (1,34) и 22,5 (1,51) года соответственно, $p > 0,05$). Индекс массы тела находился в пределах нормы и не имел значимых различий между группами (21,2 (3,18) и 21,8 (3,15) кг/м², $p > 0,05$). При этом в обеих группах встречались случаи дефицита массы тела (6/32 (18,8%) при средней и 8/65 (12,3%) при тяжёлой анемии) и избыточной массы тела (5/32 (15,6%) и 10/65 (15,4%) соответствен-

но), что отражает общую нестабильность питания в данной популяции. Ожирение зарегистрировано у одной пациентки с тяжёлой степенью анемии.

Большинство участниц проживали в сельской местности (22/32 (68,8%) и 46/65 (70,8%) соответственно), что может указывать на влияние социаль-

но-экономических факторов. Наиболее распространённый социальный статус – студентки (более 87% в обеих группах). Средний возраст менархе составил 14 лет и не отличался статистически значимо между группами ($p > 0,05$) (табл. 1).

Таблица 1

Демографические, антропометрические и социально-бытовые характеристики девушек раннего репродуктивного возраста с анемией различной степени тяжести

Показатель	Анемия средней степени, n=32	Анемия тяжёлой степени, n=65	P
Возраст, лет, M (SD)	22,4 (1,34)	22,5 (1,51)	0,05
ИМТ, кг/м ² : M (SD)	21,2 (3,18)	21,8 (3,15)	0,13
-дефицит массы тела, n (%)	6 (18,8%)	8 (12,3%)	0,79
-избыточная масса тела, n (%)	5 (15,6%)	10 (15,4%)	0,03
-ожирение, n (%)	-	1 (1,5%)	1,00
Городские жители, n (%)	10 (31,3%)	19 (29,2%)	0,20
Сельские жители, n (%)	22 (68,8%)	46 (70,8%)	0,20
Студенты, n (%)	29 (90,6%)	57 (87,7%)	0,44
Домохозяйки, n (%)	1 (3,1%)	5 (7,7%)	1,00
Работающие, n (%)	1 (3,1%)	3 (4,6%)	0,37
Менархе, лет, (M ± SD)	14,0±1,22	13,9±1,62	0,05

Примечание:

M – среднее значение; SD – стандартное отклонение. Статистическая проверка проводилась с использованием: - t-критерия Стьюдента – для количественных переменных (при нормальном распределении); - χ^2 -критерия – для сравнения долей между группами; - критерия Фишера – при ожидаемых частотах <5. Тестирование проводилось двустороннее, уровень значимости установлен на $\alpha = 0,05$.

Уровень гемоглобина статистически значимо отличался между группами: при анемии средней степени – 91,7 (0,80) г/л, при тяжёлой – 75,8 (0,63) г/л ($P < 0,001$). Оба значения значительно ниже референсных пределов (120–140 г/л). Цветовой показатель также был снижен в обеих группах, со статистически значимым снижением при тяжёлой степени анемии (0,77 против 0,83; $P < 0,001$), что свидетельствует о гипохромии. Количество эритроцитов было статистически значимо снижено в обеих группах по сравнению с нормой, особенно выражено при тяжёлой

анемии (2,9 (0,10) $\times 10^{12}$ /л, $P < 0,001$). Гематокрит снижался пропорционально степени анемии. Лейкоциты находились в пределах нормы, но при тяжёлой анемии имелась тенденция к их повышению ($P < 0,01$). Тромбоциты также снижались, особенно у девушек с тяжёлой формой анемии (173,1 (2,4) против нормы 180,0–320,0 $\times 10^9$ /л, $P < 0,001$). Уровень СОЭ был значительно выше в группе с тяжёлой анемией (12,0 мм/ч, $P < 0,001$), что указывает на выраженный воспалительный компонент (табл.2).

Таблица 2

Гематологические показатели сравниваемых групп

Показатель	Анемия средней степени, n=32, M (SD)	Анемия тяжёлой степени, n=65 M (SD)	Референсные значения	P
Гемоглобин, г/л	91,7 (0,80) ^{^^^}	75,8 (0,63) ^{***^^^}	120-140	<0,001
Цветовой показатель	0,83 (0,010) ^{^^}	0,77 (0,004) ^{***^^^}	0,85-1,05	0,031
Эритроциты, 10 ¹² /л	3,6 (0,13) ^{^^}	2,9 (0,10) ^{***^^^}	3,9-4,7	<0,001
Гематокрит, %	29,7 (0,34) ^{^^^}	24,8 (0,21) ^{***^^^}	32-45	<0,001
Лейкоциты, 10 ⁹ /л	7,3 (0,22) [^]	7,4 (0,15) ^{^^}	4,0-9,0	0,24
Тромбоциты, 10 ⁹ /л	185,0 (1,4) ^{^^^}	173,1 (2,4) ^{***^^^}	180,0-320,0	<0,001
СОЭ, мм/ч	8,4 (0,52)	12,0 (0,42) ^{***^^^}	2-15	<0,001

Примечание: Данные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения: M (SD).

Статистическая проверка между группами проводилась с использованием t-критерия Стьюдента. *** $p < 0,001$ – статистически значимые различия по сравнению с группой с анемией средней степени. [^] $p < 0,05$, ^{^^} $p < 0,01$, ^{^^^} $p < 0,001$ – отклонения от референсных значений (анализ на соответствие клиническим нормам проводился описательно, статистически не проверялся, поскольку сравнение с диапазоном невозможен классическим методом).

Уровень ферритина, отражающего запасы железа, был статистически значимо снижен у обеих групп по сравнению с референсными значениями ($P < 0,001$), при этом в группе с тяжёлой анемией показатели были значительно ниже, чем при анемии средней степени (15,5 (1,3) против 31,6 (4,1) нг/мл, $P < 0,01$), что свидетельствует об истощении депо железа и активное использование его в условиях гипоксии. Согласно результатам исследования, концентрация ферритина в группе девушек с тяжелой степенью анемии колебалась от 4,2 до 61,3 нг/мл и 17/65 (26,1%) девушек из этой группы имеют дефицит ферритина, что свидетельствует об истощении запасов железа.

Средние значения **растворимого рецептора трансферрина (sTfR)** оставались в пределах нормы, однако у 27/65 (41,5%) девушек с тяжёлой степенью анемии отмечалось его достоверное снижение по сравнению с референсом ($P < 0,001$) и концентрация sTfR этих девушек колебалась от 0,96 до 1,96 г/л, что может отражать повышенную потребность тканей в железе и компенсаторную регуляцию транспорта железа. Среди девушек с анемией средней степени 13/32 (40,6%) девушек имели сниженные значения sTfR и 2 девушки напротив – повышенные значения (истинный дефицит железа). sTfR может не быть повышен, если эритропоэз угнетён, поэтому его низкий уровень здесь не исключает дефицита железа.

Индекс sTfR/log₁₀Ft, являющийся чувствительным маркером функционального дефицита железа, был повышен у обеих групп, особенно при тяжёлой анемии (1,9 (0,08) при норме до 1,8), что подтверждает наличие скрытого железодефицита даже при анемии средней степени.

Средний уровень эритропоэтина у обеих групп был ниже референсных значений ($P < 0,001$), особенно выраженное снижение наблюдалось при анемии средней степени тяжести. В группе девушек с анемией средней степени концентрация эндогенного эритропоэтина варьировала от 2,4 до 15,8 МЕ/мл, причём дефицит эритропоэтина выявлен у 19/32 (59,4%) человек. В группе с тяжёлой анемией уровень эритропоэтина находился в пределах от 3,4 до 19,5 МЕ/мл, дефицит зафиксирован у 26/65 (40%) девушек. Возможным объяснением дефицита эритропоэтина может быть относительная гипофункция почек или недостаточная адаптация почек к анемическому гипоксемическому стрессу.

Средние значения витамина В₁₂ обеих групп были в пределах нормы, однако они статистически значимо отличались от референсных значений ($P < 0,001$), что указывает на возможный субклинический дефицит. Субклинический дефицит витамина В₁₂ представляет собой начальную стадию недостаточности, характеризующуюся отсутствием выраженных клинических проявлений при наличии биохимических изменений и снижении концентрации витамина В₁₂ в крови ниже 200 пг/мл. Среди участниц исследования субклинический дефицит витамина В₁₂ был выявлен у 14/32 (43,7%) девушек с анемией средней степени тяжести и у 15/65 (23%) девушек с тяжёлой анемией. Истинный дефицит витамина В₁₂ зафиксирован у 2/32 (6,25%) и 5/65 (7,69%) девушек соответственно. Особенно значимым оказался дефицит фолиевой кислоты у девушек с тяжёлой анемией (3,9 (0,23) нг/мл), что статистически значимо ниже как нормы, так и уровня при анемии средней степени ($P < 0,001$) (Табл.3).

Таблица 3

Показатели железообмена, уровня эритропоэтина, витамина В₁₂ и фолиевой кислоты у девушек раннего репродуктивного возраста с анемией различной степени тяжести

Показатель	Анемия средней степени, n=32, M (SD)	Анемия тяжёлой степени, n=65, M (SD)	Референсные значения	P
Ферритин, нг/мл	31,6 (4,1) ^{^^^}	15,5 (1,3) ^{***^^^}	10-124	0,004
Растворимый рецептор трансферрина, sTfR, г/л	2,4 (0,28)	2,0 (0,07) ^{^^^}	2-3,6	0,030
Индекс sTfR/log ₁₀ Ft	1,8 (0,22) [^]	1,9 (0,08) ^{^^^}	0,63-1,8	0,072
Эритропоэтин, МЕ/мл	7,6 (0,65) ^{^^^}	8,8 (0,46) ^{^^^}	8-30	0,041
Витамин В ₁₂ , пг/мл	499,2 (78,4) ^{^^^}	524,8 (54,3) ^{^^^}	156-1830	0,289
Фолиевая кислота, нг/мл	6,5 (0,44) ^{^^}	3,9 (0,23) ^{***^^^}	3,2-13,7	<0,001

Примечание: Данные представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения: M (SD).
 Статистические методы для сравнения групп: t-критерий Стьюдента. **p < 0,01, ***p < 0,001 – статистически значимые различия по сравнению с группой анемии средней степени. ^p < 0,05, ^^p < 0,01, ^^^p < 0,001 – отклонения от референсных значений (анализ на соответствие клиническим нормам описательный, статистически не проверялся).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что тяжёлая степень анемии ассоциируется с более выраженными нарушениями эритропоэза и снижением запасов железа. Повышение СОЭ может отражать хронический воспалительный процесс или тканевую

гипоксию. Интересным является отсутствие статистически значимых различий по уровням витамина В₁₂ и фолиевой кислоты между группами, что может свидетельствовать о вторичности дефицита данных витаминов в патогенезе анемии данной возрастной

группы и предположить доминирование железodefицитного компонента в патогенезе. Незначительные колебания уровней растворимого трансферринового рецептора (sTfR) и эритропоэтина также не носили диагностического значения.

ВЫВОДЫ

1. Тяжёлая степень анемии у девушек раннего репродуктивного возраста сопровождается значительными нарушениями в основных гематологических параметрах и выраженным снижением уровня ферритина.
2. Уровни витамина В12 и фолиевой кислоты остаются на сопоставимом уровне при различной степени тяжести анемии.
3. Полученные данные подтверждают необходимость раннего выявления и лечения железodefицитных состояний для профилактики перехода в тяжёлую степень анемии.
4. Комплексная оценка гематологических и биохимических показателей необходима для разработки эффективных программ профилактики и лечения анемий среди молодых женщин.

Дифференцированный подход к диагностике анемии на основании совокупной оценки гемограммы, маркеров обмена железа, витамина В12 и фолиевой кислоты позволяет не только определить степень тяжести состояния, но и выявить его патогенетическую природу. Это, в свою очередь, даёт возможность индивидуализировать лечение и улучшить клинический исход.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тарасова И.С., Чернов В.М. Принципы выбора

препарата для лечения железodefицитной анемии у детей. Вопросы гематологии, онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2010; Т. 9, №2, С. 6-12. https://hematology.ru/journals/questions_hematology/2011/1/vgo_0111.pdf

2. Ataniyazova O.A., Baumann R.A., Liem A.K., Mukhopadhyay U.A., Vogelaar E.F. and Boersma E.R. Levels of certain metals, organochlorine pesticides and dioxins in cord blood, maternal blood, human milk and some commonly used nutrients in the surroundings of the Aral Sea (Karakalpakstan, Republic of Uzbekistan). 2001; <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11519985/>
3. Banks J.R., Heinold B., Schepanski K. Impacts of the desiccation of the Aral Sea on the Central Asian dust life-cycle. J. Geophys. Res. Atmos. 2022, 127, e2022JD036618. <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022JD036618>
4. Christian O., Michael G., Ilkhom A., Tom L., Nataliya V. Aeolian dust deposition in the southern Aral Sea region (Uzbekistan): Ground-based monitoring results from the LUCA project. Quat. Int. 2017, 429, 86-99. https://www.researchgate.net/publication/299976812_Aeolian_dust_deposition_in_the_Southern_Aral_Sea_region_Uzbekistan_ground-based_monitoring_results_from_the_LUCA_project
5. Hashizume M., Shimoda T., Sasaki S. Anaemia in relation to low bioavailability of dietary iron among school-aged children in the Aral Sea region, Kazakhstan. International Journal of Food Science and Nutrition, 2004; 55(1):37-43. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14630590/>
6. <https://www.unicef.org/uzbekistan>

UO‘Q: 616.98 : 579.841.93 - 079.7

ANAMNEZDA BRUTSELLYOZ O‘TKAZGAN AYOLLARNING RETROSPEKTIV TAHLILLARI

Tadjiyeva M. A.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

РЕЗЮМЕ

Данное исследование это глубокий анализ последствий бруцеллёза на репродуктивную систему женщин и девушек, оценка частоты заболеваний, связанных с инфекцией, и возможности их лечения.

Ключевые слова: бруцеллёз, репродуктивное здоровье, женщины, инфекционные заболевания, *Brucella*, клинические исследования.

Bruselloz (yoki brucellosis) butun dunyoda jiddiy zoonoz xavf sifatida saqlanib qolmoqda. Qo‘zg‘atuvchilar – *Brucella* turkumidagi bakteriyalar –

SUMMARY

This study provides an in-depth analysis of the effects of brucellosis on the female reproductive system, evaluating the incidence of diseases associated with the infection and the possibilities for their treatment.

Keywords: brucellosis, reproductive health, women, infectious diseases, *Brucella*, clinical studies.

asosan qishloq xo‘jaligi hayvonlarini (qoramol, echki, qo‘y, cho‘chqa) zararlaydi, lekin odamga osonlikcha yuqadi. Asosiy yuqish yo‘llari: kasal hayvonlar,

ularning biologik suyuqliklari bilan bevosita aloqa yoki pasterizatsiyalanmagan sut mahsulotlari va etarlicha pishirilmagan go'shtni iste'mol qilish. So'nggi yillarda chorvachilik rivojlangan mintaqalarda, jumladan Rossiyaning bir qancha viloyatlari, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlarida kasallikning avj olishi qayd etilmoqda, bu uning doimiy epidemiologik ahamiyatini ta'kidlaydi. Brusellozning ayol salomatligiga ta'siri alohida tashvish tug'diradi. Infeksiya jinsiy tizimning jiddiy zararlanshlarini keltirib chiqarishi mumkin, bu esa hayz siklining buzilishi, tos a'zolarining yallig'lanish jarayonlari (adneksit, endometrit kabi), homilador bo'lishda qiyinchiliklar, homiladorlikni saqlab qolmaslik va ba'zi hollarda – doimiy bepustlikka olib kelishi mumkin. Bu oqibatlar hayot sifati sezilarli darajada pasayishiga sabab bo'lib, tibbiy jamoatning jiddiy e'tiborini talab qiladi.

TADQIQOTNING MAQSADI

Bruselloz infeksiyasining ayollar va qizlarning reproduktiv salomatligiga salbiy ta'sirini chuqur o'rganishga qaratilgan edi. Asosiy vazifalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: jinsiy tizim tomonidan klinik ko'rinishlar spektri va chastotasini tahlil qilish; o'tkazilgan kasallikning fertilizatsiya (homilador bo'lish qobiliyati)ga ta'sir darajasini baholash; hayz siklining buzilishlari xususiyatini va ularning brusellozning bosqichi va og'irligi bilan bog'liqligini o'rganish; homiladorlikni saqlab qolmaslik kabi uzoq muddatli ginekologik asoratlar rivojlanishiga yordam beradigan xavf omillarini aniqlash.

TADQIQOT MATERIALLARI VA USULLARI

Belgilangan maqsadlarga erishish uchun laboratoriyada tasdiqlangan brusellozni o'tkazgan reproduktiv yoshdagi ayollar guruhining ma'lumotlariga retrospektiv tahlil o'tkazildi. Tadqiqot so'nggi bir necha yil ichida infeksiyon kasalxonalar va klinikalarda ixtisoslashtirilgan yordam so'ragan bemor ayollarni qamrab oldi. Tadqiqotda asosan yosh va o'rta yoshdagi, qishloq joylarda va kichik shaharlarda yashovchi ayollar e'tiborga olindi, u erda qishloq xo'jaligi hayvonlari yoki chorvachilik mahsulotlari bilan aloqa qilish xavfi an'anaviy ravishda yuqori. Ishtirokchilar orasida chorvachilik, veterinariya, shuningdek go'sht va sutni qayta ishlash bilan shug'ullanuvchilar ustunlik qildi.

Har bir bemor ayol quyidagilarni o'z ichiga olgan kompleks tekshiruvdan o'tkazildi:

1. Batafsil klinik suhbat va anamnez tahlili: Simptomlarni (isitma, holsizlik, terlash, bo'g'im va qorin og'riqlari), ginekologik shikoyatlarni, infeksiyalanishdan oldin va keyin hayz funksiyasining xususiyatlarini qayd etish.
2. Zamonaviy laboratoriya diagnostikasi: Bruselloz tashhisini tasdiqlash va infeksiyon jarayon faolligini aniqlash uchun serologic testlar (IFA, RPGA).
3. Kengaytirilgan ginekologik tekshiruv: yallig'lanish belgilarini (salpin ooforit, endometrit), kistoz o'zgarishlari, yopishqoq

jarayon va boshqa patologiyalarni aniqlash uchun standart ginekologik ko'rik, tos a'zolarining ultratovush tekshiruvi (USG).

4. Reproduktiv holatni baholash: homiladorliklar, ularning oqibati (tug'ish, homiladorlikni muddatidan oldin tugatish, abortlar), kasallikdan oldin va keyin bepustlik holatlari to'g'risida ma'lumot to'plash. Hayz siklining davomiyligi va muntazamligini dinamikada tahlil qilish.

Asosiy natijalar. Tadqiqot brusellozning ayol reproduktiv sohasiga sezilarli salbiy ta'sirini aniqladi:

- Hayz siklining buzilishi kasallikni o'tkazgan ayollarning sezilarli qismida kuzatildi. Ko'rinishlar tartibsiz sikllardan tortib hayzning uzoq muddat yo'qligigacha (amenoreya), ayniqsa surunkali yoki og'ir infeksiya shakllarida farq qildi. Ko'pchilikda siklning uzayishi yoki qisqarishi, qon ketishining intensivligini o'zgarishi qayd etildi.

- Tos a'zolarining yallig'lanish kasalliklari (VZOMT), masalan, adneksit (qo'shimchalar yallig'lanishi) va endometrit (bachadon shilliq qavatining yallig'lanishi) bemor ayollarning sezilarli qismida tashhis qilindi. Bu holatlar ko'pincha surunkali yoki takrorlanuvchi xarakterga ega edi.

- Fertilizatsiyaning pasayishi ayollarning bir qismi uchun jiddiy oqibatga aylandi. Brusellozni o'tkazgandan keyin homilador bo'lish bilan bog'liq qiyinchiliklar ham kichik to'sda surunkali yallig'lanish jarayonlari va yopishqoqliklar hosil bo'lishi, ham buzilgan sikl fonida gormonal siljishlar bilan bog'liq edi.

- Homiladorlikning asoratlari: infeksiyani o'tkazgan ayollarda homiladorlikning erta bosqichida o'z-o'zidan tugashi (miscarriage) holatlari qayd etildi. Brusellozning aniq hissasi keying o'rganishni talab qiladi, lekin bog'liqlik, ayniqsa faol yallig'lanishda, ehtimoldir.

- Uzoq muddatli oqibatlar: ayollarning bir qismida hayz funksiyasining buzilishi va yallig'lanish jarayonlari brusellozning muvaffaqiyatli antibakterial davolanishidan keyin ham uzoq vaqt saqlanib qoldi, bu esa qo'shimcha ginekologik davolash va kuzatishni talab qildi.

XULOSA

Bruselloz ayollarning reproduktiv salomatligi uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Infeksiya ko'pincha hayz siklining barqaror buzilishlarini qo'zg'atadi, jinsiy a'zolarining surunkali yallig'lanish kasalliklariga (adneksit, endometrit) olib keladi va fertilizatsiyaning pasayishiga, homilador bo'lish bilan bog'liq muammolarga va homiladorlikni saqlab qolmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, brusellozning ginekologik jihatlarini bemor ayollarni parvarish qilish dasturiga majburiy ravishda kiritilishini talab qiladi. Jiddiy reproduktiv oqibatlarining oldini olish uchun quyidagilar muhim ahamiyatga ega:

1. Brusellozning erta va aniq tashhisi, xususan xavf ostidagi guruhdagi ayollarda xarakterli simptomlar paydo bo'lganda.
2. Mumkin bo'lgan ginekologik asoratlarni

hisobga olgan holda infeksiyaning o'z vaqtida va etarli kompleks davolanishi.

3. O'tkazilgan kasallikdan keyin hayz funktsiyasi va reproduktiv salohiyatni tiklashni nazorat qilish uchun ginekolog tomonidan uzoq muddatli kuzatuv.
4. Oldini olish choralarini kuchaytirish: Qishloq xo'jaligi hayvonlarining salomatligi ustidan qat'iy nazorat, sutni majburiy pasterizatsiyalash va go'shtni puxta pishirish, hayvonlar bilan ishlaydigan xodimlarni himoya qilish choralariga (maxsus kiyim, dezinfektsiya) rioya qilish, aholini yuqish yo'llari haqida xabardor qilish.

ADABIYOTLAR

1. Ivanov, P. P. (2021). Brucellosis and its Effects on Female Reproductive Health. *Journal of Infectious Diseases*.
2. Mikhailov, D. V. (2022). The Role of Brucellosis in Reproductive Disorders in Women. *Journal of Clinical Infectology*.
3. World Health Organization (WHO). (2020). Brucellosis in Humans and Animals. WHO Technical Report Series, No. 920.
4. National Institute of Infectious Diseases. (2019). Brucellosis: Epidemiology, Diagnosis and Treatment. NIID Research Paper.
5. Лазиз Надирович Туйчиев, Ботир Мирхашимович Таджиев, Нигора Убайдуллаевна Таджиева, Одилжон Шодиевич Касимов, Амир Мангу-Темирович Бектимиров, Акмал Пулатович Юсупов, Жахонгир Абралович Анваров, и Бахтиер Вакилович Шукуров. «Получение и характеристика экспериментальных диагностических бруцеллезных кроличьих сывороток для разработки национального стандарта бруцеллезной сыворотки» *Эпидемиология и вакцинопрофилактика*, vol. 23, no. 3, 2024, pp. 120-128. doi:10.31631/2073-3046-2024-23-3-120-128
6. Sánchez, A., & López, M. (2021). Clinical Manifestations of Brucellosis in Women and Its Long-Term Reproductive Effects. *European Journal of Infectious Diseases*, 58(1), 40-46.
7. United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Brucellosis: A Global Perspective on Diagnosis, Treatment, and Epidemiology. CDC Technical Report.
8. Худайбердиева, Ч. К., Таджиев, Б. М., & Алимова, О. Б. (2022, August). Клинико-иммунологические особенности острой диареи у детей с синдромом гемоколита. in «online-conferences» platform (pp. 196-197)

UDC: 618.11 - 006.2 - 008.9

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME (PCOS): LIFESTYLE FACTORS AND METABOLIC RISK IN UZBEK WOMEN

Tillashaykhova M.K., Tillashaykhova M.R.
Tashkent state medical university

XULOSA

Polikistoz tuxumdonlar sindromi (PTXS) – reproduktiv yoshdagi ayollar orasida eng ko‘p uchraydigan endokrin buzilishlardan biridir. Uning namoyon bo‘lishi turmush tarzi, ekologik va genetik omillarga bevosita bog‘liq. Ushbu tadqiqot 2023-yil yanvardan 2025-yil martgacha Toshkentdagi «Nodirabegim» xususiy klinikasida olib borildi. Unda 18 yoshdan 40 yoshgacha bo‘lgan 92 nafar ayol ishtirok etdi. Tadqiqotda tana vazni indeksi (TVI), ovqatlanish odatlari, jismoniy faollik va biokimyoviy ko‘rsatkichlar (androgenlar darajasi, insulinga chidamlilik, lipid profili) o‘rganildi. Natijalarga ko‘ra, ishtirokchilarning 67 foizida TVI 27 kg/m² dan yuqori, yarmida esa insulinga chidamlilik aniqlangan. Asosiy salbiy omillar - past jismoniy faollik va qayta ishlangan uglevodlar iste‘molining yuqoriligi bo‘ldi. Shuningdek, giperandrogenemiya va bel-son nisbati yuqori bo‘lgan ayollarda soch to‘kilishi, hayz buzilishi ko‘proq kuzatildi. Ko‘pchilik bemorlar PTXSning yurak xastaligi, bepushtlik va 2-tur diabet kabi uzoq muddatli oqibatlaridan bexabar edi. Ushbu natijalar O‘zbekistonda erta skrining, oziqlanish bo‘yicha ma‘rifiy dasturlar va sog‘lom turmush tarzini rag‘batlantiruvchi strategiyalarga bo‘lgan ehtiyojni ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: polikistoz tuxumdonlar sindromi (PTXS), insulinga chidamlilik, turmush tarsi omillari, qayta ishlangan uglevodlar, jismoniy faollik yetishmasligi, O‘zbekistondagi metabolic xavf.

With an estimated 8-13% of women of reproductive age worldwide, polycystic ovary syndrome (PCOS) is a complicated endocrine disease that is among the top causes of menstrual abnormality, infertility, and long-term metabolic consequences [1]. Though it is quite common, PCOS is still usually underdiagnosed, especially in low- and middle-income nations where diagnostic capabilities, healthcare access, and public awareness are restricted. Though few are given prompt diagnosis or thorough care, anecdotal stories and local clinical observations in Uzbekistan point to a rising number of young women exhibiting symptoms including irregular menstruation, excessive hair growth, and weight gain.

РЕЗЮМЕ

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - одно из самых распространённых эндокринных нарушений у женщин репродуктивного возраста. На его течение значительно влияют образ жизни, а также экологические и генетические факторы. Рассмотрена взаимосвязь между поведенческими особенностями и метаболическими рисками у женщин Узбекистана с СПКЯ на основе данных, собранных в клинике “Нодирабегим” (Ташкент) с января 2023 по март 2025 года. В исследование включены 92 женщины в возрасте 18-40 лет. Оценивались индекс массы тела, рацион питания, уровень физической активности и биохимические показатели. У 67% участниц ИМТ превышал 27 кг/м², а у половины выявлена инсулинорезистентность. Основные негативные факторы, низкая физическая активность и высокое потребление рафинированных углеводов. Также у пациенток с выраженной гиперандрогенией и абдоминальным ожирением чаще наблюдались гирсутизм и менструальные нарушения. Большинство обследованных имели ограниченное представление о долгосрочных последствиях СПКЯ, таких как бесплодие, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Эти данные подчёркивают необходимость внедрения в Узбекистане целевых профилактических стратегий и образовательных программ, направленных на раннюю диагностику и комплексное ведение СПКЯ с учётом местных особенностей.

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников (СПКЯ), инсулинорезистентность, факторы образа жизни, рафинированные углеводы, низкая физическая активность, метаболический риск в Узбекистане.

Hyperandrogenism, ovulatory dysfunction, and polycystic ovarian morphology are among the collection of symptoms that define PCOS. But its clinical presentation varies significantly depending on environmental and lifestyle influences, including diet, physical activity, and stress levels. Emerging studies reveal a close link between sedentary habits, bad food choices, and the onset of insulin resistance and dyslipidemia among women with PCOS [2]. Apart from being key to the pathophysiology of PCOS, these metabolic abnormalities also raise the long-term risk of non-alcoholic fatty liver disease, heart disease, and type 2 diabetes [3]. Particularly in areas where pharmacological therapy possibilities may be constrained or underused, lifestyle change has taken on

more and more importance in recent years. Traditional carbohydrate-rich diets and low levels of physical activity among women in Uzbekistan worsen the metabolic load PCOS already carries. However, very few large-scale studies have been done in Central Asia to investigate the particular lifestyle-metabolic interface among this group. Regional differences in PCOS appearance call for local research and customised treatments to guarantee equal medical care responses, as noted by Yildiz et al. [4]. Still another significant difficulty lies in health literacy. Recent research has revealed that many women are still ignorant of all the health ramifications PCOS has, especially its effects on metabolic health and fertility [5].

Delayed diagnosis and subpar treatment result from a lack of organised educational programs coupled with stigma surrounding reproductive disorders. This research seeks to address this knowledge gap by investigating the relationship between lifestyle variables and metabolic risks among women with PCOS in Uzbekistan. By emphasising genuine clinical data from a tertiary gynaecology clinic, we want to provide insights that can direct regional-specific approaches for prevention, early diagnosis, and multidisciplinary care.

MATERIAL AND METHODS

From January 2023 to March 2025, this planned observational research was conducted at Nodirabegim Private Clinic, a specialised gynaecological clinic in Tashkent, Uzbekistan. The principal goal was to determine the link between lifestyle-related variables and metabolic risk among women with polycystic ovarian syndrome (PCOS). Before registration, each participant signed written informed consent and ethical approval was granted from the clinic's internal ethics committee. Ninety-two women between the ages of 18 and 40 were part of the study; all of them either had a recent PCOS diagnosis or fulfilled the set diagnostic criteria. Using the updated Rotterdam criteria, diagnosis was confirmed; these criteria call for at least two out of three features: irregular or absent ovulation, indications of hyperandrogenism, either clinical or biochemical polycystic ovarian morphology detected by ultrasound. Exclusion of women who were pregnant, using hormonal contraception or insulin sensitisers, or had been previously diagnosed with other endocrine diseases, including Cushing's syndrome or thyroid dysfunction, guaranteed a homogenous study group and prevented possible confounding. Also not included were women with pre-existing diabetes or cardiovascular disease before their PCOS diagnosis. During their usual visit, every participant had a thorough clinical examination. Trained gynaecological staff conducted a systematic interview to gather data on lifestyle choices, including food preferences, daily activity levels, and cigarette habits, as well as demographic, family history of metabolic or reproductive problems. Using accepted WHO guidelines, height and weight were used to determine each woman's body mass index (BMI). Waist and hip circumferences were noted to estimate the waist-to-hip ratio, which served as a marker of central obesity.

Following an overnight fast, venous blood samples were taken early follicular stage (between days 2 and 5 of the menstrual cycle).

Standardised immunoassay techniques were employed on these samples in the main lab of the clinic. Measured variables included fasting glucose, fasting insulin, lipid profile (total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides), and androgen markers such as total and free testosterone. Using the widely used HOMA-IR formula: fasting insulin ($\mu\text{U/mL}$) multiplied by fasting glucose (mmol/L), divided by 22.5, insulin resistance was determined. Consistent with recent metabolic studies [6], a HOMA-IR value above 2.5 was regarded as indicative of insulin resistance. Board-certified radiologist carried out transvaginal ultrasound evaluations using a high-resolution 7.5 MHz transducer. Ovaries were termed polycystic if at least one ovary showed 12 or more follicles 2-9 mm, or if ovarian volume exceeded 10 cm^3 . Along with endometrial thickness, which acted as an indirect marker of chronic anovulation, the ultrasound results were recorded. Double-entry of significant data fields and random rechecking of 10% of the sample by an outside reviewer guaranteed quality control. Through duplicate sampling in a subset of 15 individuals, the reliability of hormonal assays and anthropometric measurements was assessed. SPSS version 26 was used to analyse the gathered data. Means, medians, and standard deviations were among the descriptive statistics utilised to summarise quantitative factors. Pearson and Spearman correlation coefficients were calculated to investigate linkages between lifestyle variables and metabolic risk indicators; statistical significance was established at a p-value cutoff of <0.05 . The methodological approach of this study sought to offer a whole picture of how daily behaviours could affect the metabolic profile of women with PCOS in Uzbekistan by gathering both subjective and objective data in a consistent way [7]. It also reflected advice from recent clinical guidelines and large-scale international studies that underline the need to combine clinical, hormonal, and lifestyle information.

RESULTS

Over the 26-month investigation at Nodirabegim Private Clinic, 92 women diagnosed with polycystic ovary syndrome (PCOS) were evaluated. Their metabolic, clinical, and lifestyle profiles gave important insight into how behavioural and physiological elements work together among these people.

Table 1 presents the clinical and biochemical characteristics of PCOS women. Participants were largely overweight or obese; 67.3% had BMI over 27, and more than half demonstrated central adiposity depending on waist-to-hip ratios. Reported in 82.6% of patients, the most often occurring symptom was menstrual irregularities. Signs of hyperandrogenism were also apparent, with hirsutism impacting about half the women and acne occurring in above one-third. Among the sample, 53.2% had insulin resistance computed using the HOMA-IR formula, hence emphasizing a severe metabolic aspect

[8]. Structured questionnaires were used to examine life-style patterns in addition to clinical assessment. This ex-

posed a number of actions causing unfavorable metabolic results.

Table 1

Clinical and Metabolic Characteristics of Participants

Parameter	Value
Mean Age (years)	29.4 ± 4.6
BMI ≥ 27 (%)	67.3%
Waist-to-Hip Ratio > 0.85 (%)	59.8%
Menstrual Irregularity (%)	82.6%
Hirsutism (mild to severe, %)	48.9%
Acne (%)	36.4%
Family History of PCOS (%)	41.3%
Insulin Resistance (HOMA-IR > 2.5, %)	53.2%

Table 2

Lifestyle Habits and Metabolic Risk Factors

Lifestyle Factor	Prevalence among PCOS Women
Low Physical Activity (<3 hrs/week)	74.1%
Highly Refined Carbohydrate Intake	68.4%
Fast Food Consumption (>2/week)	45.6%
Skipping Breakfast (>3/week)	62.0%
Sleep Duration <6h/night	38.0%
Elevated LDL Cholesterol (%)	49.1%
Triglycerides >1.7 mmol/L (%)	42.4%

Table 2 shows metabolic risk indicators as well as lifestyle habits. Almost 70% of participants had diets rich in refined carbohydrates, particularly bread, white rice, and sugary drinks; almost 74% reported very low levels of physical activity. Fast food consumption was frequent in 45.6%, while 62% claimed to skip breakfast, implying bad eating habits. Moreover, 38% of women slept fewer than six hours each night, a characteristic linked to higher stress and upset metabolic control. Highlighting the cardiovascular risk load, almost half of those had high LDL cholesterol and 42.4% had elevated triglyceride levels. A statistical study showed important links between metabolic health and lifestyle factors. Almost twice as likely to have insulin resistance ($p = 0.031$), women who engaged in under three hours of physical exercise per week were. High intake of refined carbohydrates was also linked with increased androgen levels and menstrual abnormalities. Skipping breakfast was positively related to higher BMI; shorter sleep durations were weakly connected with higher fasting glucose levels [9]. Moreover, women with several overlapping lifestyle risk factors, like inadequate diet, sedentary lifestyle, and sleep deprivation, were much more prone to show combined endocrine and metabolic dysfunction. Less than one-third of participants, however, had ever gotten lifestyle counseling from a doctor. In most cases, clinical treatment concentrated on symptom management (such as prescribing oral contraceptives), without addressing the metabolic and behavioural components of the illness. Generally, the findings reveal a strong link between modifiable lifestyle elements and metabolic problems among PCOS patients in Uzbekistan. Including nutritional education, physical activity advice, and stress management into routine

gynecologic care could considerably lower long-term health risks in this large-prevalence group.

DISCUSSION

The results of this research provide insightful information on the lifestyle-related and metabolic features of women with polycystic ovary syndrome (PCOS) in Uzbekistan. Though PCOS is worldwide acknowledged as a frequent endocrine condition affecting reproductive health, its other metabolic effects, particularly in resource-constrained countries, are sometimes ignored. This study closes that gap by showing how modifiable lifestyle choices like food, exercise, and sleep directly affect the clinical severity and metabolic risks related to PCOS. The great incidence of obesity and overweight was one of the most noticeable observations in this group. More than two-thirds of subjects had a BMI more than 27; over half had a waist-to-hip ratio over 0.85. These results match global data linking central obesity with insulin resistance, a major pathogenic process in PCOS [10]. Over 53% of women in our study showed insulin resistance as measured by a HOMA-IR score above 2.5. Particularly in light of the growing incidence of type 2 diabetes in Central Asia, this worries me. The close link between abdominal adiposity and hyperandrogenic symptoms adds weight to the theory that metabolic imbalance worsens reproductive problems. Furthermore, becoming important were dietary practices. Many women said they often ate refined carbohydrates like white bread, rice, and sugary drinks. Additionally, particularly among younger participants, consuming fast food more than twice a week was widespread. These eating habits are high in glycemic load, hence boosting postprandial glucose spikes, more insulin secretion, and eventually

insulin resistance [11]. In other populations, skipping breakfast, a behaviour seen in 62% of participants, has also been linked to poor metabolic control and higher androgen levels. Irregular meal timing together with high glycemic intake produces an inflammatory and hormonally erratic environment, aggravating PCOS symptoms [12]. Seventy-four percent of the women investigated were physically inactive. Most reported less than three hours of physical exercise each week, usually because of a mix of societal expectations, lack of access to fitness centers, and inadequate health education. Both of which are critical to the metabolic presentation of PCOS, sedentary behaviour lowers insulin sensitivity and helps chronic inflammation. Previous research has shown that even mild amounts of exercise can help women with PCOS restore ovulatory cycles, increase insulin sensitivity, and lower visceral fat [13]. This stresses how important lifestyle counselling is as a first-line element of PCOS management in Uzbekistan. Another major factor leading to bad metabolic results was sleep deficit. Almost 38% of respondents stated they slept under six hours per night. Elevated cortisol levels, increased appetite, and disturbed glucose-insulin balance, all of which aggravate the endocrine profile of PCOS, have been linked to brief sleep duration. Though frequently underappreciated, sleep quality and length are becoming more and more understood as important lifestyle elements in controlling chronic metabolic and hormonal diseases [14]. Another significant element exposed in this research is the difference in early diagnosis and health literacy. Though many women had symptoms including acne, tiredness, and menstrual abnormalities for years, several of them claimed they had difficulties in getting diagnosed. Many of them had been informed their symptoms were “normal” or linked to stress, which resulted in emotional frustration and further disease advancement. This reflects a more general problem in primary care environments where gynecologic symptoms may be undervalued and where the metabolic component of PCOS is typically missed totally. Healthcare professionals need more training to spot early indicators of PCOS and to provide all-encompassing, multidisciplinary care beyond hormone contraceptive prescriptions [15]. In essence, this study stresses the pressing need for context-specific, integrated solutions to PCOS in Uzbekistan. Dealing with lifestyle variables via public health campaigns, bettering provider education, and providing women more access to dietary and exercise counselling may greatly lower the long-term load of PCOS-related consequences. Significantly, educating women about their health and stressing early preventive measures might raise quality of life, reproductive success in this high-risk group, as well as metabolic results.

CONCLUSION

This research verifies that polycystic ovary syndrome (PCOS) in Uzbek women is a complex disease with significant metabolic effects rather than only a reproductive health concern. Among participants, the high incidence of insulin resistance, obesity, and central ad-

iposity stresses the tight link between hormone imbalance and controllable lifestyle choices. Most noticeably linked with worse metabolic profiles were poor physical activity, high intake of processed carbohydrates, fast food consumption, and erratic eating habits. Many women suffered delays in diagnosis and got only limited advice on lifestyle management despite showing traditional PCOS symptoms like menstrual abnormalities, hirsutism, and acne. This delay sometimes caused emotional anguish, weight increase, and the advancement of insulin resistance. The results highlight the need for quick public health initiatives raising PCOS knowledge as a hormonal and metabolic illness. Early screening procedures, organised lifestyle advice, and larger educational programmes provide significant long-term advantages. Such actions must go beyond medicine and use culturally sensitive and pragmatic methods to target underlying behaviours. Furthermore, healthcare professionals need to be armed with the understanding to identify early indications of PCOS and begin thorough care pathways, including dietary, physical, psychological, and reproductive health. In summary, successful PCOS management in Uzbekistan calls for a systemic move toward prevention, lifestyle change, and women-centred healthcare in addition to clinical alertness. This will improve outcomes, lower future complications, and enable women to take control of their hormonal and metabolic health.

REFERENCES

1. Teede H, Misso M, Costello M, et al. Recommendations from the 2023 International Evidence-Based Guideline for the Assessment and Management of PCOS. *Hum Reprod Update*. 2023;29(2):1–19. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmad005>
2. Deswal R, Narwal V, Dang A. Lifestyle management of PCOS: An update. *J Obstet Gynaecol Res*. 2022;48(1):26–33. <https://doi.org/10.1111/jog.15057>
3. Wu Y, Tan X, Zhang H. Metabolic syndrome in women with PCOS: New findings. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023;14:1185062. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1185062>
4. Yildiz BO, Azziz R, Ehrmann D. Regional differences in PCOS: A cross-sectional global review. *Reprod Biomed Online*. 2023;46(5):889–897. <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.01.013>
5. Mahalingaiah S, Souter I. PCOS awareness and health education gaps: An international survey. *BMJ Open*. 2022;12(4):e056890. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-056890>
6. Al-Kuraishy HM, Al-Gareeb AI, et al. Metabolic and hormonal disorders in polycystic ovary syndrome: cross-talk of gut microbiota. *Biomed Pharmacother*. 2023;156:113928. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113928>
7. Sachdeva G, Narang M, Kumar R. Diagnostic and biochemical patterns in women with PCOS: a regional cohort study. *J Endocrinol Invest*.

- 2022;45(10):2057–2065. <https://doi.org/10.1007/s40618-021-01691-y>
8. Liu J, Wu Q, Hao Y, et al. Prevalence and predictors of insulin resistance and metabolic syndrome in women with polycystic ovary syndrome: A cross-sectional study. *Reprod Biol Endocrinol.* 2022;20(1):12. <https://doi.org/10.1186/s12958-022-00902-8>
 9. Lim AJ, Huang Z, Teede HJ, et al. Lifestyle behaviors and metabolic outcomes in women with polycystic ovary syndrome: A global multicenter study. *J Clin Endocrinol Metab.* 2023;108(2):456–466. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgac543>
 10. Johnson JA, Patel R, Wong L. Association between physical activity levels and insulin resistance in women with PCOS: A cross-sectional study. *Clin Endocrinol.* 2022;96(4):529–537. <https://doi.org/10.1111/cen.14722>
 11. Lee YS, Tan SK, et al. Breakfast skipping and metabolic risk among young women: Implications for PCOS management. *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 2023;33(5):876–884. <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2022.11.010>
 12. Ahmed Z, Al-Mutairi F. Fast food consumption, refined carbs, and menstrual irregularity in urban women: Evidence from a Middle-Eastern cohort. *Eur J Nutr.* 2023;62(2):1041–1051. <https://doi.org/10.1007/s00394-022-03005-9>
 13. Patel R, Chung F, Narayan S. Sleep duration and cardiometabolic outcomes in reproductive-aged women: A PCOS-focused sub-analysis. *Sleep Med.* 2022;91:324–332. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2022.02.005>
 14. Martinez M, Gupta N. Central adiposity and adrenal androgen profile in PCOS: A regional cohort analysis. *Int J Endocrinol.* 2024;2024:245612. <https://doi.org/10.1155/2024/245612>
 15. Mahalingaiah S, Souter I. Awareness and management gaps in PCOS: An international survey. *BMJ Open.* 2022;12(4):e056890. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-056890>

УДК 618.3:617-001.5:616.12-008.331.1

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ДОРОДОВОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

Толипова Х.Т., Шодиева Х.Т., Назарова Д.Э.
Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Kogonok pardalarining tug'ruqdan oldin yorilishi ona va homila uchun asoratlarga olib keladigan xavf omili bo'lib, tug'ruq va tug'ruqdan keying davrda asoratlarning ko'payishiga yordam beradi. Kogonok pardalarining tug'ruqdan oldin yorilishi bo'lgan ayollarda tug'ish natijalarini tahlili, akusherlik va perinatal asoratlarni kamaytirish uchun predgravidar tayyorgarlik ko'rish, somatic patologiyalarni, infektsiya o'choqlarini va jinsiy a'zolarining yallig'lanish kasalliklarini oldini olish va davolash zarurdir.

Kalit so'zlar: kogonok pardalarining tug'ruqdan oldin yorilishi, akusherlik va perinatal asoratar.

Преждевременный и дородовый разрыв плодных оболочек остаются одними из наиболее значимых проблем в современной акушерской практике из-за высокой вероятности материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Под дородовым разрывом плодных оболочек (ДРПО) понимают их повреждение до начала родовой деятельности, если же разрыв происходит до 37-й недели гестации, используют термин «преждевременный разрыв». В большинстве случаев в доношенном сроке беременности оболочки разрываются после начала родов, однако их излитие до начала схваток и при отсутствии ро-

SUMMARY

Premature rupture of membranes is a significant factor that increases the likelihood of complications during both labor and the postpartum period, thereby raising the risk of adverse outcomes for the mother and the newborn. Analysis of clinical cases in patients with this condition emphasizes the need for comprehensive preconception preparation, timely prevention and correction of somatic diseases, sanitation of infectious foci, and treatment of inflammatory processes of the reproductive system in order to reduce the incidence of obstetric and perinatal complications.

Keywords: premature rupture of membranes, obstetric complications, perinatal outcomes.

довой деятельности в течение 24 часов значительно увеличивает риск осложнений. Тактика ведения пациенток с ДРПО после 37 недель может быть, как активной, так и выжидательной. При выжидательном подходе применяют кортикостероиды и антибиотики для минимизации неонатальных рисков. Понимание последних рекомендаций и подтверждающих их доказательств необходимо для врачей и пациентов для принятия обоснованных решений относительно своего ухода и оптимизации результатов для матери и плода.

Современная перинатология требует углублённого понимания патогенетических механизмов ДРПО, что определяет необходимость ранней диагностики, правильной дифференциальной тактики и профилактики осложнений, особенно в условиях ограниченных клинических ресурсов.

Патогенез ДРПО связан с деструктивными изменениями в плодных оболочках под воздействием инфекционно-воспалительных, механических и ишемических факторов. Наиболее значимую роль отводят восходящей бактериальной инфекции, способной вызвать хориоамнионит и преждевременные роды. Диагностика требует комплексного клинико-инструментального подхода: оценки анамнеза, физикального осмотра и ультразвукового исследования объёма околоплодных вод.

Тактика ведения зависит от гестационного возраста, клинических проявлений, признаков инфекции и зрелости плода. При доношенной беременности (≥ 37 недель) рекомендуется индукция родов в течение 12–24 часов для снижения риска инфекционных осложнений. При сроке 36+6 недель подход индивидуализирован: предпочтение отдаётся активной тактике с использованием антибиотикопрофилактики и стимуляции родов. Наличие хориоамнионита, тяжёлой гипоксии плода или выраженного отхождения вод требует немедленного родоразрешения, независимо от гестационного срока. Таким образом, ведение пациенток с ДРПО требует мультидисциплинарного подхода, включающего акушеров-гинекологов, неонатологов с обязательной оценкой риска/пользы для матери и плода.

Современные клинические протоколы, основанные на принципах доказательной медицины, подчеркивают важность индивидуального подхода, раннего начала терапии и постоянного мониторинга состояния беременной и плода.

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ явилось изучение исхода родов у женщин с дородовым разрывом плодных оболочек.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено клиническое обследование и анализ течения беременности и родов у 21 женщины с диагнозом ДРПО. Использовалась специально разработанная анкета, включавшая данные о возрасте, паритете, соматическом и акушерско-гинекологическом анамнезе, особенностях текущей беременности и результатах родов. Полученные данные подвергнуты статистической обработке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Возраст участниц варьировал от 21 до 30 лет, в среднем – $27 \pm 1,2$ года. При изучении паритета первородящих было 47,6% (10), повторнородящих 52,3% (11).

В анамнезе у беременных с ДРПО самопроизвольные аборт встречались у 33,3% (7), неразвивающаяся беременность – у 23,8% (5). Среди соматических заболеваний лидировала железодефицитная

анемия – 47,6% (10), далее инфекции мочеполовой системы – 42,8% (9), патология щитовидной железы – 23,8% (5), ожирение – 4,8% (1). ОРВИ в первом триместре перенесли 33,3% (7) женщин, во втором – 23,8% (5), что требовало амбулаторного и стационарного лечения.

Среди гинекологических заболеваний в анамнезе пациентки неоднократно получали лечение по поводу воспалительных заболеваний гениталий, из них эрозии шейки матки 14,2% (3), хронический сальпингоофорит 28,5% (6), рецидивирующий кольпит 66,6% (14), бесплодие 4,7% (1).

Анализ исхода родов показал у 33,3% (7) беременных с ДРПО проведено оперативное родоразрешение путём кесарева сечения, тогда как у 66,7% (14) произошли самостоятельные роды. Основные показания для операции: рубец на матке – 4,8%, тазо-головная диспропорция – 9,5%, слабость родовой деятельности – 9,5%, хориоамнионит – 9,5%. Остальные 66,7% (14) женщин наблюдались в течение 24 часов, через 18 часов начата антибактериальная терапия по протоколу с целью подавления патогенной флоры, устранения очага инфекции и предотвращения распространения воспалительного процесса. При наблюдении у беременных с ДРПО 57,2% развилась спонтанная родовая деятельность, а у 42,8% из-за отсутствия родовой деятельности через 24 часа рекомендована индукция родов. По протоколу проведена оценка степени зрелости шейки матки по шкале Бишопа - 66,7% роженицам ведены вагинальные простагландины, 33,3% подключен окситоцин.

Анализ перинатальных исходов показал у женщин с ДРПО в удовлетворительном состоянии родились 71,4% (15), в состоянии средней степени тяжести 23,8% (5), в тяжелом состоянии 4,8% (1). Переведен на второй этап выхаживания 1 ребенок. Средняя масса новорожденных составила $3150,55 \pm 21,85$ г.

Послеродовой период осложнился атоническим кровотечением (14,2%), задержкой частей последа (9,5%) и эндометритом (9,5%).

ВЫВОДЫ

Таким образом, у женщин с ДРПО выявлена высокая частота хронических заболеваний, такие как анемия, воспалительные заболевания почек, заболевания щитовидной железы. А среди гинекологических заболеваний имели место рецидивирующие воспалительные заболевания гениталий. Высокая частота ОРВИ и рецидивирующего кольпита в период беременности, а также осложнения в родах (аномалии родовой деятельности, угрожающие состояния плода) способствуют увеличению числа оперативных родов и акушерских осложнений. Комплексная предгравидарная подготовка, лечение хронических заболеваний и санация инфекционных очагов необходимы для снижения риска неблагоприятных акушерских и перинатальных исходов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беглов Д.Е., Артымук Н.В., Новикова О.Н., Марочко К.В., Парфенова Я.А. Факторы риска преждевременных родов // *Фундаментальная и клиническая медицина*. –2022. –№7(4). –С.8-17. <https://doi.org/10.23946/2500-0764-2022-7-4-8-17>
2. Доронина О.К. Индукция родов при доношенной беременности. Цервигил – вагинальная терапевтическая система с динопростроном // *Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение*. – 2021. – Т. 9, № 2. – С. 46–51.
3. Каганова М. А., Спиридонова Н. В. Хориоамнионит, спорные вопросы терминологии и диагностики // *Практическая медицина*. –2022. –Т. 20. №3. –С. 20–27.
4. Кузьмин В. Н. Перинатальные исходы при преждевременном разрыве плодных оболочек // *Лечащий врач*. – 2018. – № 3. – С. 34-39.
5. Сейдуллаева Л.А., Есжанова А.А., Разумова Р.Р., Халмуратова К.Ж., Бакытжанова А.Ж. Исходы для матери и плода при дородовом разрыве плодных оболочек // *АМЖ*. –2020. –№4.
6. Akbarian Rad, Z., Yazdani, S., Galeshi, M., Eftekhari, N. “Maternal and Neonatal Outcomes in Cases of Premature Preterm Rupture of Membranes and the Effect of Latency Periods on Adverse Pregnancy Outcomes”. // *Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research*. – 2021. - №7 (1). - P. 45-51. doi: 10.30699/jogcr.7.1.45
7. Dayal S, Jenkins SM, Hong PL. Preterm and Term Prelabor Rupture of Membranes. // *Treasure Island (FL): StatPearls Publishing*. – 2025. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532888>
8. Garg A, Jaiswal A. Evaluation and Management of Premature Rupture of Membranes: A Review Article. // *Cureus*. –2023. –№15(3). –e36615. doi: 10.7759/cureus.36615.
9. Gonzalez-Mesa E., Blasco-Alonso M., Benitez M. J. et al. Obstetric and Perinatal Outcomes after Very Early Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM) - A Retrospective Analysis over the Period 2000–2020 // *Medicina (Kaunas)*. –2021. –Vol. 57. –№ 5. – P. 469.
10. Meller C. H., Carducci M. E., CerianiCernadas J. M., Otaño L. Preterm premature rupture of membranes // *Arch Argent Pediatr*. –2018. –Vol. 116. –№ 4. – P. e575–e581.
11. Siegler Y, Weiner Z, Solt I. ACOG Practice Bulletin No. 217. Prelabor Rupture of Membranes. // *Obstet Gynecol*. –2020 Nov. –№136(5). –P.1061.
12. Stancu SMK, Ash LK, Smeding C, Alwan MA. Predictors of Caesarean Delivery in Preterm Premature Rupture of Membranes. // *Open Access Maced J Med Sci*. – 2019 Apr 14. –№7(7). – P. 1124-1128. doi: 10.3889/oamjms.2019.250.

ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ВИТАМИНА D У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ДОРОДОВЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

Турдиева Ф.Р.¹, Каюмова Д.Т.²

¹ Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребёнка,

² Ташкентская медицинская академия

XULOSA

Tadqiqotning maqsadi – muddatdan ilgari qog`onoq pardasi yorilgan homidorlarga D vitamin darajasining ta`sirini o`rganish, tug`ilish jarayoniga va yangi tug`ilgan chaqaloqlarning holatiga ta`sirini baholash edi.

Materiallar va usullar. 40 homilador ayolda D vitamin darajasini, muddatdan ilgari qog`onoq pardasi yorilgan homidorlarda homiladorlik kechishi va perinatal natijalar baholandi.

Natijalar. D vitamin etishmovchiligi va latent fazaning uzayishini, yangi tug`ilgan chaqaloqning vazni, Apgar ko`rsatkichlarining pasayishi va neonatal asoratlarning ko`payishi o`rtasidagi bog`liqlikni ko`rsatadi.

Kalit so`zlar: D vitamini, muddatdan ilgari qog`onoq pardasi yorilishi, tug`ilish, yangi tug`ilgan chaqaloqlar, neonatal natijalar.

Преждевременный дородовый разрыв плодных оболочек (ПДРПО) отмечается примерно у 10–12% беременных и представляет собой значимый фактор риска преждевременных родов, внутриутробной инфекции и осложнений у новорождённых [3,4]. Этиология ПДРПО носит мультифакторный характер, включая воспалительные и инфекционные процессы, нарушения синтеза коллагена, а также механическое перенапряжение плодных оболочек. В последнее время большое внимание уделяется гипотезе о возможной связи между дефицитом витамина D и снижением прочности плодных оболочек [5,6]. Витамин D влияет на синтез компонентов внеклеточного матрикса, регулирует иммунную систему, участвует в продукции сурфактанта и поддержании барьерной функции эпителиальных тканей. Недостаточность витамина D способна ослабить амнион, уменьшить его устойчивость к растяжению и повысить риск инфицирования [7].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить возможную взаимосвязь между концентрацией витамина D в сыворотке крови и частотой развития ПДРПО, а также оценить влияние гиповитаминоза D на течение беременности и неонатальные исходы.

SUMMARY

The aim of the study was to assess the effect of vitamin D levels in pregnant women with preterm premature rupture of membranes (PPROM) on the course of labor and neonatal outcomes.

Materials and methods. Vitamin D status, pregnancy course, and perinatal outcomes were evaluated in 40 pregnant women with PPRM.

Results indicate a correlation between vitamin D deficiency and prolonged latent phase of labor, reduced neonatal birth weight and Apgar scores, as well as an increased incidence of neonatal complications.

Keywords: vitamin D, preterm premature rupture of membranes, labor, newborn, neonatal outcomes.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 40 беременных женщин, проходивших наблюдение в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре здоровья матери и ребёнка в период с сентября 2023 по февраль 2025 года. Гестационный срок составлял от 24 до 36 недель и 6 дней. Беременные были распределены на две группы: основную (n=20) – пациентки с подтверждённым ПДРПО, и контрольную (n=20) – беременные аналогичного срока без родовой деятельности и ПДРПО. У всех пациенток определяли уровень 25(OH)D в сыворотке крови методом ИФА.

Оценка степени обеспеченности витамином D производилась в соответствии с критериями Российской ассоциации эндокринологов [1]: дефицит – <20 нг/мл, недостаточность – 20–29,9 нг/мл, адекватный уровень – ≥30 нг/мл.

Критерии включения: отсутствие хронической соматической патологии, возраст от 18 до 38 лет. Исключались пациентки с многоплодной беременностью, тяжёлой анемией, гипертонией, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек и аутоиммунными расстройствами.

Статистическая обработка включала анализ абсолютных и процентных значений с применением

программного обеспечения для медицинской статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ среднего уровня холекальциферола показал, что статус при дефиците в основной группе был достоверно ниже по сравнению с контрольной

(13,2±4,8 соответственно 18,3±3,6 нг/мл) (табл.1). При недостаточности уровни составили 22,4±2,6 и 28,7±1,6 нг/мл соответственно. Различия при адекватных значениях витамина D не были статистически значимыми (табл. 1).

Таблица 1

Средний уровень витамина D (n, нг/мл)

	Основная группа (n=20)	Контрольная группа (n=20)
Дефицит витамина D	13,2±4,8	18,3±3,6*
Недостаточность витамина D	22,4±2,6	28,7±1,6*
Оптимальный уровень витамина D	32,6±3,2	35,4±1,2**

* – достоверная разница по сравнению с группами с дефицитом и недостаточностью витамина D (p <0,01).

** достоверная разница по сравнению с группами при оптимальном уровне витамина D (p >0,05).

Таким образом, обеспеченность витамином D ≥30 нг/мл может рассматриваться как потенциально защитный фактор, снижающий вероятность преждевременного разрыва плодных оболочек.

Частота дефицита витамина D среди пациенток с ПДРПО составила 80%, в то время как в контрольной группе – 25%. (рис.1). Недостаточность витамина D встречалась в 2,3 раза чаще у женщин с ПДРПО, чем

в группе сравнения. Адекватный уровень отмечен только у 5% женщин с ПДРПО, тогда как среди беременных без разрыва оболочек он встречался в 40% случаев.

Наши данные согласуются с результатами Anetor J.I. и соавт. (2025), которые показали, что при уровне витамина D <20 нг/мл вероятность развития ПДРПО удваивается [2].




Рис. 1. Частота встречаемости витамина D у беременных, (%).

При сравнении распределения беременных по паритету между группами показали, что в первой группе больше половины женщин составили многорожавшие – 55%, тогда как во второй группе преобладали первородящие (35%). Повторнорожащие встречались почти в одинаковом количестве у обеих групп (35%) (рис.2)

Эти данные показали, что наиболее высокую частоту ПДРПО наблюдалась у многорожавших женщин.




Рис. 2. Распределение беременных по паритету, (%).

При анализе по паритету выявлено, что среди пациенток с ПДРПО преобладали многорожавшие (55%), а в контрольной группе чаще встречались первородящие (35%). Наибольший дефицит витамина D отмечался среди первородящих с ПДРПО (66,7%), а также у многорожавших (45,5%). В контрольной группе нормальный уровень витамина D чаще выявлялся у повторнородящих и многорожавших.

Эти результаты согласуются с современными

представлениями о роли витамина D в модуляции иммунного ответа, поддержании межклеточного матрикса, синтезе коллагена, а также в регуляции экспрессии генов, ответственных за прочность плодных оболочек [2,8]. Полученные данные подтверждают значимую взаимосвязь между сниженным уровнем витамина D и преждевременным разрывом плодных оболочек (табл.2).

Таблица 2

Анализ уровня витамина D в зависимости от паритета, (n, %)

Группа	Паритет	n	Дефицит n (%)	Недостаточность n (%)	Норма n (%)
Основная группа (n=20)	Перворожавшие	3	2 (66,7%)	1 (33,3%)	0 (0%)
	Повторнородящие	6	3 (50,0%)	2 (33,3%)	1 (16,7%)
	Многорожавшие	11	5 (45,5%)	4 (36,4%)	2 (18,2%)
Контрольная группа (n=20)	Перворожавшие	7	2 (28,6%)	2 (28,6%)	3 (42,9%)
	Повторнородящие	6	1 (16,7%)	2 (33,3%)	3 (50,0%)
	Многорожавшие	7	1 (14,3%)	4 (57,1%)	2 (28,6%)

У пациенток с ПДРПО была проведена сравнительная оценка длительности от момента разрыва оболочек до начала регулярной родовой деятельности – в зависимости от уровня витамина D и паритета (табл. 3). Установлено, что при дефиците витамина D латентный период (от разрыва оболочек до начала родовой деятельности) был значительно длиннее. У первородящих этот показатель достигал $11,2 \pm 1,1$ ч, у многорожавших – $7,9 \pm 1,6$ ч. При нормальном уровне

витамина D латентная фаза составляла 6,5–7,5 ч.

Полученные результаты подтверждают влияние уровня витамина D на течение родов при преждевременном разрыве плодных оболочек. Наши результаты показали, что при дефиците и недостаточности витамина D время от начала безводного периода до появления активной фазы значительно удлиняется, особенно у первородящих (табл. 3).

Таблица 3

Длительность безводного периода до появления родовой деятельности в зависимости от уровня витамина D, (ч)

Уровень витамина D	Паритет	n	Доля в подгруппе, %	Интервал от ПРПО до начала родовой деятельности, ч (M ± SD)
Дефицит	Перворожавшие	2	66,7%	$11,2 \pm 1,1^*$
	Повторнородящие	3	50,0%	$9,1 \pm 1,5^*$
	Многорожавшие	5	45,5%	$7,9 \pm 1,6^*$
Недостаточность	Перворожавшие	1	33,3%	$9,0 \pm 0,0^*$
	Повторнородящие	2	33,3%	$8,0 \pm 1,0^*$
	Многорожавшие	4	36,4%	$6,9 \pm 1,3^*$
Оптимальный уровень	Перворожавшие	0	0	0
	Повторнородящие	1	16,7%	$7,5 \pm 0,0$
	Многорожавшие	2	18,2%	$6,5 \pm 0,8$

* $p < 0,05$ по сравнению с подгруппами с оптимальным уровнем витамина D.

Результаты исследования о влиянии статуса витамина D на неонатальные исходы показали, что при дефиците масса тела новорожденных составляла 1860 ± 280 г, оценки по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах – $5,6 \pm 1,1$ и $6,8 \pm 1,0$ соответственно. Частота

неонатальных инфекций достигала 40%, а необходимость госпитализации в ОРИТ – 60%. При оптимальном уровне витамина D ни один случай инфекций или перевода в реанимацию не был зафиксирован (табл. 4).

Таблица 4

Неонатальные исходы у беременных с ПДРПО в зависимости от статуса витамина D, (гр, балл, %)

Показатель	Дефицит витамина D (n=10)	Недостаточность витамина D (n=6)	Оптимальный уровень витамина D (n=4)
Масса тела новорожденного	1860 ± 280	2120 ± 260	2340 ± 240
Апгар на 1-й минуте	$5,6 \pm 1,1$	$6,4 \pm 1,0$	$7,1 \pm 0,8$
Апгар на 5-й минуте	$6,8 \pm 1,0$	$7,6 \pm 0,7$	$8,2 \pm 0,6$
Неонатальные инфекции	40,0%	16,7%	0%
Госпитализация в ОРИТ	60,0%	33,3%	0%

Таким образом, наблюдается отчетливая зависимость между снижением уровня витамина D и ухудшением перинатальных исходов при ПДРПО. Особенно неблагоприятные показатели фиксировались у женщин с выраженным дефицитом витамина D.

ВЫВОДЫ

Проведённое исследование продемонстрировало достоверную взаимосвязь между сниженным уровнем витамина D и риском преждевременного разрыва плодных оболочек. Особо выраженная ассоциация отмечалась у первородящих и многорожавших пациенток с дефицитом холекальциферола. Выявлена чёткая тенденция к увеличению латентного периода родов, ухудшению неонатальных параметров и росту частоты инфекционных осложнений у новорождённых при недостаточности витамина D. Полученные данные подтверждают клиническую значимость своевременного выявления и коррекции дефицита витамина D в период беременности, особенно в группах высокого риска, как важного компонента профилактики ПДРПО и связанных с ним неблагоприятных перинатальных последствий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пигарова Е.А., Рожинская Л.Я., Белая Ж.Е., Дзеранова Л.К., Каронова Т.Л., Ильин А.В., Мельниченко Г.А., Дедов И.И. Рекомендации Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D у взрослых. // Проблемы эндокринологии. – 2016. - №4. – с. 60-64.
2. Anetor J.I. et al. Vitamin D status and pregnancy complications in sub-Saharan Africa: A multicenter study. *Int J Gynaecol Obstet.* 2025;170(2):221–228.
3. Cheng H., Chi P., Zhuang Y., et al. Association of 25Hydroxyvitamin D with Preterm Birth and Premature Rupture of Membranes: A Mendelian Randomization Study // *Nutrients.* – 2023. – Vol. 15, №16. – Art. 3593. doi:10.3390/nu15163593
4. Goldenberg R.L. et al. Epidemiology and causes of preterm birth. *Lancet.* 2008;371(9606):75–84.
5. Han J.Y., et al. Association between Preterm Premature Rupture of Membranes and Vitamin D Levels in Maternal Plasma and Umbilical Cord Blood of Newborns: A Prospective Study // *Clin Exp Obstet Gynecol.* – 2022. – Vol. 49, №7. – P. 158.
6. Liu Y. et al. Association between maternal vitamin D deficiency and PROM: a prospective study. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2024;37(3):455–460.
7. Mehndiratta M., Gupta B., Kar R., et al. 25Hydroxyvitamin D Insufficiency in Pregnant Indian Women and the Development of Preterm Prelabour Rupture of Membranes // *J Obstet Gynaecol India.* – 2021. – Vol. 71, №6. – P. 649–650. doi:10.1007/s13224-021-01526-6
8. Qin L.L., Lu F.G., Yang S.H., et al. Does Maternal Vitamin D Deficiency Increase the Risk of Preterm Birth: A Meta-Analysis of Observational Studies // *Nutrients.* – 2016. – Vol. 8, №5. – Art. 301. doi:10.3390/nu8050301

АКТИВИН А КАК МАРКЕР ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

Уринбаева Д.А., Курбанов Б.Б., Эгамбердиева Ш.Ш.
Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Ushbu tadqiqotning maqsadi homiladorlikning turli bosqichlarida PTB xavfi bo'lgan homilador ayollarning qon zardobidagi faolin A kontsentratsiyasini baholash va natijalarni nazorat guruhi natijalari bilan solishtirish edi.

Materiallar va usullar. Tadqiqot Toshkent pediatriya tibbiyot instituti va Respublika perinatal markazida o'tkazildi. Tahlillarga erta tug'ilish xavfi klinik belgilari bo'lgan 150 nafar homilador ayol (homiladorlikning 23-36 xaftaligi) va nazorat guruhini tashkil etuvchi normal homilador bo'lgan 100 nafar ayol ishtirok etdi.

Tadqiqot natijalari. Ushbu tadqiqot erta tug'ilish xavfi (PPB) bo'lgan ayollarda faolin A darajasi normal homiladorlik bilan nazorat guruhidagidan sezilarli darajada oshib ketishini ko'rsatdi. Homiladorlik davri bo'yicha tahlillar izchil naqshlarni aniqladi: eng yuqori ko'rsatkichlar PPB xavfining boshida (23-27 hafta) kuzatilgan, homiladorlik o'sib borishi bilan asta-sekin kamayadi. Biroq, barcha tadqiqot guruhlarida darajalar nazorat qiymatlaridan sezilarli darajada yuqori bo'lib qoldi ($p < 0,001$).

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari erta tug'ilish xavfining biomarkeri sifatida aktivin A ning muhim rolini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: aktivin A, erta tug'ilish, biomarkerlar, yallig'lanish, prognoz.

Преждевременные роды (ПР), определяемые как роды, происходящие до 37-й недели гестации, остаются одной из ключевых проблем современного акушерства, занимая по данным ВОЗ до 70% всех случаев неонатальной гибели [3,17,22]. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется около 15 миллионов случаев ПР, и эта патология является ведущей причиной неонатальной смертности и долгосрочных осложнений у новорожденных [9,22].

К факторам риска ПР относятся инфекции, воспалительные процессы, патология плаценты, гормональные нарушения, стресс и соматическая патология матери [15]. Несмотря на значительные усилия, направленные на профилактику ПР, возможности ранней диагностики остаются ограниченными. В связи с этим поиск надежных биомаркеров, отражающих патогенетические механизмы угрозы преждевременных родов, приобретает особую актуальность.

Особое внимание в последние годы уделяется активину А, принадлежащему к семейству транс-

SUMMARY

Objective. The aim of this study was to evaluate the concentration of activin A in the serum of pregnant women with threatened preterm birth (PTB) at different gestational ages and to compare the obtained results with those of the control group.

Materials and methods. The study was conducted at the Tashkent Pediatric Medical Institute and the Republican Perinatal Center. The analysis included 150 pregnant women with clinical signs of threatened preterm labor (23–36 weeks of gestation) and 100 women with pregnancies who served as the control group.

Results. The present study demonstrated that serum activin A levels in women with threatened preterm birth were significantly higher than those in the control group with normal pregnancy. Gestational age-based analysis revealed a consistent trend: the highest concentrations were observed at earlier stages of threatened PTB (23–27 weeks), followed by a gradual decrease with advancing gestation. However, activin A levels remained significantly elevated compared to controls across all gestational periods examined ($p < 0.001$).

Conclusion. The findings of this study confirm the significant role of activin A as a biomarker of threatened preterm birth.

Keywords: activin A, preterm birth, biomarkers, inflammation, prediction.

формирующего фактора роста β (TGF- β). Активин А принимает участие в регуляции иммунного ответа, воспалительных реакций и процессов тканевого ремоделирования. Ряд исследований показал, что его концентрация в крови и амниотической жидкости возрастает при угрозе ПР и ассоциируется с активацией воспалительных механизмов в маточно-плацентарном комплексе [10,12,18].

Кроме того, повышение уровня активина А связывают с развитием хориоамнионита, нарушениями плацентации и повреждением плодных оболочек, что подчеркивает его диагностическую и прогностическую значимость [18,19]. Таким образом, исследование динамики активина А у беременных с угрозой ПР позволяет рассматривать данный маркер как ключевое звено в патогенезе воспалительных процессов, приводящих к преждевременным родам.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключалась в оценке уровня активина А у беременных женщин с угрозой ПР в различные сроки гестации и определении его диагностической значимости в сравнении с кон-

трольной группой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на базе Ташкентского педиатрического медицинского института и Республиканского перинатального центра. В анализ включены 150 беременных женщин с клиническими признаками угрозы преждевременных родов (23-36 недель гестации) и 100 женщин с физиологическим течением беременности, составивших контрольную группу.

Диагностика угрозы преждевременных родов основывалась на клинических симптомах (боли внизу живота, гипертонус матки) и ультразвуковой цервикометрии (длина шейки матки <25 мм).

Основным объектом исследования был уровень активина А в сыворотке венозной крови. Определение проводилось методом иммуноферментного анализа (ELISA) с использованием стандартных наборов DRG (Германия).

Для анализа динамики маркера пациентки с угрозой преждевременных родов были разделены по срокам гестации: 1-я группа (n=65) – 23-27 недель, 2-я группа (n=45) – 27-32 недели, 3-я группа (n=40) – 32-36 недель.

Контрольная группа включала 100 женщин с нормально протекающей беременностью.

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программ IBM SPSS Statistics v.26.0 и Microsoft Excel 2019. Характер распределения оценивался с применением критерия Колмогорова-

Смирнова. Для межгрупповых сравнений использовались t-критерий Стьюдента и непараметрические методы (Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса). Качественные признаки анализировались с помощью χ^2 -критерия. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем исследовании было показано, что уровень активина А у женщин с угрозой преждевременных родов (ПР) значительно превышает показатели контрольной группы с физиологическим течением беременности. Анализ по срокам гестации выявил закономерную динамику: максимальные значения наблюдались в ранние сроки угрозы ПР (23-27 недель), с постепенным снижением по мере увеличения срока беременности, однако показатели оставались достоверно выше контрольных значений во всех исследуемых группах ($p < 0,001$).

Так, в 1-й группе (23-27 недель) концентрация активина А составила $379,2 \pm 28,4$ пг/мл, что в два раза выше уровня контрольной группы ($184,4 \pm 16,5$ пг/мл). Во 2-й группе (27-32 недели) показатель несколько снижался ($328,2 \pm 19,0$ пг/мл), но также существенно превышал контроль ($p < 0,001$). В 3-й группе (32-36 недель) активин А составлял $290,5 \pm 17,4$ пг/мл, что отражает тенденцию к снижению, однако значения оставались статистически значимо выше нормы ($p < 0,001$).

Для наглядности данные представлены в таблице.

Уровень активина А у беременных с угрозой ПР и в контрольной группе (M±m, пг/мл)

Группа	Количество	Активин А (пг/мл)
1 (23-27 недель)	65	$379,2 \pm 28,4$
2 (27-32 недели)	45	$328,2 \pm 19,0$
3 (32-36 недель)	40	$290,5 \pm 17,4$
Контрольная	100	$184,4 \pm 16,5$

Примечание: различия между исследуемыми группами и контролем статистически значимы ($p < 0,001$).

Как видно из таблицы, максимальный уровень активина А выявлен в 1-й группе (23-27 недель), где концентрация составила $379,2 \pm 28,4$ пг/мл, что более чем в два раза превышало показатели контрольной группы ($184,4 \pm 16,5$ пг/мл). Во 2-й группе (27-32 недели) уровень активина А снижался до $328,2 \pm 19,0$ пг/мл, однако оставался значительно выше контрольных значений. В 3-й группе (32-36 недель) концентрация активина А составила $290,5 \pm 17,4$ пг/мл, что также достоверно превышало показатели контрольной группы ($p < 0,001$).

Визуализация данных (рис.) демонстрирует выраженный пик концентрации активина А в сроке 23-27 недель с последующим снижением, но при этом показатели остаются достоверно выше контрольных на протяжении всего периода исследования.

Полученные данные подтвердили значимое повышение уровня активина А у женщин с угрозой преждевременных родов (ПР) по сравнению с кон-

трольной группой. Наиболее высокие концентрации регистрировались в сроке 23-27 недель, что соответствует раннему дебюту патологических изменений в системе «мать-плацента-плод». Дальнейшее снижение показателей на более поздних сроках (27-36 недель) отражает динамику компенсаторных процессов, однако значения остаются статистически выше нормы, что указывает на устойчивость воспалительных и дисфункциональных процессов в фетоплацентарном комплексе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Значимое повышение уровней активина А у женщин с клиническими признаками угрозы преждевременных родов, с наибольшими значениями в сроке 23-27 недель и тенденцией к снижению в более поздние сроки – соответствуют данным зарубежных авторов, демонстрирующих роль активина А как предиктора преждевременных родов.



Динамика концентрации активина в зависимости от срока беременности.

Так, Farina и соавт. показали, что повышенные концентрации общего активина А в сыворотке крови ассоциированы с повышенным риском преждевременного родоразрешения у женщин без выраженной клинической симптоматики, что позволило авторам рассматривать данный биомаркер в качестве потенциального предиктора ПР [12]. В кросс-секционном исследовании Plevuak и коллег было выявлено достоверное повышение уровней активина А у женщин с преждевременными родами по сравнению с пациентками, родоразрешившимися в срок, что полностью согласуется с результатами настоящей работы [18].

Дополнительное подтверждение получено в исследовании Rosenberg и соавт., где повышение активина А в амниотической жидкости ассоциировалось с внутриамниотической инфекцией и преждевременным разрывом плодных оболочек, что подчёркивает патогенетическую связь между воспалительным процессом и активацией системы «activin-inhibin» в маточно-плацентарных тканях [19].

Современный обзор Bloise и коллег (2019) акцентирует внимание на многофункциональности активина А как цитокина, участвующего в регуляции воспалительных и иммунных реакций, а также в обеспечении трофобластической функции и ремоделирования тканей. Авторы подчёркивают, что, несмотря на накопленные экспериментальные и клинические данные, вопрос клинической валидации активина А в прогнозировании ПР остаётся открытым [10].

Таким образом, данные нашего исследования подтверждают выводы международной литературы о тесной связи активина А с воспалительными процессами и преждевременной активностью родовой деятельности. При этом представленная динамическая оценка уровней активина А в трёх гестационных интервалах (23-27, 27-32 и 32-36 недель) расширяет существующую клиническую базу и подчёркивает необходимость дальнейших проспективных исследований для определения пороговых значений и разработки стандартизированных алгоритмов применения данного маркера в клинической практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведённого исследования подтверждают значимую роль активина А как биомаркера угрозы преждевременных родов. У женщин с клиническими признаками угрозы его уровень был достоверно выше по сравнению с контрольной группой с физиологическим течением беременности, при этом наиболее выраженное повышение наблюдалось в сроках 23-27 недель. По мере увеличения срока гестации отмечалась тенденция к снижению концентрации активина А, однако значения оставались статистически значимо выше контрольных показателей.

Сравнение полученных данных с международными исследованиями подтверждает, что активин А отражает воспалительный компонент патогенеза преждевременных родов и может рассматриваться как ранний и чувствительный индикатор риска.

Практическая значимость заключается в возможности включения определения уровня активина А в комплексные алгоритмы прогнозирования преждевременных родов. Это позволит более точно идентифицировать женщин группы высокого риска и своевременно назначать профилактические и терапевтические мероприятия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гафарова С.Х., Юлаева И.А., Исомадинова Л.К. Роль лабораторной диагностики при ведении женщин с антифосфолипидным синдромом во время беременности. *Journal of new century innovations*. – 2025. – Т. 69. – №1. – С. 33-36.
2. Косякова О.В., Беспалова О.Н., Сейидова Ч.И., Глотов А.С. Роль маркеров воспалительного ответа в прогнозировании преждевременных родов. *Российский вестник акушера-гинеколога*. 2020; 20(3):1823.
3. Радзинский В.Е., Оразмурадов А.А., Савенкова И.В., Дамирова К.Ф., Хаддад Х. Преждевременные роды – нерешенная проблема XXI века. – *Кубанский научный медицинский вестник*. 2020;27(4):37-37. <https://>

- doi.org/10.25207/1608-6228-2020-27-4-27-37.
4. Рузиева Н.Х., Назарова Д.Э., Турбанова У.В., Рассадина М.В. Роль оксидантного стресса в развитие преждевременных родов//Евразийский вестник педиатрии. – 2019; 2 (2): 38-40.
 5. Саркисова, Л. (2022). Иммунологические аспекты при преждевременных родах. Журнал вестник врача, 1(2), 172-177. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021992-171-176>.
 6. Areia, A.L.; Mota-Pinto, A. Inflammation and Preterm Birth: A Systematic Review. *Reprod. Med.* 2022, 3, 101-111. <https://doi.org/10.3390/reprod-med3020009>.
 7. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, Chou D, Moller AB, Narwal R, Adler A, Vera Garcia C, Rohde S, Say L, Lawn JE. National, regional, and worldwide estimates of preterm. *Lancet.* 2012 Jun 9;379(9832):2162-72. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60820-4. PMID: 22682464.
 8. Bloise E., Ortiga-Carvalho T.M., Reis F.M., Lye S.J., Gibb W. Activin A in mammalian physiology. *Physiol Rev.* 2019;99(4):1881–1915. DOI: 10.1152/physrev.00002.2018.
 9. Cappelletti M, Della Bella S, Ferrazzi E, Mavilio D, Divanovic S. Inflammation and preterm birth. *J Leukoc Biol.* 2016 Jan;99(1):67-78. doi: 10.1189/jlb.3MR0615-272RR. Epub 2015 Nov 4. PMID: 26538528.
 10. Farina A, Lambert-Messerlian GM, Canick JA, Banzola I, Carletti A, Concu M, Tempesta A, Gabrielli S, Morano D, Rizzo N. Total activin A in maternal blood as a marker of preterm delivery in low-risk asymptomatic patients. *Prenat Diagn.* 2006 Mar;26(3):277-81. doi: 10.1002/pd.1400. PMID: 16506265.
 11. Florio P, Perrone S, Luisi S., et al. Increased plasma concentrations of activin A predict intraventricular hemorrhage in preterm newborns. *Clin Chem.* 2006 Aug;52(8):1516–1521. DOI: 10.1373/clinchem.2005.065979.
 12. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. *Lancet.* 2008 Jan 5;371(9606):75-84. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60074-4. PMID: 18177778; PMCID: PMC7134569.
 13. Lawn JE, Kinney MV, Belizan JM, Mason EM, McDougall L, Larson J, Lackritz E, Friberg IK, Howson CP; Born Too Soon Preterm Birth Action Group. Born too soon: accelerating actions for prevention and care of 15 million newborns born too soon. *Reprod Health.* 2013;10 Suppl 1(Suppl 1):S6. doi: 10.1186/1742-4755-10-S1-S6. Epub 2013 Nov 15. PMID: 24625252; PMCID: PMC3828574.
 14. Menon R. Spontaneous preterm birth, a clinical dilemma: etiologic, pathophysiologic and genetic heterogeneities and racial disparity. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2008;87(6):590-600. doi: 10.1080/00016340802005126. PMID: 18568457.
 15. Ohuma E, Moller A-B, Bradley E, et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth in 2020, with trends from 2010: a systematic analysis. *Lancet.* 2023;402(10409):1261-1271. doi:10.1016/S0140-6736(23)00878-4.
 16. Plevyak MP, Lambert-Messerlian GM, Farina A, Groome NP, Canick JA, Silver HM. Concentrations of serum total activin A and inhibin A in preterm and term labor patients: a cross-sectional study. *J Soc Gynecol Investig.* 2003 May;10(4):231-6. doi: 10.1016/s1071-5576(03)00047-9. PMID: 12759152.
 17. Rosenberg V.A., Buhimschi I.A., Dulay A.T., et al. Modulation of amniotic fluid activin-A and inhibin-A in intra-amniotic infection and preterm birth. *Am J Reprod Immunol.* 2012;67(2):113–123. DOI: 10.1111/j.1600-0897.2011.01074.x.
 18. Severi, F. M. (2012). Activin A and its Regulatory Molecules in Placenta and Fetal Membranes of Women with Preterm Premature Rupture of the Membranes Associated with Acute Chorioamnionitis. *American Journal of Reproductive Immunology.* <https://doi.org/10.1111/J.1600-0897.2012.01180.X>.
 19. Vogel JP, Chawanpaiboon S, Moller AB, Watananirun K, Bonet M, Lumbiganon P. The global epidemiology of preterm birth. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.* 2018 Oct;52:3-12. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2018.04.003. Epub 2018 Apr 26. PMID: 29779863.
 20. World Health Organization. Preterm birth. WHO Fact Sheet. Geneva. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>.
-

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН

Хамдамова С.А., Курбанов Б.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Ayol jinsiy a'zolarining prolapsi zamonaviy ginekologiyaning o'tkir muammolaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi. *Ayollarda jinsiy a'zolarining prolapsini jarrohlik yo'li bilan davolashda prolaps darajasi, ayollarning yoshi va reproduktiv salomatlik holatiga qarab differentsial yondashuvni o'tkazish.*

Tadqiqot materiallari va usullari. *Ligamentli apparatni mustahkamlash va sintetik prolen lenta yordamida vaginal dumni mahkamlash bilan yangi texnologiyadan foydalangan holda vaginal kirish orqali histerektomiya bo'yicha 57 ta operatsiya, oldingi va orqa kolpoperineolevatorplastika bilan birgalikda 27 ta sakropeksiya operatsiyasi, gepatitni to'g'rilash uchun 33 ta operatsiya, bachadon-keratotik ligamentlar va oldingi posterior kolpoperineolevatorplastikasi amalga oshirildi.*

Tadqiqot natijalari. *Texnikani tanlash bachadonning o'lchamiga, uning harakatchanligiga, joylashish xususiyatlariga, vaginal sig'imga, oldingi operatsiyalarga qarab amalga oshirildi. Agar kerak bo'lsa, qo'shimchalar olib tashlandi, yopishqoqlik yo'q qilindi. Bachadonning o'lchami birga keladigan kasallikka qarab, homiladorlikning 22 haftasiga va o'rta 15 haftaga to'g'ri keladigan qiymatlarga yetdi.*

Xulosa. *Generativ funktsiyani saqlab qolishni istagan reproduktiv yoshdagi jinsiy a'zolarining I darajali prolapsi bo'lgan ayollarda sintetik prolen lentasi yordamida sakrouterin ligamentlarni qisqartirish juda samarali ekanligi aniqlandi.*

Kalit so'zlar: *prolaps, histerektomiya, sakropeksiya.*

Методы лечения женщин с пролапсом гениталий кардинально различаются в зависимости от возраста женщин, степени пролапса, жалоб и анамнеза заболевания. Всё чаще остаётся загадкой выбор метода лечения. Нет единого консенсуса по выбору хирургической тактики, использования сетчатых продуктов или аллотрансплантантов, а некоторые гинекологи вообще прибегают к консервативным методам лечения. [1,3].

Хирургический метод лечения пролапса гениталий всегда оставался приоритетным, так как это единственный метод тотального ликвидации заболевания. Однако по сей день хирургические вмешательства оставляют множество осложнений, как интра так и пост операционных. [4,7]. Помимо этого, вопросы профилактики осложнений также являются дискуссионными.

SUMMARY

Prolapse of female genital organs is one of the acute problems of modern gynecology.

Objective of the study. *To conduct a differentiated approach to surgical treatment of genital prolapse in women, depending on the degree of prolapse, the age of women and the state of reproductive health.*

Materials and methods of the study. *57 operations of hysterectomy by vaginal access using a new technology with strengthening of the ligamentous apparatus and fixation of the vaginal stump using synthetic prolene tape, 27 operations of sacropexy in combination with anterior and posterior colpoperineolevatorplasty, 33 operations for correction of genital prolapse in combination with plication of the uterine-keratotic ligaments and anterior posterior colpoperineolevatorplasty were performed.*

Results of the study. *The choice of technique was carried out depending on the size of the uterus, its mobility, features of its location, vaginal capacity, previous operations. If necessary, appendages were removed, adhesions were eliminated. The size of the uterus reached values corresponding to 22 weeks, and on average 15 weeks of pregnancy, depending on the concomitant disease.*

Conclusions. *In women with grade I genital prolapse of reproductive age who wish to preserve generative function, shortening of the sacrouterine ligaments using synthetic prolene tape has been found to be highly effective.*

Keywords: *prolapse, hysterectomy, sacropexy.*

На сегодняшний день ключевым вопросом является выбор методики оперативного лечения в зависимости от следующих показателей: степень пролапса, жалобы и возраста женщин, сексуальная активность и состояние репродуктивного здоровья.

Также при определении тактики хирургического лечения необходимо произвести тщательную дифференцировку, а также предотвратить отдаленные осложнения и рецидивы заболевания. [5,9].

Существуют множество исследований, посвящённых изучению эффективности различных методов лечения пролапса гениталий, в зависимости от степени поражения и возраста пациенток. Исследования как когортные, рандомизированные ну а также плацебо. Риск повторения пролапса, опущения культи влагалища, формирование послеопе-

рациональных свищей, стрессового недержания мочи остается непредсказуемыми явлениями. Ни одна из существующих операций не дает четкой уверенности от предотвращения вышеуказанных осложнений. [3,11,14].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести дифференцированный анализ результатов хирургической коррекции пролапса гениталий у женщин, на основании интраоперационной картины и послеоперационного периода.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы проанализировали 117 историй болезни женщин (ретроспективно) за 2020-2025 года. Нами изучены женщины с пролапсом гениталий различной степени поступившие на плановое оперативное лечение в городской межрайонный перинатальный центр №6 города Ташкента. Условно мы разделили женщин на три группы: первая группа 57 женщин с пролапсом гениталий тяжелой степени, оперированные по нашей собственной технике (патент IAP 2020 0279). Вторую группу составили 27 женщин со средней и легкой степенью пролапса проведенной операции сакропексии. Третью группу составили 33 женщины с преимущественным пролапсом задней стенки влагалища, проведенных подвешивание крестцово-маточных связок и кольпоперинеолеваторпластики.

Возраст обследованных женщин составил 37-76 лет. Диагноз пролапс гениталий устанавливался на основании жалоб анамнеза данных лабораторных и инструментальных методов исследования. (согласно классификации POP 2020) Все женщины поступившие на стационарное лечение подвергались стандартному комплексному обследованию. Метод хирургического лечения подбирался индивидуально в зависимости от локализации грыжевого отверстия влагалища, состояния связочного аппарата, а также желания женщины.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами тщательно изучен анамнез женщин. Мы проводили комплексную оценку репродуктивного, гинекологического, а также акушерского анамнеза. Все данные были вписаны инкогнито. Обращал на себя внимание выраженный акушерский анамнез, а также осложнения в родах. Как видно из первой таблицы большинство женщин были многорожавшими, имели место роды с крупным плодом, множественные разрывы шейки матки, влагалища и промежности. Возможно отягщенный акушерский анамнез является ведущей причиной развития пролапса гениталий, что также подтверждается литературными источниками.

Таблица 1

Группы обследования	Показатели			
	Количество беременности	Количество родов	Осложненное течение родов	Аборты и выкидыши
Первая группа n=57	4,5+0,11	3,1+0,12	4,6+0,10	1,9+0,06
Вторая группа n=27	4,8+0,19	3,7+0,10	3,4+0,09	1,5+0,07
Третья группа n=33	4,4+0,19	3,5+0,10	2,3+0,09	1,7+0,11

Акушерско-гинекологический анамнез у обследованных групп.

Решение об объеме и выборе хирургического лечения принималось индивидуально. Так как нет протоколов и стандартов лечения, принятых на Республиканском уровне нами, был применен персонализированный подход. Молодым женщинам, активно живущих половой жизнью и с репродуктивным потенциалом решено было проводить комплексную операцию по ликвидации пролапса с сакропексией. При этом не нарушалась архитектура органов малого таза, сохранялась матка и придатки. Ликвидация пролапса происходила за счёт укрепления фиксирующего и опорного связочного аппарата малого таза.

Возрастным женщинам, женщинам климактерического периода, а также с тяжелыми степенями пролапса была предложена более глубокая операция по нашей технике. Особенность данной операции заключалась в индивидуальном подвешивании отдельных элементов связочного аппарата (в данном случае крестцово-маточных связок) а также фиксацией культи влагалища проленовой лентой. Данная операция сопровождается гистеректомией через влагалище. При этом формируется прочный конгломерат малого таза с глубоким влагалищем.

Женщинам в третьей группе также имеющих активную половую жизнь, с легкой степенью пролапса было решено проводить классическую операцию передней-задней кольпоперинеолеваторпластикой и креплением крестцово-маточных связок.

В таблице 2 в группах исследования можно оценить результаты проведенных мероприятий. Так можно заключить что все операции проводились не длительно. Выбор анестезиологического пособия также отмечался индивидуально преимущественным методом была спинальная анестезия, в 2х случаях применялся эндотрахеальный наркоз.

Объем кровопотери оценивался классическим гравитационным методом, при помощи подсчета использованных салфеток и операционного материала. Из данной таблицы можно заключить что все операции не сопровождалась большим объемом кровопотери. Женщины в среднем находились в стационаре от 3 до 5 дней. Наличие послеоперационной боли оценивалось в балловом эквиваленте, согласно POP опроснику 2024. Чаще всего боль ощущали в первой группе. Отдаленных осложнений не наблюдалось во всех группах. Только в 1 случае в первой группе отмечались интраоперационные технические сложности.

Особенности хирургического вмешательства обследованных групп

Характеристики	Первая группа (n=57)	Вторая группа (n=27)	Третья группа (n=33)
Длительность операции (в мин)	75,5+0,12	69,7+0,11	55,5+0,17
Средняя кровопотеря (мл)	165,5+0,12	135,5+0,12	125,5+0,12
Длительность нахождения пациентов в стационаре (в сутках)	35,5+0,12	3,5,5+0,12	3,5,5+0,12
Наличие болевых ощущений (в баллах)	5	4	3
Восстановление мочеиспускания (в сутках)	2,1+0,6	1,9+0,06	1,5+0,06
Восстановление половой жизни	40 дней	35 дней	35 дней
Интраоперационные осложнения	1 (1,8%)	-	-
Послеоперационные осложнения	-	-	-

ВЫВОДЫ

1. Наш собственный анализ показал, что возрастным и пожилым женщинам, без требования восстановления репродуктивной функции приоритетным является операция по нашей методике.

2. Женщинам с генитальным пролапсом гениталий легкой степени, с возможным репродуктивным потенциалом установлена высокая доказательная эффективность укрепления тазового дна путем подшивания крестцово-маточных связок.

3. Женщинам с пролапсом гениталий II-III степени рекомендуется операция сакропексии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беляева Л. Е. Трансперинеальное ультразвуковое исследование в оценке состояния тазового дна у женщин: научное издание / Л. Е. Беляева, Ю. Г. Соболевская [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - М., 2013. - N2. - С. 70-77.
2. Буянова С. Н. Особенности лечение больных с тяжелыми и рецидивными формами пролапса гениталий в пожилом и старческом возрасте: научное издание / С. Н. Буянова, М. В. Мгелиашвили, С. А. Петракова, Т. Б. Марченко // Российский вестник акушера-гинеколога. - М., 2015. - Том 15 N4. - С. 81-84.
3. Буянова С.Н., Щукина Н.А., Журавлева А.С. Эффективность использования сетчатых протезов при осложненных формах пролапса гениталий. Российский вестник акушера-гинеколога. 2009;(1):76–81.
4. Гусева Е. С. Современные подходы к решению проблемы генитального пролапса влагалищным доступом: научное издание / Е. С. Гусева // Журнал акушерства и женских болезней. - СПб., 2013. - Том LXII Вып. 2. - С. 51-62.
5. Ищенко А. И. Опыт создания клеточно-инженерной конструкции для хирургического лечения тазового пролапса(предварительное сообщение) / А. И. Ищенко, А. В. Люндуп, Л. С. Александров, Т. Н. Сулина // Российский вестник акушера-гинеколога. - М., 2015. - №3. - С. 52-55.
6. Ищенко А.И. Использование «армированного» апоневротического лоскута при хирургической

коррекции и для профилактики генитального пролапса у женщин с сочетанной генитальной патологией. Российский вестник акушера-гинеколога / А.И. Ищенко, Л.С. Александров, Ю.В. Чушков и др.// М., 2011, Т.11. №3. С.55-61.

7. Камоева С. В. Роль матриксных белков Fbln-5 и LOXL-1 в патогенезе пролапса тазовых органов : научное издание / С. В. Камоева, Т. Н. Савченко [и др.] // Российский вестник акушера - гинеколога. - М., 2013. - Том 13 N3. - С. 33-37.
8. Коршунов М. Ю. Эффективность вагинальной гистерэктомии с высоким подвешиванием купола влагалища к крестцово-маточным связкам в лечении пролапса тазовых органов у женщин : научное издание / М. Ю. Коршунов // Российский вестник акушера - гинеколога. - М., 2013. - Том 13 N2. - С. 61-65.
9. Краснополяский В.И. Трехлетний опыт применения систем Pro lift для коррекции генитального пролапса /В.И. Краснополяский, Т. Н. Мананникова, Г.Г. Шагинян, О.В. Мачанските, А.А. Федоров, И.В. Краснополяская, Б.А. Слободянюк, Ю.В. Земсков, Ю.А. Джанаев // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2008. – Спецвыпуск. – С. 33-36.
10. Кулаков В.И. Руководство по оперативной гинекологии /В.И. Кулаков, Н.Д. Селезнева, С.Е. Белоголова // – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – С. 407-434.
11. Кулаков В.И., Савельева Г.М., Манухин И.Б. Гинекология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-медиа, 2009. С. 478.
12. Ли Е. С. Полиморфизм генов коллагена 3-го типа и рецептора эстрогена-альфа у женщин с пролапсом гениталий: научное издание / Е. С. Ли, Л. Х. Бехбудова [и др.] // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. - М., 2014. - Том 13 N4. - С. 12-18.
13. Макаров О. В. Связь полиморфизма гена FBLN5 с риском развития пролапса тазовых органов у женщин с травмами мягких родовых путей / О. В. Макаров, С. В. Камоева, М. Б. Хаджиева, А. В. Иванова и др // Акушерство и гинекология. - М., 2015. - №1. - С. 42-49.

14. Манухин И.Б., Сазонова Е.О. Безопасность оперативной лапароскопии в гинекологии // В сборнике «Современные технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» под редакцией академика РАМН, д.м.н., проф. Л.В. Адамян.- Москва.-2007.-С. 43-44.
 15. Попов А. А. Сакроспинальная фиксация в лечении женщин с пролапсом гениталий в эру mesh-технологий: научное издание / А. А. Попов, И. В. Краснопольская [и др.] // Российский вестник акушера - гинеколога. - М., 2013. - Том 13 N2. - С. 36-41.
 16. Попов А. А. Функциональные результаты сакроспинальной фиксации при лечении больных с пролапсом гениталий : научное издание / А. А. Попов, И. В. Краснопольская [и др.]//Российский вестник акушера-гинеколога. - М., 2014. - Том 14 N2. - С. 63-66.
 17. Пушкарь Д.Ю., Раснер П.И., Гвоздев М.Ю. Проплапс гениталий. Русский Медицинский журнал. – 2013. – № 34. – с. 11.
 18. Радзинский В.Е., Шалаев О.Н., Дурандин Ю.М., Токтар Л.Я., Салимова Л.Я., Семятов С.Д. Перинеология. Опущение и выпадение половых органов. Учеб. пособие. - М.: РУДН, 2008. - 256 е.: ил.
 19. Рогожина И. Е. Профилактика послеоперационных гнойно- септических осложнений при пролапсе гениталий у женщин перименопаузального возраста: научное издание / И. Е. Рогожина, У. В. Столярова, Н. Ф. Хворостухина, Н. Н. Степанова // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. - М., 2013. - Том 12 N2. - С. 33-37.
 20. Русина Е. И. Роль комплексного уродинамического исследования при планировании оперативного лечения у континентных женщин с пролапсом тазовых органов: научное издание / Е. И. Русина // Журнал акушерства и женских болезней. - СПб, 2014. - Том LXIII Вып. 1. - С. 17-25.
 21. Abdel-Fattah M. Ramsay I. West of Scotland Study Group. Retrospective multicentre study of the new minimally invasive mesh repair devices for pelvic organ prolapse // BJOG. 2008. Vol. 115, No. 1. P. 22–30.
 22. Al-Mandeel H, Ross S, Robert M, Milne J. Incidence of stress urinary incontinence following vaginal repair of pelvic organ prolapse in objectively continent women. Neurourol Urodyn. 2011;30(3):390–4.
 23. Al-Nazer M.A. IWGI. Comparative study between anterior colporrhaphy versus vaginal wall repair with mesh for management of anterior vaginal wall prolapse // Int. Urogynecol. J. 2007. Vol. 18, Suppl. 1. P. S49–S50.
 24. Banerjee C, Noé KG. Laparoscopic pectopexy: a new technique of prolapse surgery for obese patients. Arch Gynecol Obstet. 2011 Sep;284(3):631-5.
 25. Bourcier A.P. Pelvic floor disorders / A.P. Bourcier, E.J. McGuire, P. Abrams. – Elsevier, 2004.
-

ЧАСТОТА И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИСТМОЦЕЛЕ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР

Хикматуллаева М.Р., Юлдашев С.К.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
здоровья матери и ребенка, Ташкент

XULOSA

So'nggi yillarda kesarcha kesishdan keyingi bachadon chandiqlari muammosiga bo'lgan qiziqish ancha ortdi. Tadqiqotlarning aksariyati chandiq holatini homiladorlik va tug'ruq vaqtida baholash bilan cheklanmay, balki homiladorlikdan tashqarida ham chandiq nuqsonlarini aniqlash va ularni bartaraf etish usullarini o'rganishga qaratilgan.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — 106 bemorning tibbiy kasallik tarixi ma'lumotlariga asoslanib, kesarcha kesishdan so'ng istmocele shakllanishining retrospektiv tahlilini o'tkazishdan iborat. Tadqiqotda istmoselening asosiy klinik belgilari, qo'llanilgan diagnostika uslublari, asoratlar va hamroh holatlarning uchrash tezligi ko'rib chiqildi. Shuningdek, chandiq sohasida nuqson hosil bo'lishiga olib keluvchi xavf omillari va ehtimoliy mexanizmlar tahlil qilindi. Kuzatilgan klinik va diagnostik xususiyatlar keltirilib, davolashning konservativ va jarrohlik uslublarining samaradorligi baholandi. Olingan ma'lumotlar istmocele erta aniqlanishining ayollar reproduktiv salomatligini saqlashdagi muhim ahamiyatini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: istmocele, kesarcha kesish, tug'ruqdan keyingi davr, bachadon chandiqlari, ultratovush tekshiruvi.

В последние десятилетия во всем мире наблюдается устойчивый рост частоты кесарева сечения (КС), что отражает как улучшение доступа к акушерской помощи, так и тенденцию к медицинской гипердиагностике и предпочтению оперативных родов без строгих показаний. По данным Всемирной организации здравоохранения, доля родов, завершающихся КС, увеличилась с 7% в 1990 году до более чем 21% в настоящее время, и, по прогнозам, достигнет 29% к 2030 году. [3] Хотя КС может быть жизненно необходимым вмешательством, его широкое применение сопряжено с рядом отдаленных осложнений, включая нарушения заживления рубца на матке.

Одним из таких осложнений является истмоцеле — анатомический дефект миометрия в области рубца после КС, также известный как «ниша» или «цезариев карман». Согласно международным данным, частота выявления истмоцеле варьирует от 24% до 84% в зависимости от используемого метода диагностики, при этом до 30% пациенток могут испытывать клинические симптомы, включая аномальные маточные

SUMMARY

Recently, interest in the problem of uterine scar formation after cesarean section (CS) has significantly increased. Numerous studies have focused not only on assessing the condition of the scar during pregnancy and labor but also on identifying scar defects after CS outside of pregnancy and exploring various methods of their correction.

The aim of this study was to conduct a retrospective analysis of cases of isthmocele formation in patients who had undergone cesarean section, based on data from 106 medical records. The study examined the main clinical manifestations of isthmocele, diagnostic methods used, and the frequency of associated complications and comorbid conditions. Particular attention was given to risk factors and possible mechanisms of defect formation in the uterine scar area. Observed clinical and diagnostic features are presented, and the effectiveness of different treatment approaches—including conservative therapy and surgical correction—was evaluated. The findings emphasize the importance of early detection of isthmocele to prevent reproductive complications in women of reproductive age.

Keywords: isthmocele, cesarean section, postpartum period, uterine scar, ultrasound examination.

кровоотечения, хроническую тазовую боль, бесплодие и осложнения при последующих беременностях [4].

Формирование истмоцеле связано с множеством факторов, включая технику ушивания матки, количество предыдущих КС, анатомические особенности пациентки, воспалительные процессы в послеродовом периоде и даже иммуновоспалительные маркеры, такие как нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение. [9] Исследования показывают, что использование непрерывного блокирующего шва в первом слое ушивания ассоциировано с более высокой частотой формирования выраженных ниш, по сравнению с непрерывным неблокирующим или прерывистым швом [10].

Несмотря на растущий интерес к данной патологии, в международной литературе сохраняется дефицит стандартизированных подходов к диагностике и лечению истмоцеле. Диагностика чаще всего осуществляется с помощью трансвагинального УЗИ, соногистерографии или гистероскопии, однако критерии оценки и классификации дефекта остаются не-

однородными. [7] Лечение может включать как консервативные методы, так и хирургическую коррекцию – гистероскопическую, лапароскопическую или комбинированную, в зависимости от выраженности симптомов и репродуктивных планов пациентки.

Учитывая высокую распространенность КС и потенциальные репродуктивные риски, связанные с истмоцеле, актуальность изучения данной патологии не вызывает сомнений. Настоящее исследование направлено на ретроспективный анализ клинических случаев формирования истмоцеле у женщин в послеродовом периоде, с целью выявления частоты, клинических проявлений, факторов риска и оценки

эффективности применяемых методов диагностики и терапии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести ретроспективный анализ случаев формирования истмоцеле у пациенток, перенесших кесарево сечение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведён ретроспективный анализ 106 историй болезней за 2023 год, перенесших операцию кесарево сечения в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре здоровья матери и ребенка. Критериями включения и исключения стали:

Таблица 1

Критерии включения и исключения

Критерии исключения:	Критерии включения:
Рубец на матке (после кесарева сечения)	Плановое кесарево сечение
Экстренная операция	Отсутствие рубца на матке
Хориамниоит	Отсутствие воспалительных заболеваний матери
Тазо-головная диспропорция	Отсутствие онкологических заболеваний матери
Воспалительные заболевания матери.	Плановое кесарево сечение
Онкологические заболевания матери	

Всем женщинам избранных по критериям исследования было проведено трансвагинальное ультразвуковое исследование для оценки состояния рубца на матке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Общее количество оперативных родов за 2023 год в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре здоровья матери и ребенка составило - 1793. По результатам отбора случаев с вышеуказанными критериями выбрано 106


историй болезни. Основные показания к оперативным родам стало соматическая патология женщин.

Результаты исследования показали, что в исследуемой группе у 41,5% (n=44) женщин обнаружено истмоцеле различной степени по заключениям трансвагинального ультразвукового исследования. (табл.2). Степени тяжести оценивались по классификации Губбини [8] с помощью определения площади истмоцеле:

Площадь истмоцеле (mm²)= основание истмоцеле x высота истмоцеле/2

Таблица 2

Степени тяжести истмоцеле по классификации Губбини



Также выявлены большие и маленькие размеры истмоцеле основанной на толщину остаточного миометрия. [11] Согласно классификации Туланди, [12] дефект считается большим, когда остаточный миометрий в области рубца уменьшается больше чем

на 50%, и маленьким когда остаточный миометрий уменьшается до 50%. В данном исследовании установлено, что истмоцеле больших размеров встречается у 52,3 % (n=23) женщин, тогда как, маленькие у 47,7% (n=21).

Стоит также отметить, что среди женщин, у которых было обнаружено истмоцеле в той или иной степени, положение матки ретрофлексию (70,5% n=31). встречается почти в три раза чаще чем антефлексию (29,5% n=13). Это обусловлено тем, что положение матки в ретрофлексию, заживление раны ухудшается из-за растяжения области рубца. [11]

Основными предпосылками для хорошей регенерации тканей и формирования полноценного рубца являются оптимальные условия кровоснабжения, исключающие развитие ишемии и гипоксии тканей в области шва. [6] Результаты данного исследования показали, что только у 12,26% (n=13) пациенток обнаружено восстановление кровообращения в области рубца в Доплер режиме. Исходя из вышеперечисленных данных, можно утвердить, что требуется коррекция проведения оперативных родов, для снижения количества истмоцеле.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что у каждой четвертой женщины перенесшей операцию кесарева сечения впервые встречается истмоцеле различной степени тяжести;
2. Выявлено, что среди женщин с истмоцеле каждая вторая имеет значительные размеры дефекта рубца на матке.;
3. Утверждено, что кровоснабжение рубца на матке восстановлено только у одной из десяти женщин в исследуемой группе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Barba, M., Cola, A., Passoni, P., La Milia, L., De Vicari, D. and Frigerio, M. (2023), Transvaginal repair of isthmocele after cesarean scar pregnancy. *Int J Gynecol Obstet*, 162: 775-776.
2. Budny-Winska J, Pomorski M. Uterine niche after cesarean section: a review of diagnostic methods. *Ginekol Pol* 2021; 92: 726–730.
3. En'kova EV [Prediction of uterine scar failure by assessing the mast cell population] / EV En'kova, DA Atyakshin, VA Vukolova et al [Scientific results of biomedical research]. – 2019. – V. 5. – No. 2. – P. 86–95.
4. Martynov S.A., Adamyan L.V. Scar on the uterus after cesarean section: terminological aspects. *Gynecology* 2020;22(5):70-75. (Martynov SA, Adamyan LV Uterine scar after cesarean section: terminological aspects. *Ginekologija* 2020;22 (5):70-75).
5. Menacker F, Hamilton BE. Recent trends in cesarean delivery in the United States. *NCHS Data Brief*. 2023; 35 :1-8
6. Moretti L, Stalfort J, Barker TH, Abebayehu D. The interplay of fibroblasts, the extracellular matrix, and inflammation in scar formation. *J Biol Chem*. 2022;298(2):101530
7. Murji A, Sanders AP, Monteiro I, Munro MG et al. Cesarean scar defects and abnormal uterine bleeding: a systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril*. 2022;118(4):758-766.
8. Laganà, A. S., Garzon, S., Alkatout, I., Hortu, I., Gitas, G., Vitale, S. G., & Gubbini, G. (2022). Isthmocele: When Surgery Is Both the Problem and the Solution. *Journal of Investigative Surgery*, 35(1), 231–232.
9. Thaysa Guglieri Kremer, Isadora Bueloni Ghiorzi, Raquel Papandreu Dibi. [Isthmocele : an overview of diagnosis and treatment]. *REV ASSOC MED BRAS* 2021; 65(5):714-721
10. Rupa R, Kushvaha S, Venkatesh K. Uterine Isthmocele-A Frequently Overlooked Complication of Cesarean Sections. *Indian J Radiol Imaging*. 2021 Oct 26;31(3):601-604. doi: 10.1055/s-0041-1736393. PMID: 34790304; PMCID: PMC8590568.
11. R Basel Al-Ghotani, Nafiza Martini, Ebaa Alabdallah, Ieman Alawad, Khaled Hussien, A large post-caesarean Niche (Isthmocele) with amenorrhea, a symptom that was not reported in the medical literature: A rare case report, *International Journal of Surgery Case Reports*, Volume 109, 2023, 108528, ISSN 2210-2612,
12. Tulandi T, Cohen A. Emerging Manifestations of Cesarean Scar Defect in Reproductive-aged Women. *J Minim Invasive Gynecol*. 2016 Sep-Oct;23(6):893-902. doi: 10.1016/j.jmig.2016.06.020. Epub 2016 Jul 5. PMID: 27393285.

РАЗРЫВ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ДО РОДОВ: ОБЗОР ПОДХОДОВ К ИНДУКЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Шамсиева Д.А., Рузиева Н.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет

ХУЛОСА

Ўз вақтига етган ҳомиладорликда (≥ 37 ҳафта) туғишдан олдин ҳомила пардасини ерилиши (ТОҲПЕ) 8-10% ҳомиладор аёлларда рўй беради ва бу вазият она ва янги туғилган болада юқори хавф билан боғлиқ. Мақолада халқаро тадқиқотларнинг тизимли таҳлили, (ACOG, WHO, NICE) клиник тавсиялари ва миллий протоколларга таянган ҳолда ТОҲПЕда туғиш жараенини индукциясига бўлган замонавий ендашувлар обзори тақдим этилган. Бишоп шкаласи бўйича бачадон бўйинини этилгани, ҳомиладорликни муддати, паритети ва инфекция омиллари асослашиб индукция усулини танлашда алоҳида эътибор қаратилган. Томир ичига окситоцин юбориши, мизопростол (оғиз еки қин орқали), динопростон ва баллон катетери каби усулларнинг самараси ва хавфсизлиги кўриб чиқилган. Ҳомиладорликлар якунига бағишланган йирик мета-таҳлиллар ва клиник синовларнинг солиштирилган маълумотлари келтирилган. Хориоамнионит, неонатал сепсис ва бошқа асоратларни олдини олиш учун зудлик билан индукцияни бошлашга (ТОҲПЕ намоен бўлгандан сўнг 12-24 соат ичида) алоҳида ақцент қилинган. Индивидуал ендашув ва халқаро тавсияларни клиник амалиётга татбиқ этиши зарурлигини муҳимлиги айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: туғишдан олдин ҳомила пардасини ерилиши (ТОҲПЕ), туғишни индукция этиши, мизопростол, окситоцин, Бишоп шкаласи, хориоамнионит, ўз вақтига етган ҳомиладорлик, акушерлик тактикаси, клиник тавсиялар, туғиш жараенини олиб бориш усуллари.

Дородовой разрыв плодных оболочек (ДРПО) при доношенной беременности (≥ 37 недель) регистрируется у 8–10% беременных и остаётся одной из ключевых причин госпитализации и родоразрешения, ассоциированных с повышенными материнскими и неонатальными рисками [1,2]. Современные исследования указывают на полиэтиологическую природу этого явления, включающую как физиологические процессы, так и патологические изменения в структурах плодного мешка и шейки матки [3–5].

Одной из наиболее частых причин является физиологическое созревание шейки матки и активация родовой деятельности, в том числе повышение синтеза простагландинов и окситоцина, что сопровождается повышением внутриамниотического давления и

SUMMARY

Premature Rupture of Membranes (PROM) at Term (≥ 37 weeks) occurs in 8–10% of pregnancies and is associated with increased risks for both the mother and the newborn. This article presents a review of current approaches to labor induction in term PROM, based on a systematic analysis of international studies, clinical guidelines (ACOG, WHO, NICE), and national protocols. Particular attention is given to the choice of induction method depending on cervical readiness (Bishop score), gestational age, parity, and infectious risk factors. The review evaluates the efficacy and safety of various induction methods, including intravenous oxytocin, misoprostol (oral and vaginal forms), dinoprostone, and balloon catheter. Comparative data from large meta-analyses and clinical trials on delivery outcomes are presented. Emphasis is placed on the importance of timely initiation of induction (within 12–24 hours after PROM) to reduce the risk of chorioamnionitis, neonatal sepsis, and other complications. The article underscores the need for an individualized approach and the implementation of international recommendations into routine clinical practice.

Keywords: premature rupture of membranes, labor induction, misoprostol, oxytocin, Bishop score, chorioamnionitis, term pregnancy, obstetric management, clinical guidelines, methods of labor stimulation.

механическим напряжением оболочек [6,7]. Важную роль играют инфекционно-воспалительные процессы нижнего полового тракта, такие как бактериальный вагиноз, хламидиоз, микоплазменная и уреоплазменная инфекции, способствующие воспалительной деструкции амниотической мембраны и активации матриксных металлопротеиназ (ММП) – ферментов, разрушающих коллаген снижая прочность оболочек [8–11].

Анатомические и акушерские факторы, включая многоводие, крупный плод, многоплодную беременность и патологическое предлежание плода (тазовое или косое), также повышают риск ДРПО за счёт перерастяжения нижнего сегмента матки и оболочек [12]. Механическое воздействие, например, половые акты на поздних сроках беременности, частые ваги-

нальные исследования или непреднамеренные травмы, может способствовать локальному повреждению оболочек. Ятрогенные вмешательства, в частности амниотомия или влагалитические осмотры при нарушении асептики, также рассматриваются как потенциальные причины [13].

Отдельного внимания заслуживают индивидуальные предрасполагающие факторы: укорочение шейки матки, истмико-цервикальная недостаточность, наличие ДРПО в анамнезе, вредные привычки (например, курение), низкий социально-экономический статус, а также недостаточность синтеза структурных белков (в первую очередь, коллагена) у женщин с наследственной патологией соединительной ткани [14,15].

У большинства женщин начало родов в срок предвещается регулярными сокращениями матки. Тем не менее, примерно у 8–10% женщин происходит ДРПО – разрыв плодных оболочек до начала схваток [1]. У большинства женщин с ДРПО роды начинают-

ся спонтанно в течение 48 часов после разрыва [2]. Однако доказано, что риск осложнений для матери и новорождённого увеличивается с увеличением времени от ДРПО до родов [3,4].

Индукция родов сокращает интервал от ДРПО до родов и снижает риск таких осложнений, как хориоамнионит, эндометрит, неонатальный сепсис и госпитализация новорождённых в отделения интенсивной терапии, не увеличивая частоту кесарева сечения [16–18]. Согласно рекомендациям ACOG, NICE и минздрава республики Узбекистан (2022), индукция родов должна начинаться в течение 12–24 часов после установления ДРПО при отсутствии противопоказаний [1,2,19].

Успешность индукции при ДРПО зависит от зрелости шейки матки, срока беременности, паритета, метода индукции, наличия инфекционных осложнений и индивидуальных особенностей пациентки.

1. Состояние шейки матки (шкала Бишопа)

Оценка зрелости шейки матки проводится по шкале Бишопа:

Параметр	0	1	2	3
Открытие (см)	<1	1–2	3–4	>4
Длина шейки (см)	4	2–3	1–2	<1
Консистенция	Плотная	Умеренно размягчена	Мягкая	–
Положение	Кзади	По центру	Кпереди	–
Головка плода	–3	–2	–1/0	+1/+2

Интерпретация: 0-5 баллов – “незрелая”, 6-7 – “недостаточно зрелая”, 8-13 – “зрелая” [6,20]. Шкала Бишопа является ключевым фактором успешности индукции. При оценке ≥ 6 вероятность успешных вагинальных родов значительно возрастает. Исследования Gulmezoglu et al. (2012) и Sanchez-Ramos et al. (2002) показывают, что при незрелой шейке (≤ 5 баллов) необходима предварительная цервикальная подготовка [21,22].

2. Срок беременности

При ДРПО на доношенном сроке (≥ 37 недель) индукция более успешна, что связано с физиологической готовностью матки. Mozurkewich et al. (2009) отмечают более частое завершение индукции вагинальными родами и меньше осложнений в сравнении с преждевременными сроками [5].

3. Паритет

У первородящих женщин вероятность неуспешной индукции выше, особенно при незрелой шейке матки. Vroenenraets et al. (2005) показали, что у повторнородящих индукция успешнее даже при низком балле по шкале Бишопа [6].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В обзор включены публикации из баз PubMed, Cochrane Library, Scopus, Embase за 2010–2025 гг., включая РКИ, метаанализы, клинические рекомендации (ACOG, WHO, NICE) и национальные протоколы минздрава республики Узбекистан (2022). Отобрано 47 источников, из них 23 – первичные исследования,

с акцентом на эффективность и безопасность методов индукции при ДРПО.

Методы индукции при ДРПО: данные международных исследований и рекомендаций.

Согласно ACOG (2020) и NICE (2014), при ДРПО у доношенных без признаков хориоамнионита или фетального дистресса индукция должна быть начата в течение 12–24 часов после излития вод [1,2]. Исследование TERMPROM trial (Hannah et al., 1996) показало снижение риска хориоамнионита при активной индукции окситоцином без увеличения частоты кесарева сечения [3].

Окситоцин – препарат выбора при зрелой шейке. Обзор Cochrane (2023) подтвердил более короткий латентный период и меньший риск хориоамнионита при применении окситоцина [4]. Однако при незрелой шейке (Бишоп ≤ 5) эффективность окситоцина снижается, возрастает частота кесарева сечения и неэффективной индукции (Shetty et al., 2021). Тахисистолия возникает у 10–12% при быстром титровании дозы [7].

Метаанализ 20 РКИ (около 3000 женщин) показал, что оральный мизопростол сокращает время индукции и снижает послеродовую кровопотерю по сравнению с окситоцином, не повышая частоту кесарева сечения и инфекций [5]. Мизопростол способствует созреванию шейки, особенно при балле < 6 . Sheikh et al. (2021) и Hill et al. (2024) подтвердили эффективность вагинального и орального мизопро-

стола, при этом последний снижает риск инфекции. Частота тахисистолии с вагинальным мизопростолом (≥ 50 мкг) достигает 11–13% [8, 9]. WHO (2022) рекомендует оральный мизопростол 25 мкг каждые 2 часа [10].

Вагинальный пессарий с динопростомом (Yao et al., 2021) эффективен у незрелой шейки, но с риском гиперстимуляции 5–7%, ниже, чем у мизопростолола. Преимущество – возможность быстрого удаления препарата при осложнениях [11].

Chang et al. (2024) в байесовской модели показали сопоставимую эффективность буккального мизопростолола и окситоцина [12].

Баллонный катетер эффективно расширяет шейку, но повышает риск хориоамнионита [13].

Анализ данных зарубежных исследований свидетельствует о высокой эффективности комбинированных методов индукции родов при дородовом разрыве плодных оболочек, особенно у женщин с незрелой шейкой матки. Наиболее часто применяемыми схемами являются предварительное использование простагландинов (PGE₂-гель или мизопростол) с последующим назначением окситоцина, а также сочетание механических и медикаментозных методов, включая введение баллонного катетера в комбинации с простагландинами [23–27].

Согласно данным Aryal и Karki [28], предварительная цервикальная подготовка с использованием PGE₂ у женщин с ДРПО и неблагоприятным биофизическим статусом шейки позволяет существенно снизить частоту кесарева сечения, сократить продолжительность латентной фазы и уменьшить частоту патологий со стороны плода. Результаты сети метаанализа Wood и соавт. [29] показывают, что мизопростол и PGE₂ являются наиболее эффективными в достижении родов в течение 12 часов после PROM при сопоставимом уровне безопасности с другими методами.

Метаанализы Belihu и др. [30] и Amegashie и соавт. [31] подтверждают целесообразность ранней активной тактики индукции при ДРПО, подчёркивая её преимущество в снижении частоты инфекционных осложнений без увеличения риска оперативного родоразрешения. Beckmann и соавт. [32] в современном руководстве по акушерству подчёркивают, что применение простагландинов с последующим введением окситоцина является предпочтительной стратегией у пациенток с низким баллом по шкале Бишопа. Систематический обзор Mozurkewich и др. [5] демонстрирует, что комбинированные методы, в том числе механические и фармакологические, превосходят монотерапию по эффективности и сохраняют приемлемый профиль безопасности.

Таким образом, большинство авторов сходятся во мнении, что комбинированные подходы к индукции родов после ДРПО обеспечивают более благоприятные акушерские и неонатальные исходы, особенно при незрелом состоянии шейки матки, по сравнению

с изолированным применением одного метода.

Также исследование ARRIVE (2018) [14] показало, что плановая индукция снижает риск кесарева сечения у первородящих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Индукция родов при ДРПО у доношенных беременных – эффективная и безопасная стратегия. Выбор метода зависит от зрелости шейки, паритета и противопоказаний. Современные данные подтверждают безопасность мизопростолола и комбинированных методов при строгом соблюдении временных рамок (12–24 часа). Внедрение международных рекомендаций и персонализация подхода способствуют снижению осложнений и повышению удовлетворённости пациенток.

ЛИТЕРАТУРА

1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Clinical management guidelines for obstetricians–gynecologists. *Obstet Gynecol.* 2020;135(4):e100–e119.
2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Intrapartum care for healthy women and babies. NICE guideline [CG190]; 2014.
3. Hannah ME, Ohlsson A, Farine D, et al. Induction of labor compared with expectant management for prelabor rupture of the membranes at term. *N Engl J Med.* 1996;334(16):1005–10.
4. Middleton P, Shepherd E, Flenady V, et al. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. *Cochrane Database Syst Rev.* 2023;(6):CD004945.
5. Mozurkewich EL, Chilimigras JL, Koepke ER, et al. Methods of induction of labour: a systematic review. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2009;9:33.
6. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. *Williams Obstetrics.* 25th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2018.
7. Shetty A, Danielian P, Templeton A. A comparison of oral and vaginal misoprostol for induction of labour. *Br J Obstet Gynaecol.* 2021;108(3):238–43.
8. Sheikh L, Najmi N, Khalid U, et al. Oral versus vaginal misoprostol for labor induction: a randomized controlled trial. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2021;21(1):1–6.
9. Hill JB, O’Brien JM, Edelman AB. Misoprostol for labor induction in term pregnancy: a review. *Am J Obstet Gynecol.* 2024;230(3):284–92.
10. World Health Organization (WHO). WHO recommendations on induction of labour. Geneva: WHO; 2022.
11. Yao D, Zhang L, Gao Y, et al. Vaginal dinoprostone for labor induction in term pregnancies: A meta-analysis. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2021;256:165–71.
12. Chang HH, Lin HH, Cheng BH, et al. Comparative effectiveness of misoprostol and oxytocin: a Bayesian network meta-analysis. *BJOG.* 2024;131(4):544–52.

13. Crane JM, Delaney T, Hutchens D. Vaginal birth after cesarean section: outcomes and predictors. *Am J Obstet Gynecol.* 2003;189(4):944–9.
14. Grobman WA, Rice MM, Reddy UM, et al. Labor induction versus expectant management in low-risk nulliparous women. *N Engl J Med.* 2018;379(6):513–23.
15. Romero R, Espinoza J, Gotsch F, et al. The use of high-throughput genomic technologies to study the biology of spontaneous preterm labor. *Clin Perinatol.* 2005;32(3):531–56.
16. Seaward PG, Hannah ME, Myhr TL, et al. International multicenter term PROM study: evaluation of predictors of neonatal infection in infants born to mothers with prelabor rupture of membranes at term. *Am J Obstet Gynecol.* 1997;177(5):1024–9.
17. Kenyon S, Boulvain M, Neilson JP. Antibiotics for pre-labor rupture of membranes at term. *Cochrane Database Syst Rev.* 2004;(1):CD001807.
18. Tita ATN, Andrews WW. Diagnosis and management of clinical chorioamnionitis. *Clin Perinatol.* 2010;37(2):339–54.
19. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Протокол оказания медицинской помощи: дородовой разрыв плодных оболочек. Ташкент; 2022.
20. Bishop EH. Pelvic scoring for elective induction. *Obstet Gynecol.* 1964;24:266–8.
21. Gülmezoglu AM, Crowther CA, Middleton P, et al. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;(6):CD004945.
22. Sanchez-Ramos L, Kaunitz AM, Wears RL, et al. Misoprostol for cervical ripening and labor induction: a meta-analysis. *Obstet Gynecol.* 2002;99(2):145–51.
23. Jindal P, Avasthi K, Guleria K. Comparison of transcervical Foley catheter with vaginal misoprostol for cervical ripening and labor induction. *Int J Gynaecol Obstet.* 2020;148(1):60–5.
24. Kashanian M, Shahali S. Comparison between prostaglandin E2 gel and Foley catheter for labor induction. *Arch Iran Med.* 2010;13(7):483–7.
25. Ten Eikelder MLG, Oude Rengerink K, de Leeuw JW, et al. Foley catheter versus vaginal prostaglandin E2 gel for induction of labor at term. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2013;13:12.
26. Jozwiak M, Rengerink KO, Benthem M, et al. Foley catheter vs. prostaglandin E2 gel for induction of labor: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol.* 2011;118(5):1032–9.
27. Zahran KM, El-Badawy S. Combined Foley catheter and vaginal misoprostol versus vaginal misoprostol alone for induction of labor. *J Obstet Gynaecol Res.* 2013;39(3):622–7.
28. Aryal S, Karki S. Comparison of misoprostol and dinoprostone for cervical ripening and labor induction. *J Nepal Health Res Coun.* 2019;17(2):201–6.
29. Wood S, Cooper S, Ross S. Does induction of labour increase the risk of cesarean section? A systematic review and meta-analysis of trials in women with intact membranes. *BJOG.* 2020;127(5):546–53.
30. Belihu A, Hall DR, Grove D, et al. Maternal and neonatal outcomes of labor induction in low-resource settings: a systematic review. *Int J Gynaecol Obstet.* 2020;149(2):140–9.
31. Amegashie C, Owusu-Antwi D, Boadu B, et al. Risk factors for cesarean delivery following induction of labor. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2021;21(1):354.
32. Beckmann CR, Ling FW, Smith RP, et al. *Obstetrics and Gynecology.* 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019.
33. American College of Obstetricians and Gynecologists. Induction of Labor. Practice Bulletin No. 107. *Obstet Gynecol.* 2009;114(2 Pt 1):386–97.
34. Boulvain M, Kelly A, Irion O. Intravenous oxytocin alone for cervical ripening and induction of labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2001;(4):CD003246.
35. Hofmeyr GJ, Gülmezoglu AM. Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labor. *Cochrane Database Syst Rev.* 2003;(1):CD000941.
36. Alfirevic Z, Keeney E, Dowswell T, et al. Labor induction with prostaglandins: systematic review. *BJOG.* 2020;127(3):314–21.
37. Leduc D, Biringer A, Lee L, et al. Induction of labour. *J Obstet Gynaecol Can.* 2013;35(9):840–60.
38. Hofmeyr GJ, Neilson JP. Misoprostol for cervical ripening and induction of labor: a systematic review. *BJOG.* 1999;106(7):689–94.
39. Weeks A. The mechanism of action of misoprostol in the human uterus. *BJOG.* 2020;127(3):357–63.
40. Neilson JP. Care of term PROM: Review. *Lancet.* 2006;367(9506):1359–65.
41. Simpson KR, James DC. Effects of oxytocin-induced uterine hyperstimulation during labor on fetal oxygen status. *Am J Obstet Gynecol.* 2008;199(1):34.e1–34.e5.
42. Boulvain M, Stan C, Irion O. Membrane sweeping for induction of labour. *Cochrane Database Syst Rev.* 2005;(1):CD000451.
43. Caughey AB, Sundaram V, Kaimal AJ, et al. Maternal and neonatal outcomes of elective induction of labor. *Evid Rep Technol Assess.* 2009;(176):1–257.
44. Wray S, Jones K, Kupittayanant S, et al. The physiological basis of uterine contractility. *Br J Obstet Gynaecol.* 2003;110(Suppl 20):1–8.
45. Luthy DA, Shy KK, van Belle G, et al. Early labor induction versus expectant management in nulliparous women with pregnancy-induced hypertension. *Obstet Gynecol.* 1987;69(3 Pt 1):307–10.
46. Crane JM. Factors predicting labor induction success. *J Obstet Gynaecol Can.* 2006;28(10):887–93.
47. Melamed N, Ben-Haroush A, Meizner I, et al. Expectant management of prelabor rupture of membranes at term: a prospective study. *Arch Gynecol Obstet.* 2009;279(3):395–9.

УДК: 618.5.-089.88.61

РОЛЬ АНТЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

Шерматова Д.Н, Даминов Р.Ф.

Городской межрайонный перинатальный центр №6, Ташкент

XULOSA

O‘zbekiston Respublikasida homilador ayollarga sifatli antenatal yordam ko‘rsatish asos deb hisoblanadi. Butun akusherlik tizimining ishi birlamchi tibbiy-sanitariya yordami bosqichida homilador ayollarga xizmat ko‘rsatish samaradorligi, qulayligi va sifatini oshirishga qaratilgan. Skrining dasturlarini joriy etish homiladorlik asoratlari va homila anomaliyalarini bashorat qilish va oldini olishni sezilarli darajada yaxshilaydi. Skrining tizimlari patologiyalarni rivojlanish xavfi yuqori bo‘lgan homilador ayollarni aniqlash va qo‘shimcha tadqiqot va davolash choralarining zarur miqdorini aniqlash imkonini beradi. Eng keng tarqalgan tizimlardan biri bu preeklampsiya va intrauterin o‘shishning kechikishi xavfini baholash uchun ishlab chiqilgan Homila Tibbiyot Jamg‘armasi (FMF) skrining modelidir. Model homilador ayolning yoshini, tana massasi indeksini, kasallik tarixini, bachadon arteriyalarida qon oqimini, platsenta o‘shish omili (PIGF) darajasini va turmush tarsi bilan bog‘liq xavf omillarini hisobga oladi. Ijtimoiy omillar (past ijtimoiy-iqtisodiy ahvol, surunkali stress, noto‘g‘ri ovqatlanish) tug‘ma patologiyalarning muhim prognozi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: homiladorlik, homila.

Качественный антенатальный уход лежит в основе оказания помощи беременным в республике Узбекистан. Работа всей системы родовспоможения направлена на повышение эффективности, доступности и качества оказания услуг беременным на этапе первичного звена здравоохранения.

Методики ведения беременных на антенатальном этапе в разных странах. Антенатальный уход представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери и плода на протяжении всего периода беременности, особенно во второй её половине. Международный опыт показывает, что подходы к ведению беременности варьируют в зависимости от уровня развития системы здравоохранения, социальных и экономических особенностей стран.

В странах Европы и Северной Америки широко применяется система, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), предусматривающая регулярные визиты беременной к врачу и проведение скрининговых исследований. Согласно протоколу ВОЗ, рекомендуется не менее 8 антенатальных визитов, начиная с 12 недели беременности. Эти посещения включают оценку артериального дав-

SUMMARY

Quality antenatal care is the basis for providing assistance to pregnant women in the Republic of Uzbekistan. The work of the entire obstetrics system is aimed at improving the efficiency, accessibility and quality of services to pregnant women at the primary health care stage. The introduction of screening programs significantly improves the prediction and prevention of pregnancy complications and fetal abnormalities. Screening systems allow identifying pregnant women with a high risk of developing pathologies and determining the necessary amount of additional research and treatment measures. One of the most common systems is the Fetal Medicine Foundation (FMF) screening model, developed to assess the risk of preeclampsia and intrauterine growth retardation. The model takes into account the age of the pregnant woman, body mass index, medical history, blood flow in the uterine arteries, levels of placental growth factor (PIGF) and risk factors associated with lifestyle. Social factors—such as low socioeconomic status, chronic stress, and poor nutrition—are important predictors of congenital pathologies.

Keywords: pregnancy, fetus.

ления, веса, анализ мочи, оценку состояния плода и матери, лабораторные исследования крови, а также ультразвуковые обследования [1,2].

В Великобритании и странах Скандинавии особое внимание уделяется системе персонализированного подхода, когда каждая беременная получает индивидуальный план ведения беременности. Это позволяет своевременно выявлять риски и оптимизировать тактику ведения беременности [3]. В Японии и Южной Корее акцент сделан на постоянном ультразвуковом мониторинге состояния плода, что позволяет достичь высокой эффективности ранней диагностики различных аномалий [4].

В странах с развивающейся экономикой и ограниченным доступом к высококачественной медицинской помощи, таких как государства Африки и Южной Азии, основным методом остается базовый уход, включающий ограниченное количество визитов и более скромный перечень доступных диагностических процедур. В этих условиях особое значение приобретает использование недорогих методов скрининга и массового информирования населения о простых мерах профилактики осложнений беременности [5].

Таким образом, несмотря на различия в подходах, общим трендом является стремление к повышению доступности и эффективности медицинской помощи путем внедрения международных стандартов и рекомендаций.

Роль скрининговых программ на антенатальном этапе. Внедрение скрининговых программ существенно улучшает прогнозирование и профилактику осложнений беременности и аномалий развития плода. Скрининговые системы позволяют выявлять беременных с высоким риском развития патологий и определять необходимый объем дополнительных исследований и лечебных мероприятий.

Одной из наиболее распространенных систем является скрининговая модель Fetal Medicine Foundation (FMF), разработанная для оценки риска преэклампсии и задержки внутриутробного развития. Модель учитывает возраст беременной, индекс массы тела, анамнез, показатели кровотока в маточных артериях, уровни плацентарного фактора роста (PIGF) и факторов риска, связанных с образом жизни [6,7].

Также успешно используются системы оценки риска врожденных дефектов, такие как PRISCA и OSCAR, которые включают данные ультразвуковых маркеров и биохимического скрининга крови матери для выявления синдрома Дауна и других хромосомных аномалий [8]. Использование скрининговых программ в антенатальном периоде помогает оптимизировать ресурсы, снижает риск пропуска важных патологий и позволяет обеспечить своевременное медицинское вмешательство для предотвращения осложнений.

Роль ультразвукового исследования в диагностике аномалии развития плода. Ультразвуковое исследование (УЗИ) является ведущим методом диагностики врожденных аномалий развития плода и занимает центральное место в антенатальном наблюдении во второй половине беременности. Оно позволяет неинвазивно и в режиме реального времени выявлять широкий спектр патологий: пороки сердечно-сосудистой системы, дефекты нервной трубки, аномалии мочеполовой системы и опорно-двигательного аппарата.

Оптимальным временем для проведения скринингового УЗИ считается 18-22 неделя беременности, поскольку в этот период органы и системы плода уже сформированы и доступны для детальной визуализации. Ультразвуковой скрининг помогает своевременно определить необходимость дополнительных диагностических процедур и возможных лечебных мероприятий [9].

Помимо стандартного двухмерного УЗИ, в последние годы все активнее используются трехмерные (3D) и четырехмерные (4D) ультразвуковые технологии. Они повышают точность диагностики сложных врожденных дефектов, особенно лицевых и костно-мышечных аномалий, предоставляя детальные

данные о структуре и функции органов плода [10].

Недостатки УЗИ в диагностике плода. Несмотря на широкое применение и доказанную эффективность, ультразвуковая диагностика имеет ряд ограничений и недостатков, которые могут существенно повлиять на точность диагностики и ведение беременности.

Одним из основных недостатков является операторская зависимость результатов УЗИ. Качество и информативность исследования во многом определяются опытом и квалификацией специалиста, проводящего процедуру. Это может приводить как к гипердиагностике, так и к пропуску важных патологий [9].

Также существенным фактором является техническое качество аппаратуры и разрешающая способность ультразвуковых датчиков. Ограничения визуализации могут затруднять раннее выявление мелких дефектов, особенно сердечно-сосудистых и неврологических патологий, а также синдромов, сопровождающихся небольшими структурными изменениями [10].

Другим значимым ограничением является сложность диагностики некоторых функциональных и генетических аномалий, не имеющих четкой ультразвуковой картины. Так, многие хромосомные синдромы и метаболические нарушения могут оставаться незамеченными при рутинном УЗИ, что требует проведения дополнительных биохимических и молекулярно-генетических исследований [8].

Кроме того, некоторые патологические состояния (например, некоторые виды пороков развития центральной нервной системы или внутренних органов) могут развиваться постепенно и проявляться лишь на более поздних сроках беременности, что усложняет их своевременное выявление.

Эти недостатки подчеркивают необходимость комплексного подхода к антенатальному мониторингу, с сочетанием УЗИ и других диагностических методов, включая генетический и биохимический скрининг.

Частота встречаемости патологии внутриутробного плода по системам. Кроме наиболее распространенных патологий сердечно-сосудистой, центральной нервной и мочеполовой систем, заслуживают особого внимания аномалии пищеварительной и дыхательной систем плода. Пороки развития желудочно-кишечного тракта диагностируются примерно в 1-2 случаях на 1000 беременностей. Наиболее частыми среди них являются атрезия пищевода, гастрошизис, омфалоцеле, атрезия кишечника [11].

Патология дыхательной системы, включающая диафрагмальные грыжи и кистозные мальформации лёгких, выявляется с частотой от 1 до 4 на 10 000 живорождений. Эти состояния требуют не только ранней диагностики, но и своевременного планирования лечения в специализированных центрах после рождения [12].

Хромосомные и генетические синдромы, такие как синдром Дауна, Эдвардса и Патау, встречаются с общей частотой около 1 случая на 500-700 живорождений. Их диагностика особенно важна для определения дальнейшей тактики ведения беременности и прогнозирования её исхода [13].

Общая частота врожденных аномалий варьируется в зависимости от географических, социальных, экономических и экологических факторов, однако, по данным ВОЗ, приблизительно 3-5% от всех беременностей сопровождаются развитием тех или иных врожденных дефектов. Это подчёркивает важность систематического мониторинга и комплексной диагностики для своевременного принятия решений [14].

Информированность беременных о факторах риска развития аномалий плода. Несмотря на признание важности информированности беременных, во многих странах уровень знаний женщин о возможных рисках остается неудовлетворительным. Согласно исследованиям, около 40% беременных не знают, какие факторы способны привести к аномалиям развития плода и какие профилактические меры могут снизить риск их возникновения [15].

Повышение осведомленности беременных осуществляется через внедрение специализированных образовательных программ и активное консультирование на этапе планирования и во время беременности. Такие программы включают беседы врачей, акушерок, а также использование интерактивных цифровых ресурсов и мобильных приложений, позволяющих женщинам регулярно получать необходимую информацию о рисках и методах профилактики [16].

Важность информированности также проявляется в повышении комплаентности, что позволяет существенно снизить частоту таких осложнений, как преждевременные роды, задержка роста плода и врожденные пороки, обусловленные поведением матери (курение, алкоголь и наркотики, бесконтрольный прием лекарств) [17].

Современные исследования показывают, что женщины, прошедшие специальные образовательные курсы и консультации, чаще своевременно обращаются за медицинской помощью и проявляют большую ответственность за собственное здоровье и здоровье плода, что позитивно влияет на исходы беременности [18].

Влияние внешних факторов: экология, состояние здоровья, социальные факторы на развитие аномалий плода. Влияние внешних факторов на развитие врожденных аномалий подтверждается многими международными исследованиями. Загрязнение окружающей среды тяжёлыми металлами (свинец, ртуть, кадмий) и органическими веществами (диоксины, пестициды) связано с повышенным риском дефектов нервной трубки, сердечно-сосудистых и респираторных пороков [19].

Состояние здоровья матери оказывает ключевое влияние на плод. Например, неконтролируемый сахарный диабет в несколько раз увеличивает риск развития пороков сердца, дефектов позвоночника и центральной нервной системы. Хроническая артериальная гипертензия связана с задержкой внутриутробного развития и преждевременными родами. Инфекции (TORCH-группа, COVID-19, грипп) также значительно повышают риск врожденных пороков и других осложнений [20].

Социальные факторы (низкий социально-экономический статус, хронический стресс, неполноценное питание) являются важными предикторами врожденных патологий. В странах с низким уровнем дохода беременные женщины часто не имеют регулярного доступа к качественной медицинской помощи, витаминам, адекватному питанию, что повышает риск внутриутробной патологии и перинатальной смертности [21].

Влияние социальных факторов также проявляется через образование и культуру поведения матери: недостаточная осведомлённость приводит к позднему обращению за медицинской помощью, игнорированию рекомендаций по профилактике врожденных дефектов (например, приём фолиевой кислоты), что ухудшает перинатальные исходы [22].

Таким образом, комплексное воздействие внешних факторов подчеркивает необходимость мультидисциплинарного подхода к профилактике, диагностике и ведению беременности.

ЛИТЕРАТУРА

1. WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. 2016.
2. NICE Guidelines. Antenatal care for uncomplicated pregnancies. 2021.
3. HS. Pregnancy and antenatal care, UK Guidelines. 2020.
4. Japan Society of Obstetrics and Gynecology Guidelines for antenatal care. 2018.
5. WHO. Maternal health in low-income countries. 2020.
6. Nicolaides KH. Screening for fetal aneuploidies at 11 to 13 weeks. Prenat Diagn. 2011.
7. FMF Risk Algorithms, Fetal Medicine Foundation. 2022.
8. Screening Tests in Pregnancy, ACOG Guidelines. 2020.
9. ISUOG Practice Guidelines: performance of fetal ultrasound. 2021.
10. American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Clinical standards. 2020.
11. European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT), Statistical Report. 2020.
12. American Lung Association. Congenital Lung Disorders Report. 2019.
13. Centers for Disease Control and Prevention. Data & Statistics on Birth Defects. 2021.

14. World Health Organization (WHO). Congenital anomalies factsheet. 2020.
15. Pregnant Women's Knowledge of Teratogens: Systematic Review. Journal of Maternal-Fetal Medicine. 2020.
16. March of Dimes. Prenatal education and awareness programs. 2021.
17. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Guidelines on Substance Use in Pregnancy. 2021.
18. UNICEF. Health literacy and pregnancy outcomes. Global Review. 2020.
19. Environmental Protection Agency (EPA). Environmental contaminants and birth defects, Report. 2020.
20. Mayo Clinic. Chronic conditions and pregnancy: clinical guidance. 2021.
21. Lancet Global Health. Social determinants and pregnancy outcomes. 2021.
22. World Bank. Socioeconomic inequalities and maternal health report. 2020.

УДК: 618.177-089.888.11:616.441-008.63:616-073

ВЛИЯНИЕ ГИПОТИРЕОЗА НА КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСТРОКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Шодиева Х.Т., Насырова Х.К., Жилонова А.Н.
Ташкентский государственный медицинский университет

XULOSA

Tadqiqotning maqsadi gipotireozda bepushtligi bo'lgan ayollarda ekstrakorporal urug'lantirish (EKU) dasturlari samaradorligini baholash edi. Homilador bo'lgunga qadar qalqonsimon bez funksiyasining holatiga qarab davolangan, bepushtlik va gipotireozga chalingan 92 nafar ayol tekshirildi. Bemorlar terapiyadan keyin ikki guruhga bo'lingan: 1-guruh ($n=57$) - $TTG < 2,5$ mME/l va 2-guruh ($n=35$) - $TTG \geq 2,5$ mME/l. Embrionlarni ko'chirish bemorlarning 81,5 foizida (75), homiladorlik 62,7 foizida (47) amalga oshirilgan. 2-guruhda homiladorlik chastotasi ishonchli ravishda past edi (70,6% ga nisbatan 45,8%; $p=0,039$), tushish chastotasi esa yuqori (16,6% ga nisbatan 36,4%; $p=0,020$) 1 guruhdagi ayollarga nisbatan. TTGning yuqori darajasi ($>2,5$ mME/l) homiladorlikning chastotasi va kechishiga ta'sir qilishi isbotlandi. Natijalar IVF bilan og'rikan ayollarda TTG darajasini optimallashtirish uchun pregravidar skrining va levotiroksin bilan yetarli darajada davolash zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: gipotireoz, ekstrakorporal urug'lanish, tireotropgormon, homiladorlik.

Одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний у женщин репродуктивного возраста является заболевание щитовидной железы. Явный гипотиреоз наблюдается примерно у 0,3–0,7% этой группы населения, а у 2–7% женщин наблюдается субклинический гипотиреоз, определяемый как повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови при нормальном уровне свободного тироксина (свТ4) и отсутствии явных симптомов гипотиреоза [1,2,7,11].

SUMMARY

The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the IVF programs in women with infertility and hypothyroidism. A total of 92 women with infertility and hypothyroidism were examined, who received treatment depending on the state of thyroid function before conception. The patients were divided into two groups after therapy: group 1 ($n=57$) – $TSH < 2.5$ mIU/L and group 2 ($n=35$) – $TSH \geq 2.5$ mIU/L. Embryo transfer was performed in 81.5% (75) of patients, pregnancy occurred in 62.7% (47). In group 2, the pregnancy rate was significantly lower (45.8% vs. 70.6%; $p=0.039$), and the miscarriage rate was higher (36.4% vs. 16.6%; $p=0.020$) than in women in group 1. High TSH levels (>2.5 mIU/L) have been shown to affect the frequency and course of pregnancy. The results highlight the need for preconception screening and adequate levothyroxine therapy to optimize TSH levels in women undergoing IVF.

Keywords: hypothyroidism, IVF, thyroid-stimulating hormone, pregnancy.

Концентрация ТТГ в сыворотке крови выше референсных значений (0,5–4,5 мМЕ/л) связана с неблагоприятными последствиями для репродуктивной системы и беременности, включая бесплодие, выкидыши, преждевременные роды и врожденные дефекты, даже если уровень свободного тироксина находится в пределах нормы [3,5,6,14]. Международные рекомендации по лечению привычного невынашивания беременности единогласно утверждают, что уровень ТТГ у женщин с этим диагнозом и гипотиреозом должен быть $<2,5$ мМЕ/л [4,8,9]. Тем не менее влия-

ние колебаний уровня ТТГ в пределах референсных значений на репродуктивные функции у пациентов без вышеупомянутых диагнозов до сих пор неясно.

ТТГ и Т4 используются в качестве основных параметров для оценки функции щитовидной железы, учитывая, что оба показателя претерпевают изменения во время беременности, а значит, их концентрация должна быть стабильной до наступления беременности [8,12]. Накопленные данные свидетельствуют о том, что для пациенток с субклиническим гипотиреозом, проходящих вспомогательные репродуктивные технологии, идеальным является уровень ТТГ в сыворотке крови $<2,5$ мМЕ/л, которого при необходимости можно достичь с помощью лечения левотироксином (LT4) [10,13]. Однако, применение LT4 у пациентов с отрицательным результатом анализа на антитела к щитовидной железе и уровнем ТТГ в пределах нормы вызывает споры, даже если уровень ТТГ превышает $2,5$ мМЕ/л [4,8].

Существуют рекомендации по лечению при значениях ТТГ > 4 мМЕ/л; однако при значениях от $2,5$ до $4,0$ мМЕ/л все еще рассматривается заместительная терапия LT4, несмотря на ограниченные данные, сообщающие о влиянии на исходы беременности в этом диапазоне ТТГ, исследования противоречивы [9,11], что говорит об актуальности проблемы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка эффективности программ экстракорпорального оплодотворения у женщин с бесплодием при гипотиреозе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены женщины фертильного возраста с диагнозом бесплодие различного генеза и гипотиреоз, обратившиеся в центр ЭКО. Пациенты старше 42 лет с диагностированным нарушением функции щитовидной железы, впервые диагностированным явным гипотиреозом, гипертиреозом,

аутоиммунным заболеванием щитовидной железы были исключены. Все пациентки прошли исследование перед началом ЭКО, в исследование включены 92 женщины с нормальным уровнем свободного Т4 в сыворотке, но повышенным уровнем ТТГ (>4 мМЕ/л) был диагностирован субклинический гипотиреоз, рекомендовано лечение (левотироксин) в соответствии от состояния функции щитовидной железы до применения процедуры ЭКО. После обследования и лечения, женщины были разделены на группы по уровню ТТГ до и во время беременности. В первую группу входили 57 женщин с уровнем ТТГ до $2,5$ мМЕ/л, вторую группу составили 35 пациенток со значением ТТГ $2,5-4,0$ мМЕ/л после лечения гипотиреоза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средний возраст обследуемых женщин составлял $32,8 \pm 2,3$ года (в диапазоне от 20 до 35 лет). У всех пациенток для контролируемой стимуляции яичников использовали стандартный протокол, когда один или несколько фолликулов достигал среднего диаметра ≥ 18 мм, проводился забор ооцитов под контролем УЗИ. Ооциты оплодотворялись и в зависимости от клинического состояния пациента проводился перенос свежих или замороженных эмбрионов на 3 или 5 день. Из 92 женщин перенос эмбрионов был осуществлён у 75 (81,5%), что составило в 1 группе 55,4% (51) во 2-ой группе у 26,1% (24) пациенток.

Повторное консультирование проведено примерно через 14 дней для оценки сывороточного хорионического гонадотропина и УЗИ (на 5-6 недели) для подтверждения беременности. Частота выкидышей определялась как отношение числа потерь плода до 20-й недели беременности, преждевременными родами считались роды до 37 недель. Из 75 женщин беременность наступила у 47 (62,7%), в 1 группе с уровнем ТТГ $\leq 2,5$ мМЕ/л - у 70,6%, а во 2-ой группе ТТГ $\geq 2,5$ мМЕ/л - у 45,8% (табл.).

Характеристика женщин с уровнем ТТГ $\leq 2,5$ и ТТГ $\geq 2,5$ мМЕ/л, получавших лечение левотриоксином

	ТТГ $\leq 2,5$ мМЕ/л (n=57)	ТТГ $\geq 2,5$ мМЕ/л (n=35)	P- значение
Возраст	$33,7 \pm 3,6$	$34,6 \pm 3,2$	0,398
ИМТ	$21,3 \pm 2,7$	$22,1 \pm 2,8$	0,752
Перенос эмбрионов	51 (89,4%)	24 (68,6%)	0,012
Результаты беременности			
Частота наступления беременности	70,6% (36/51)	45,8% (11/24)	0,039
Частота выкидышей	16,6% (6/36)	36,4% (4/11)	0,02
Преждевременные роды	19,4% (7/36)	27,3% (3/11)	0,67
Срочные роды	63,8% (23/36)	36,4% (4/11)	0,165

Во время беременности проводилось плановое обследование по протоколу антенатального ухода, дополнительно в каждом триместре беременности определялся уровень ТТГ и Т4, продолжался прием Левотироксина. Частота выкидышей в 1 группе составила 16,6%, во 2 группе 36,4%. Преждевременные роды в 1,5 раза выше наблюдались во 2 группе, тогда как роды после 37 недель были 1,7 раз выше в 1 группе, что составило 63,8%.

Полученные нами данные демонстрируют, что уровень ТТГ выше $2,5$ мМЕ/л у женщин с гипотиреозом ассоциирован с более низкой частотой наступления беременности и большей частотой выкидышей после ЭКО. Эти результаты согласуются с данными других авторов, указывающих на то, что даже субклинические нарушения функции щитовидной железы могут отрицательно влиять на исходы вспомогательных репродуктивных технологий [4,8,9,11].

Важно отметить, что международные руководства (ATA, ETA) рекомендуют поддерживать уровень ТТГ <2,5 мМЕ/л у женщин, планирующих беременность или проходящих программы ЭКО. Наши данные подтверждают клиническую значимость данного подхода и необходимость своевременной коррекции дозы левотироксина у пациенток с гипотиреозом.

ВЫВОДЫ

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что повышение уровня ТТГ более 2,5 мМЕ/л у женщин с гипотиреозом ассоциировано с меньшей частотой наступления беременности и более высокой частотой выкидышей после ЭКО. Это подчеркивает необходимость своевременного скрининга и коррекции гипотиреоза как при планировании ЭКО, так и во время беременности для улучшения перинатальных исходов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Alexander EK. 2017 guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum // *Thyroid*. –2017. – № 27. –P.315–389.
2. Anandappa S, Joshi M, Polanski L, Carroll PV. Thyroid disorders in subfertility and early pregnancy // *Ther Adv Endocrinol Metab*. –2020. doi: 10.1177/2042018820945855. PMID: 33133491.
3. Jølvig LR, Larsen MD, Fedder J, Friedman S, Nørgård BM. The chance of a live birth after assisted reproduction in women with thyroid disorders // *Clin Epidemiol*. –2019. –№11. –P. 683–694. doi: 10.2147/CLEP.S208574
4. Lee SY, Cabral HJ, Aschengrau A, Pearce EN. Associations between maternal thyroid function in pregnancy and obstetric and perinatal outcomes // *J Clin Endocrinol Metab*. –2020. №105(5). –e2015–23. doi: 10.1210/clinem/dgz275
5. Maraka S, Singh Ospina NM, Mastorakos G, O’Keefe DT. Subclinical hypothyroidism in women planning conception and during pregnancy: Who should be treated and how? // *J Endocr Soc*. –2018. –№2(6). –P. 533–46. doi: 10.1210/js.2018-00090
6. Martínez M, Soldevila B, Lucas A, Velasco I, Vila L, Puig-Domingo M. Hypothyroidism during pregnancy and its association to perinatal and obstetric morbidity: a review // *Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed)*. –2018. –№65(2). –P. 107–13. doi: 10.1016/j.endinu.2017.11.009
7. Mintzioti G, Goulis DG, Kolibianakis EM. Thyroid function and IVF outcome: when to investigate and when to intervene? // *Curr Opin Obstet Gynecol*. –2016. –№28(3). –P. 191–7. doi: 10.1097/GCO.0000000000000263
8. Negro R. Thyroid and assisted reproduction technologies: A brief clinical update with recommendations for practice // *Endocr Metab Immune Disord Drug Targets*. –2018. –№ 18(3). – P. 194–200. doi: 10.2174/18715303186661801311 03029
9. Noli L, Khorsandi SE, Pyle A, Giritharan G, Fogarty N, Capalbo A, et al. Effects of thyroid hormone on mitochondria and metabolism of human preimplantation embryos. *Stem Cells*. –2020. –№38(3). –P. 369–81. doi: 10.1002/stem.3129
10. Poppe K, Bisschop P, Fugazzola L, Minzioti G, Unuane D, Weghofer A. 2021 European Thyroid Association Guideline on Thyroid Disorders prior to and during Assisted Reproduction // *Eur Thyroid J*. –2021. – №9(6). –P. 281-295. doi: 10.1159/000512790.
11. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Subclinical hypothyroidism in the infertile female population: a guideline // *Fertil Steril*. –2015. –№ 104(3). –P. 545–53. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.05.028
12. Sun Y Lee, Elizabeth N Pearce, Testing, Monitoring, and Treatment of Thyroid Dysfunction in Pregnancy // *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. –2021. – №106. Issue 3. –P. 883–892 <https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa945>
13. Vomstein K, Aulitzky A, Strobel L, Bohlmann M, Feil K, Rudnik-Schöneborn S, et al. Recurrent spontaneous miscarriage: a comparison of international guidelines // *Geburtshilfe Frauenheilkd*. –2021. –№81(7). –P. 769–79. doi: 10.1055/a-1380-3657
14. Shodieva H. T., Nazarova D. E, Parvizi N. I. Approach to the Management and Treatment of Women With Dysmenorrhea // *American Journal of Alternative Education*. –2024. –Vol. 1, No. 10, –P.61-64. <https://scientificbulletin.com/ind ex.php/AJAE>

УДК 618.173:615.357:616.379

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДЕФИЦИТА ЭСТРОГЕНОВ И ПРОФИЛАКТИКЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЯИЧНИКОВ

Шукурова М.Р., Иргашева С.У.

ГУ Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка, Ташкент

XULOSA

Perimenopauza yoshdagi ayollarda ikki tomonlama ovarioektomiya natijasida yuzaga keladigan jarrohlik menopauza estrogen darajasining keskin pasayishi bilan birga keladi, bu esa endokrin, metabolik, yurak-qon tomir, psixo- emotsional va kognitiv buzilishlarga olib keladi. Ushbu o'zgarishlar hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi va osteoporoz, dislipidemiya, Anksiyete- depressiv kasalliklar va jinsiy disfunktsiyani rivojlanish xavfini oshiradi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi gormonlarni almash-tirish terapiyasini (HRT) olgan va olmagan guruhlarini taqqoslashda jarrohlik menopauzadan keyin ayollarda klinik holatni, gormonal fonnini, suyak mineral zichligini, metabolik parametrlarni, kognitiv funktsiyalarni va hayot sifati ko'rsatkichlarini har tomonlama baholash edi. Tadqiqotga tibbiy sabablarga ko'ra ovarioektomiya qilingan 40 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan 78 ayol kiritilgan. Ishtirokchilar ikki guruhga randomizatsiya qilindi: HRT olgan asosiy (n=40) va gormonal davolanishdan o'tmagan nazorat (n=38). Vaziyatni baholash operatsiyadan oldin va 3, 6 va 12 oydan keyin MRS, PSQI, HADS, FSFI va MENQOL shkalalari yordamida va T-o'lchov tahlili, lipid profili, kognitiv test va gormonal holatni aniqlash orqali amalga oshirildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, HRT vazomotor va psixo-emotsional simptomlarni sezilarli darajada yaxshilagan, jinsiy gormonlar darajasini barqarorlashtirgan, suyak mineral zichligini saqlashga, lipid metabolizmini normallashtirishga, kognitiv funktsiyani, jinsiy salomatlikni va umumiy hayot sifatini yaxshilashga yordam bergan. Eng aniq ijobiy ta'sirlar 45 yoshdan kichik ayollarda terapiyaning erta boshlanishida kuzatilgan. Shunday qilib, gormonlarni almash-tirish terapiyasi perimenopauza yoshdagi ayollarda jarrohlik menopauza ta'sirini oldini olish va tuzatishda muhim rol o'ynaydi. Topilmalar bemorlarning ushbu toifasini boshqarishda individual multidisiplinar yondashuv zarurligini va HRT sxemalarini optimallashtirish va uning uzoq muddatli samaradorligini tasdiqlash uchun keyingi tadqiqotlarning dolzarbligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: jarrohlik menopauza, ovarioektomiya, gormonlarni almash-tirish terapiyasi, perimenopoz, estrogen etishmovchiligi, suyak mineral zichligi, lipid profili, hayot sifati, kognitiv funktsiya, metabolik sindrom.

SUMMARY

Surgical menopause resulting from bilateral oophorectomy in perimenopausal women is accompanied by a sharp decrease in oestrogen levels, leading to pronounced endocrine, metabolic, cardiovascular, psychoemotional and cognitive disorders. These changes significantly impair quality of life and increase the risk of developing osteoporosis, dyslipidaemia, anxiety-depressive disorders and sexual dysfunction.

The aim of this study was to comprehensively assess the clinical condition, hormonal background, bone mineral density, metabolic parameters, cognitive functions, and quality of life indicators in women after surgical menopause, comparing groups that received and did not receive hormone replacement therapy (HRT). The study included 78 women aged 40 to 55 who had undergone oophorectomy for medical reasons. Participants were randomised into two groups: the main group (n = 40) receiving HRT and the control group (n = 38) not receiving hormone treatment. The condition was assessed before surgery and at 3, 6, and 12 months using the MRS, PSQI, HADS, FSFI, and MENQOL scales, as well as through analysis of the T-score, lipid profile, cognitive testing, and determination of hormonal status.

The results showed that HRT significantly improved vasomotor and psychoemotional symptoms, stabilised sex hormone levels, contributed to the preservation of bone mineral density, normalised lipid metabolism, and improved cognitive function, sexual health, and overall quality of life. The most pronounced positive effects were observed in women younger than 45 years of age who started therapy early. Thus, hormone replacement therapy plays a key role in the prevention and correction of the consequences of surgical menopause in perimenopausal women. The data obtained emphasise the need for an individualised multidisciplinary approach to the management of this category of patients and the relevance of further research to optimise HRT regimens and confirm its long-term effectiveness.

Keywords: surgical menopause, oophorectomy, hormone replacement therapy, perimenopause, estrogen deficiency, bone mineral density, lipid profile, quality of life, cognitive function, metabolic syndrome.

Овариоэктомия – это хирургическое вмешательство, заключающееся в удалении одного или обоих яичников, что приводит к резкому снижению продукции эстрогенов и других половых гормонов. Такое гормональное нарушение вызывает развитие овариоэктомиического синдрома, который сопровождается выраженными нейровегетативными, психоэмоциональными и метаболическими расстройствами. У женщин в перименопаузальном периоде данное состояние усугубляет естественное снижение гормонального фона, значительно ухудшая качество жизни и повышая риск развития хронических соматических заболеваний [1,2].

Дефицит эстрогенов после овариоэктомии оказывает системное воздействие на организм. Одним из первых страдает костный аппарат: ускоренное уменьшение костной массы повышает риск развития остеопороза. Согласно данным исследований, вероятность остеопоротических переломов у женщин после овариоэктомии возрастает в 2–3 раза по сравнению с женщинами, не перенесшими операцию [3]. Также происходят значительные нарушения липидного обмена, проявляющиеся увеличением уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности, что способствует прогрессированию атеросклероза и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний [4].

Помимо метаболических изменений, гормональный дефицит оказывает выраженное влияние на психоэмоциональное состояние. Женщины, перенесшие овариоэктомию, чаще сталкиваются с депрессией, тревожностью, нарушением когнитивных функций и снижением трудоспособности [5]. В связи с этим особенно важным становится обоснованный выбор терапевтической тактики, направленной на коррекцию данных нарушений.

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) остаётся ведущим методом лечения овариоэктомиического синдрома, позволяющим компенсировать дефицит эстрогенов, снижать риски остеопороза, сердечно-сосудистых осложнений и когнитивных расстройств [6]. Однако назначение ЗГТ требует индивидуализированной оценки рисков, включая предрасположенность к тромбозам, злокачественным новообразованиям и заболеваниям печени.

Кроме ЗГТ, всё большую актуальность приобретают альтернативные методы, включающие применение фитоэстрогенов, рациональное питание, физическую активность, психотерапию и модификацию образа жизни [7,8]. Включение этих подходов в клиническую практику способствует уменьшению выраженности симптомов эстрогенного дефицита и улучшению общего самочувствия пациенток.

Таким образом, овариоэктомия, выполненная в перименопаузальном периоде, требует комплексного и междисциплинарного подхода к терапии и профилактике возможных осложнений. Настоящее исследование направлено на анализ современных подходов к

лечению эстрогенного дефицита и предупреждению метаболических нарушений у женщин после овариоэктомии, подчёркивая высокую клиническую значимость данной проблемы для улучшения качества медицинской помощи этой категории пациенток. [9,10].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить клинические, метаболические, гормональные, когнитивные показатели и параметры качества жизни у женщин в перименопаузе после хирургической менопаузы, сравнивая группы, получавшие и не получавшие ЗГТ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На базе ГУ «Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка» было проведено исследование с участием 78 женщин в перименопаузальном периоде в возрасте от 40 до 55 лет, перенёвших двустороннюю овариоэктомию по различным медицинским показаниям (доброкачественные опухоли яичников, эндометриоз, профилактика онкологических заболеваний и др.).

Пациентки были рандомизированы и разделены на две сравнительные группы: Основная группа (с ЗГТ, n = 40) – получали заместительную гормональную терапию; контрольная группа (без ЗГТ, n = 38) – не получали гормонального лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средний возраст участниц исследования составил $47,0 \pm 3,8$ лет. Полученные данные свидетельствуют о выраженном клиническом и метаболическом воздействии хирургической менопаузы на женщин в перименопаузе, а также о высокой эффективности заместительной гормональной терапии (ЗГТ) в коррекции возникающих нарушений.

1. *Климактерическая симптоматика.* Через 3 месяца после овариоэктомии пациентки, не получавшие ЗГТ, демонстрировали достоверно более выраженные вазомоторные и нейропсихические симптомы по шкале MRS. Средний балл в контрольной группе составил $19,0 \pm 4,3$ против $12,5 \pm 3,4$ в группе ЗГТ ($p < 0,01$). Наиболее частыми жалобами были приливы (85%), повышенное потоотделение (70%), раздражительность (65%) и тревожность (60%).

2. *Минеральная плотность костной ткани.* Через 12 месяцев после операции денситометрия поясничного отдела позвоночника показала более выраженное снижение T-показателя у женщин без гормональной поддержки: без ЗГТ: $-1,5 \pm 0,4$, с ЗГТ: $-0,7 \pm 0,3$ ($p < 0,05$) Это указывает на более активное развитие остеопении при дефиците эстрогенов.

3. *Липидный обмен.* У пациенток, не получавших ЗГТ, выявлены неблагоприятные изменения липидного профиля: общий холестерин: $6,1 \pm 0,9$ ммоль/л против $5,3 \pm 0,7$ ммоль/л ($p < 0,05$), ЛПНП: $3,9 \pm 0,6$ ммоль/л против $3,1 \pm 0,5$ ммоль/л ($p < 0,05$), уровень ЛПВП был ниже в контрольной группе.

4. *Когнитивное и психоэмоциональное состояние.* Нарушения сна (по шкале PSQI) встречались у

70% женщин без ЗГТ против 36% в основной группе ($p < 0,01$). Также чаще фиксировалась тревожность (по шкале HADS): 44% против 18%. По результатам нейропсихологических тестов (MMSE, задачи на память и внимание) у женщин без гормональной поддержки отмечались более выраженные когнитивные нарушения.

5. Возрастная стратификация. Женщины моложе 45 лет (примерно 40% выборки) демонстрировали более тяжёлое течение симптомов: выраженные вазомоторные и когнитивные расстройства, нарушения сна и более быстрое снижение костной массы: снижение Т-показателя: $-1,7 \pm 0,3$ у <45 лет против $-1,2 \pm 0,4$, у женщин >50 лет ($p < 0,05$). В то же время молодые пациентки лучше реагировали на ЗГТ, что подчёркивает важность своевременного начала терапии.

6. Госпитальный и послеоперационный период. Средняя длительность госпитализации составила $6,2 \pm 1,4$ дня и не различалась между группами. Лёгкие осложнения (гематомы раны, субфебрилитет, умеренная боль) отмечались эпизодически. Однако восстановление до исходного уровня активности происходило на 3–4 недели быстрее в группе ЗГТ.

Обобщение клинической значимости. Сравнительный анализ показал, что заместительная гормональная терапия способствует выраженному снижению тяжести климактерических симптомов, стабилизирует гормональный и липидный фон, уменьшает частоту когнитивных расстройств и улучшает качество жизни. Эти результаты согласуются с данными предыдущих исследований, подтверждающих эффективность ЗГТ в стабилизации нейроэндокринного баланса.

Значение для здоровья костей и когнитивных функций. Более выраженное снижение минеральной плотности костей в группе без ЗГТ подтверждает роль эстрогена в сохранении костной массы и профилактике остеопороза. Нейропсихологические изменения также указывают на влияние гормонального дефицита на центральную нервную систему. Положительная динамика у женщин, получавших ЗГТ, подчёркивает необходимость персонализированного подхода к выбору терапии.

Ограничения исследования. Несмотря на полученные значимые результаты, исследование имеет ряд ограничений: Некоторая неоднородность групп по возрасту, сопутствующим заболеваниям и предшествующему лечению может влиять на точность сравнения. Период наблюдения (12 месяцев) достаточен для оценки краткосрочных эффектов, однако требует продолжения для анализа отдалённых последствий. Использование субъективных шкал оценки (MENQOL, MRS) ограничено индивидуальным восприятием симптомов, что требует подтверждения объективными методами.

Перспективы. Будущие исследования должны включать более крупные выборки и расширенные сроки наблюдения для оценки долгосрочной эф-

фективности и безопасности ЗГТ. Особое внимание следует уделить влиянию терапии на когнитивное и кардиометаболическое здоровье, а также поиску биомаркеров для индивидуализации лечения.

Таким образом, применение ЗГТ у женщин, перенесших хирургическую менопаузу в перименопаузальном периоде, обеспечивает значимое улучшение клинических и лабораторных показателей, снижает выраженность симптомов и повышает качество жизни. Эти данные подтверждают необходимость включения гормональной терапии в комплексное ведение данной группы пациенток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование показало, что хирургическая менопауза у женщин в перименопаузальном периоде сопровождается выраженными эндокринными, метаболическими, костными, сердечно-сосудистыми и психоэмоциональными нарушениями. Сравнительный анализ между пациентками, получающими заместительную гормональную терапию (ЗГТ), и теми, кто не проходил гормонального лечения, подтвердил, что ЗГТ значительно снижает выраженность климактерических симптомов, стабилизирует уровень половых гормонов, способствует сохранению минеральной плотности костной ткани, улучшает липидный профиль и снижает риск сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, у женщин, получавших ЗГТ, были зафиксированы положительные изменения в когнитивной сфере, улучшение качества сна и общего самочувствия, что подчёркивает важность гормональной терапии как ключевого элемента в комплексном подходе к ведению пациентов после овариоэктомии.

Научная новизна данного исследования заключается в мультидисциплинарном подходе, включающем физиологическую, психологическую и субъективную оценку состояния пациенток, а также в детальной стратификации по возрасту и срокам начала симптоматики. Такой подход позволяет более точно определить оптимальные сроки начала ЗГТ и способствует разработке персонализированных лечебных стратегий, что имеет высокую клиническую значимость.

Полученные результаты подчеркивают необходимость своевременного назначения гормональной терапии для профилактики и коррекции последствий хирургической менопаузы, а также для повышения качества жизни пациенток. Тем не менее, для подтверждения долгосрочных эффектов и оптимизации протоколов ЗГТ необходимы дальнейшие исследования с большим числом наблюдаемых и более продолжительным периодом наблюдения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьева, Н. В., Шестакова, М. В. (2021). Климактерический синдром: современные подходы к диагностике и лечению. *Акушерство и гинекология*, (6), 5–10.
2. Репина, М. А., Макарова, Т. П. (2020). Влияние

- хирургической менопаузы на качество жизни и когнитивные функции женщин. *Акушерство, гинекология и репродукция*, 14(4), 32–38.
3. Кулакова, Е. Е., Хахалева, Е. В. (2022). Персонализированный подход к терапии при хирургической менопаузе. *Вестник репродуктивного здоровья*, (2), 45–51.
 4. Хуторова, О. Г., Краснопольская, К. В. (2018). Эстрогенная недостаточность и метаболические нарушения у женщин после овариоэктомии. *Гинекология*, 20(1), 24–28.
 5. Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ). (2021). Клинические рекомендации: «Менопауза и постменопауза». Утверждены Минздравом РФ.
 6. Baber, R. J., Panay, N., Fenton, A., & IMS Writing Group. (2016). IMS recommendations on women's midlife health and menopause hormone therapy. *Climacteric*, 19(2), 109–150. <https://doi.org/10.3109/13697137.2015.1129166>
 7. Davis, S. R., Lambrinoudaki, I., Lumsden, M. A., et al. (2015). Menopause. *Nature Reviews Disease Primers*, 1, 15004. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.4>
 8. Faubion, S. S., Kuhle, C. L., Shuster, L. T., & Rocca, W. A. (2015). Long-term health consequences of premature or early menopause. *Climacteric*, 18(4), 483–491. <https://doi.org/10.3109/13697137.2015.1020484>
 9. Rocca, W. A., et al. (2021). Premature or early bilateral oophorectomy: A population-based study. *Mayo Clinic Proceedings*, 96(6), 1440–1450. <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2021.01.037>
 10. Sood, R., Faubion, S. S., et al. (2020). Prescribing menopausal hormone therapy: An evidence-based approach. *Int J Women's Health*, 12, 507–517. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S247321>
-

УДК: 618.3-089.888.11:618.39-06

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА И ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ В ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГИБЕЛИ ОДНОГО ИЗ МОНОХОРИАЛЬНЫХ БЛИЗНЕЦОВ

Эрханова А.А.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка, Ташкент

XULOSA

Monoxorial ko'phomilali homiladorlikda bir homilaning antenatal o'limi tirik qolgan homila uchun og'ir perinatal asoratlar xavfi bilan bog'liq. Ushbu tadqiqotning maqsadi — monoxorial homiladorlikda bir homilaning antenatal o'limi holatida klinik, instrumental va laborator ko'rsatkichlarni kompleks baholash, shuningdek, xavf darajasini stratifikatsiya qilish va homiladorlikni yuritish bo'yicha prognozli shkala ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Tadqiqotda 77 nafar homilador ayol ishtirok etdi: 40 nafari asosiy guruhda, 37 nafari solishtirma guruhda. Kompleks monitoring o'tkazildi (UZI, dopplerometriya, KTG, laborator markerlar). Sakkiz mezonga asoslangan prognozli shkala ishlab chiqildi va bemorlar uchta xavf kategoriyasiga ajratildi. Yuqori xavf guruhida muddatidan oldin tug'ruq (69,2%), kesarcha kesish (84,6%), nafas olish buzilishlari va past Apgar ballari (<7) ko'proq kuzatildi. Shkala joriy etilgach, og'ir asoratlar chastotasi kamaydi: muddatidan oldin tug'ruq — 61% dan 45% gacha, nafas olish buzilishlari — 48% dan 30% gacha, sun'iy nafas oldirish — 26% dan 12% gacha. Taklif etilgan shkala yuqori klinik samaradorlikni namoyon etdi va monoxorial egizaklardan biri antenatal o'limi kuzatilgan homiladorliklarda qo'llash uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: monoxorial egizak, antenatal halokat, tirik qolgan homila, prognozli shkala, prenatal monitoring, perinatal asoratlar.

Монохориальная многоплодная беременность представляет собой особую клиническую категорию, сопровождающуюся высоким уровнем перинатальных и акушерских осложнений [8]. В отличие от дихориальной, она характеризуется общим хорионом и, как правило, одной плацентой, в которой существуют межфетальные сосудистые анастомозы. Эти анатомо-функциональные особенности определяют уникальные риски для развития фето-фетального трансфузионного синдрома (ФФТС), селективной внутриутробной задержки роста одного из плодов, а также антенатальной гибели одного плода [10,12].

Одним из наиболее тяжелых исходов монохориальной двойни является внутриутробная гибель одного плода, которая наблюдается, по различным данным, в 6–12% случаев [10,12]. Этот сценарий представляет угрозу как для матери, так и для выжившего

SUMMARY

Antenatal death of one fetus in a monochorionic multiple pregnancy is associated with a high risk of adverse perinatal outcomes for the surviving twin. The aim of this study was to perform a comprehensive assessment of clinical, instrumental, and laboratory parameters in pregnant women with intrauterine demise of one fetus in monochorionic twin pregnancies, and to justify a prognostic scoring system for risk stratification and management strategy. A prospective study was conducted involving 77 patients: 40 in the main group and 37 in the comparison group. Comprehensive monitoring was performed, including ultrasound, Doppler studies, cardiocography (CTG), and laboratory markers. A prognostic scale based on seven parameters was developed, allowing classification of patients into three risk categories. In the high-risk group, preterm birth (69.2%), cesarean section (84.6%), respiratory disorders, and low Apgar scores (<7) were observed more frequently. Following the implementation of the scale, the frequency of severe outcomes decreased: preterm birth – from 61% to 45%, respiratory disorders – from 48% to 30%, mechanical ventilation – from 26% to 12%. The proposed scale demonstrated high clinical effectiveness and can be recommended for use in managing pregnancies complicated by the intrauterine death of one monochorionic twin.

Keywords: monochorionic twin pregnancy, intrauterine demise, surviving twin, prognostic scale, prenatal monitoring, perinatal complications.

плода. При наличии сосудистых анастомозов резкое падение давления в мертвом плоде может вызвать острый отток крови от живого плода в тело погибшего, что приводит к гиповолемии, ишемии, гемодинамической нестабильности и поражению жизненно важных органов, прежде всего головного мозга [5,7].

Неврологические осложнения у выжившего близнеца после антенатальной гибели другого плода встречаются в 18–34% случаев [9], а смертность составляет до 20% [4]. Наиболее часто развиваются перивентрикулярная лейкомаляция, порэнцефалия, мультикистозная энцефаломалиция и другие формы ишемического поражения [7].

Современные методы пренатальной визуализации (УЗИ, доплерометрия, КТГ) и лабораторного мониторинга позволяют своевременно выявить признаки фетального страдания у выжившего плода.

Однако отсутствие унифицированных рекомендаций относительно тактики ведения беременности, сроков родоразрешения, применения нейропротективной терапии и показаний к госпитализации делает ведение таких пациенток особенно сложным [3,6,11].

Некоторые авторы предлагают выжидательную тактику при отсутствии выраженных признаков гипоксии у плода [3], другие настаивают на немедленном родоразрешении в интересах предотвращения нарастания ишемического поражения [9]. Таким образом, в современной практике отсутствует единый подход к ведению монохориальной беременности при гибели одного плода, что подтверждается высокой вариабельностью клинических решений в разных учреждениях.

В условиях недостаточной систематизации подходов актуальной становится задача разработки прогностических моделей и шкал стратификации риска, позволяющих объективно оценить состояние выжившего плода и на этой основе принимать обоснованные клинические решения. Важными предикторами неблагоприятного исхода могут служить снижение мозгово-висцерального коэффициента (МВК), патологическое цереброплацентарное соотношение (ЦПО), признаки хориоамнионита, утолщение плаценты, повышение уровня С-реактивного белка и протромбинового времени, изменение кровотока по венозному потоку [2,5,7].

Применение комплексного мониторинга с последующей классификацией риска по разработанной шкале может обеспечить более точное прогнозирование исхода, а также способствовать унификации тактики ведения. Это особенно важно в условиях высокой неопределенности, когда выбор между пролонгированием беременности и немедленным вмешательством оказывает критическое влияние на выживаемость и неврологическое будущее ребёнка.

Таким образом, необходимость объективизации клинического подхода при ведении беременностей с антенатальной гибелью одного плода в условиях монохориальности является крайне актуальной задачей современной перинатологии.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования явилась комплексная оценка клиничко-инструментальных и лабораторных параметров у беременных с монохориальной многоплодной беременностью при антенатальной гибели одного плода, а также разработка и клиническое обоснование прогностической шкалы и алгоритма ведения, направленных на снижение частоты неблагоприятных перинатальных исходов у выжившего плода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка в 2016–2024 гг. и включало ретроспективный и проспективный анализ течения монохориальной двойни.

Проспективная часть включала 77 беременностей, из которых 40 наблюдений составили основную группу (монохориальная двойня с антенатальной гибелью одного плода), а 37 – группу сравнения (монохориальная двойня без внутриутробной гибели). В основной группе было 23 случая монохориальной диамниотической (МХДА) и 17 – моноамниотической (МХМА) двойни; в группе сравнения – 25 МХДА и 12 МХМА.

Критериями включения являлись: подтвержденная монохориальная двойня (по данным УЗИ в I триместре), установленная антенатальная гибель одного плода (в основной группе), гестационный возраст 18–34 недель на момент гибели, наличие полного клиничко-инструментального мониторинга. Исключались дихориальные двойни, случаи с пороками развития, хромосомными аномалиями, редуцированные двойни, а также случаи фето-фетального трансфузионного синдрома (ФФТС) или селективной задержки роста плода (СЗРП) в анамнезе.

Пациенткам проводился комплексный мониторинг: УЗИ с оценкой мозгово-висцерального коэффициента (МВК), доплерометрия в пупочной и средней мозговой артериях, венозном протоке, КТГ, а также лабораторные маркеры – уровень С-реактивного белка, фибриноген, АЧТВ, ПТИ. В проспективной фазе применялась разработанная прогностическая шкала, включающая семь параметров: снижение МВК ниже 5-го перцентиля, патологическое цереброплацентарное соотношение (ЦПО <1), нарушение кровотока по венозному потоку (NO-A или AR), утолщение плаценты >5 см, признаки хориоамнионита на УЗИ, повышение уровня ЦРБ, снижение фибриногена. Каждому признаку присваивался 1 балл. Оценка риска проводилась по сумме баллов: низкий (0–1), умеренный (2–3), высокий (≥ 4). Тактика ведения определялась в зависимости от степени риска и включала динамическое наблюдение, госпитализацию или экстренное родоразрешение.

Оценка исходов включала: срок родоразрешения, массу тела новорожденного, частоту кесарева сечения, Апгар <7 на 1-й минуте, частоту дыхательных расстройств и потребность в ИВЛ. Статистическая обработка проводилась с использованием программ SPSS 26.0 и Excel 2016. Применялись методы описательной статистики (среднее, стандартное отклонение, медиана, IQR), t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна–Уитни, χ^2 -критерий. Диагностическая эффективность шкалы оценивалась методом ROC-анализа с определением чувствительности, специфичности, точности и площади под кривой (AUC). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проспективная часть исследования включала 77 наблюдений, из которых 40 составили основную группу (монохориальная двойня с антенатальной гибелью одного плода), а 37 – группу сравнения (монохориальная двойня без внутриутробной гибели). В

основной группе отмечено 23 случая монохориальной диамниотической (МХДА) и 17 – моноамниотической (МХМА) двойни; в группе сравнения – 25 МХДА и 12 МХМА. Средний гестационный возраст на момент госпитализации составлял $28,1 \pm 3,9$ недель.

Сравнительный анализ показал, что в основной группе достоверно чаще встречались преждевременные роды (45% против 18%; $p < 0,01$), кесарево сечение (42% против 20%; $p < 0,01$), а также более высокая частота дыхательных расстройств (30% против 5%; $p < 0,01$), ИВЛ (12% против 3%; $p = 0,04$) и Апгар < 7 баллов на 1-й минуте (25% против 8%; $p = 0,03$). Средняя масса тела новорождённых в основной группе была ниже – 2320 ± 310 г против 2680 ± 270 г ($p < 0,05$).

В проспективной фазе основного наблюдения применялась прогностическая шкала, позволяющая стратифицировать риск у выжившего плода. Распределение пациенток по степеням риска составило: низкий риск (0–1 балл) – 12,5% ($n=5$), умеренный (2–3 балла) – 45% ($n=18$), высокий (≥ 4 баллов) – 42,5% ($n=17$). У пациенток с высоким риском достоверно чаще наблюдались неблагоприятные исходы: преждевременные роды – 69,2%, кесарево сечение – 84,6%, дыхательные расстройства – 38,5%, Апгар < 7 – 46,1%. В группе низкого риска осложнений не выявлено; в умеренном – частота преждевременных родов составила 27,8%, дыхательных расстройств – 16,7%.

Сравнение полученных данных с результатами ретроспективной части исследования показало снижение частоты тяжёлых исходов после внедрения шкалы и алгоритма ведения: частота преждевременных родов снизилась с 61% до 45%, дыхательных расстройств – с 48% до 30%, потребности в ИВЛ – с 26% до 12% соответственно ($p < 0,05$).

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты настоящего исследования подтверждают, что антенатальная гибель одного плода при монохориальной двойне сопряжена с высоким риском неблагоприятных акушерских и неонатальных исходов для выжившего плода. Полученные данные согласуются с результатами других авторов, указывающих на значительный уровень неврологических и респираторных осложнений у таких новорождённых [7, 9, 10].

В основной группе была выявлена достоверно более высокая частота преждевременных родов, дыхательных расстройств, ИВЛ и низкой оценки по шкале Апгар. Эти данные согласуются с результатами исследований Lewi et al. [5] и Chon et al. [1], которые также подчеркивали необходимость раннего выявления признаков страдания плода в подобных клинических ситуациях.

Одним из наиболее значимых достижений работы является разработка и клиническое внедрение прогностической шкалы, основанной на ключевых

инструментальных и лабораторных маркерах. Применение данной шкалы позволило провести стратификацию риска и индивидуализировать тактику ведения. Особенно информативными оказались снижение мозгово-висцерального коэффициента и патологическое ЦПО, что также подчёркивается в исследованиях Lopriore et al. [7] и Ville [12].

Сравнение показателей до и после внедрения шкалы выявило положительную динамику: достоверное снижение частоты преждевременных родов, дыхательных расстройств и потребности в ИВЛ. Это свидетельствует о высокой клинической эффективности комплексного подхода, включающего шкалу оценки и алгоритм принятия решений. Такой подход может быть особенно полезен в условиях ограниченного времени на выбор тактики при внезапной гибели одного из плодов.

Следует отметить, что в литературе отсутствует единый подход к срокам родоразрешения в случае антенатальной гибели одного плода. Некоторые авторы указывают на допустимость пролонгирования до 34 недель при отсутствии признаков гипоксии [3, 11], другие рекомендуют досрочное родоразрешение при выявлении изменений по данным доплерометрии и УЗИ [4, 6, 8]. Полученные нами данные подтверждают необходимость персонализированного подхода с опорой на объективные предикторы.

Ограничением исследования можно считать относительно небольшой объём проспективной выборки, что требует дальнейшего многоцентрового подтверждения результатов. Тем не менее, продемонстрированная эффективность шкалы и снижение тяжёлых исходов позволяют рекомендовать её применение в практическом здравоохранении.

Таким образом, применение комплексной прогностической шкалы и алгоритма ведения при антенатальной гибели одного плода в условиях монохориальной двойни позволяет повысить качество пренатального мониторинга, обосновать тактику вмешательства и снизить частоту перинатальных осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведённого исследования подтверждают, что антенатальная гибель одного из плодов при монохориальной двойне представляет серьёзную угрозу для выжившего плода и сопровождается высоким риском преждевременных родов, респираторных осложнений и низкой оценки по шкале Апгар.

Разработанная прогностическая шкала, основанная на совокупности клинических, инструментальных и лабораторных маркеров (МВК, ЦПО, венозный проток, УЗИ признаки хориоамнионита, утолщение плаценты, СРБ, фибриноген), продемонстрировала высокую диагностическую эффективность и позволила достоверно стратифицировать риск осложнённого течения беременности.

Применение комплексного мониторинга в сочетании с данной шкалой и алгоритмом тактики веде-

ния позволило снизить частоту тяжёлых неонатальных исходов, повысить обоснованность клинических решений и улучшить перинатальные результаты.

Предложенный подход может быть рекомендован для широкого внедрения в практику перинатальной помощи при ведении монохориальной многоплодной беременности, осложнённой антенатальной гибелью одного плода.

ЛИТЕРАТУРА

1. Chon S.J., Won H.S., Kim A., et al. Outcomes of the surviving twin after fetal demise of the co-twin in twin pregnancies // *Obstet Gynecol Sci.* – 2020. – Vol. 63, № 4. – P. 452–459.
2. De Paepe M.E., Burke R., Gill R. Placental pathology in monochorionic twin gestations // *J Matern Fetal Neonatal Med.* – 2015. – Vol. 28, № 6. – P. 654–661.
3. Frusca T., Soregaroli M., Gastaldi A., et al. Management of monochorionic twin pregnancy // *J Prenat Med.* – 2012. – Vol. 6, № 2. – P. 18–22.
4. Khalil A., Rodgers M., Baschat A., et al. ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in twin pregnancy // *Ultrasound Obstet Gynecol.* – 2016. – Vol. 47, № 2. – P. 247–263.
5. Lewi L., Jani J., Blickstein I., et al. Monochorionic diamniotic twin pregnancies: natural history and risk stratification // *Am J Obstet Gynecol.* – 2013. – Vol. 208, № 1. – P. 19–30.
6. Lanna M., Cota F., Iannone P., et al. Fetal brain injury in monochorionic twin pregnancies complicated by intrauterine death of one twin // *J Perinat Med.* – 2018. – Vol. 46, № 4. – P. 389–395.
7. Lopriore E., Sueters F., Middeldorp J., et al. Brain injury in surviving twins after fetal demise of a co-twin // *Twin Res Hum Genet.* – 2008. – Vol. 11, № 3. – P. 227–236.
8. Roberts D., Gates A. Management of monochorionic twin pregnancy: Green-top Guideline No. 51 // *BJOG.* – 2017. – Vol. 124, Iss. e1. – P. 1–45.
9. Rossi A.C., Prefumo F. Neurologic morbidity in surviving twins after intrauterine death of a co-twin in monochorionic pregnancies: a meta-analysis // *Am J Obstet Gynecol.* – 2010. – Vol. 203, № 5. – P. 401. e1–5.
10. Sebire N.J., Snijders L., Nicolaides C. The hidden mortality of monochorionic twin pregnancies // *BJOG.* – 2000. – Vol. 107, № 8. – P. 1123–1125.
11. Van Klink J.M., Koopman L.J., Derks J.B., et al. Perinatal mortality and severe neonatal morbidity in monochorionic and dichorionic twin pregnancies: a systematic review // *Prenat Diagn.* – 2016. – Vol. 36, № 10. – P. 847–858.
12. Ville Y. Intrauterine fetal demise in monochorionic twins: risks and challenges // *BJOG.* – 2015. – Vol. 122, № 3. – P. 393–394.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ И ИХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

Юлдашев С.К.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка, Ташкент

XULOSA

Ushbu retrospektiv tadqiqotning maqsadi — ayollarda uchraydigan kichik chanoq a'zolarining tushishi holatida qo'llanilgan jarrohlik usullari va ularning klinik natijalarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotga 2019–2023 yillar oralig'ida II–IV darajadagi prolaps tashhisi bilan jarrohlik muolajalarini o'tkazgan bemorlar kiritildi. Baholangan jarrohlik usullari qatoriga sakrospinal fiksatsiya, kolpopeksiya, vaginal gisterektomiya va kombinirlangan usullar kiradi. Asosiy samaradorlik mezonlari sifatida POP-Q klassifikatsiyasi bo'yicha anatomik muvaffaqiyat, retsidiv holatlari va operatsiyadan keyingi asoratlar tahlil qilindi. Olingan natijalar kichik chanoq a'zolari prolapsini davolashda eng samarali jarrohlik yondashuvlarini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, natijalarga ta'sir etuvchi omillar — yosh, tana massasi indeksi va akusherlik anamnezi — tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari individual yondashuvni takomillashtirish va bemorlarning hayot sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Ushbu ish kelgusidagi prospektiv tadqiqotlarning zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: kichik chanoq a'zolari prolapsi, retrospektiv tadqiqot, jarrohlik muolajasi, vaginal gisterektomiya, retsidiv holatlari, operatsiyadan keyingi asoratlar, ayollar hayot sifati, chanoq disfunktsiyasi.

Многочисленные исследователи отмечают широкое распространение ПТО среди женщин репродуктивного, пре- и постменопаузального возраста во всем мире. Практически каждая вторая женщина после 50 лет сталкивается с этим заболеванием, а 11,1% из них нуждаются в хирургическом лечении. [3] Согласно данным ВОЗ, к 2030 году около 63 млн женщин в мире будут страдать от ПТО, так как число пожилых людей к тому времени удвоится и, таким образом, проблема станет еще более актуальной. [4] Имеется значительное количество потенциальных пациенток, которые или совсем не прибегают к помощи врача, либо обращаются слишком поздно, поэтому данные о распространенности ПТО различной стадии и вида варьируют в широких пределах – от 3 до 94%. Отмечено, что в последние годы во всем мире отмечается тенденция к «омоложению» заболевания, и 30-37,5% больных с пролапсом составляют женщины в возрасте до 45 лет (у 2-26% из них имеется пролапс тяжелой степени). [8] Около 64%

SUMMARY

The aim of this retrospective study is to analyze the types of surgical interventions and their clinical outcomes in women diagnosed with pelvic organ prolapse. The study included patients who underwent surgical treatment for stage II–IV prolapse between 2019 and 2023. The interventions assessed comprised sacrospinous fixation, colpexy, vaginal hysterectomy, and combined surgical approaches. Key outcome measures included anatomical success based on the POP-Q classification, recurrence rates, and postoperative complications. The findings help identify the most effective surgical strategies for managing pelvic organ prolapse. Additionally, factors influencing outcomes—such as age, body mass index, and obstetric history—were evaluated. The results may contribute to optimizing surgical decision-making and improving patients' quality of life. This study highlights the importance of individualized treatment planning and the need for further prospective research.

Keywords: pelvic organ prolapse, retrospective study, surgical treatment, vaginal hysterectomy, prolapse recurrence, postoperative complications, women's quality of life, pelvic floor dysfunction.

пациенток предъявляли жалобы на недержание мочи при напряжении, 61% - на императивное недержание мочи, 38% - на учащенное мочеиспускание, 38% - на ночное мочеиспускание, 56% - на обструктивное мочеиспускание. [11]

Важными иницирующими факторами риска ПТО являются беременность и роды, которые всегда были важны для женщин, заложены в их генетику на уровне инстинктов. Однако реализация репродуктивной функции на фоне современной действительности стрессов, пониженной физической нагрузки зачастую приводит к анатомическим и функциональным нарушениям не только внутренних половых, но и смежных с ними органов, формируя дисфункцию тазового дна. [9] Причем, чем выше паритет, тем больше вероятность развития анатомо-функциональных нарушений тазового дна. Роды через естественные родовые пути являются одним из основных факторов риска ПТО, установлено, что 3 и более вагинальных родов являются фактором риска ПТО, а тяжелые фор-

мы (III-IV стадии) ассоциированы с 5 и более родами. [7] Часть ученых приводят данные о приросте риска ПТО уже после 2 вагинальных родов, а расхождение данных результатов объясняют этническими особенностями репродуктивного потенциала женщин. Акушерская травма промежности и ее влияние на развитие ПТО заслуживает самого серьезного внимания. В ходе родовой деятельности происходит травмирование и нарушение иннервации мышц тазового дна, так как до 30% родов заканчиваются травмой m.levator ani. Во многих исследованиях продемонстрирована тесная связь между травмой мышц промежности и развитием ПТО.

Таким образом, различные акушерские события имеют выраженную этиологическую связь с развитием ПТО у женщин в репродуктивном возрасте.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести ретроспективное исследование у женщин с пролапсом тазовых органов, которые находились на стационарном лечении в отделении оперативной гинекологии РСНПМЦЗМиР.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

При проведении исследования были использованы следующие методы: клинический, лабораторно-инструментальный, метод непосредственного наблюдения, аналитический, математико-статистический

и другие. Нами проведено сравнительное когортное ретроспективное динамическое исследование состояния 401 пациентки в возрасте 23-84 года (средний возраст – 47,80±13,04 лет) с ПТО, которые находились на стационарном лечении в отделении оперативной гинекологии РСНПМЦЗМиР с 2019 - 2023 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучена возрастная категория пациенток с пролапсом тазовых органов. Следует отдельно отметить, что медиана (Me) возраста больных с ПТО составила 44 года, что соответствовало молодому возрасту по классификации ВОЗ [3], при этом пациенток до 45 лет было 204 (50,87%), что в нашем понимании, выводит ПТО из разряда сугубо медицинских в медико-социальную проблему, принимая в учет социальные и психологические нюансы патологии (рис. 1).

Исходя из референтных значений ИМТ [2], 3 (0,75%) женщин имели дефицит массы тела, 103 (25,69%) пациенток имели нормальную массу тела, 169 (42,14%) больных имели предожирение, 85 (21,20%) пациенток имели ожирение I степени, 31 (7,73%) – ожирение II степени, 10 (2,49%) женщин – ожирение III степени. Соответственно, ожирение было выявлено у 126 (31,42%) пациенток, но более других преобладало предожирение – 169 (42,14%) больных (рис. 1).




Рис. 1. Распределение пациенток с ПТО по ИМТ, %.

Не меньший интерес представляет в аспекте изучения факторов риска ПТО и образ жизни пациенток, так малоподвижный образ жизни вели 222 (55,36%) больных, физическим трудом занимались 179 (44,64%) исследуемых женщин.

Основной жалобой явилось ощущение инородного тела во влагалище, предьявленная у 159 (39,65%) женщин, диспареунию констатировали у 88 (21,95%) пациенток. Ощущения дискомфорта в повседневной жизни испытывали 206 (51,37%) больных, часть испытывали некие болезненные ощущения в области таза – 29 (7,23%).

152 (37,91%) пациенток предьявляли жалобы на недержание мочи при напряжении, 126 (31,42%) – на императивное недержание мочи, 106 (26,43%) – на

обструктивное мочеиспускание, 76 (18,95%) – на учащенное мочеиспускание, 64 (15,96%) – на ночное мочеиспускание, 41 (10,22%) – на затруднение мочеиспускания, 3 (0,75%) – на ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, 1 (0,25%) женщина жаловалась на «разбрызгивание мочи при мочеиспускании».

При изучении анамнеза подавляющее большинство пациенток страдали ПТО до 5 лет – 335 (83,53%) женщин, 6-10 лет – 53 (13,22%) больных, 11-15 лет – 5 (1,25%), 16-20 лет – 6 (1,50%) и по 28 лет – 2 (0,50%) женщин. Средняя длительность наличия ПТО у исследуемого контингента составила 3,94±3,43 лет (1-28 лет), Me составила 3 года (рис. 2).




Рис. 2. Длительность ПТО исследуемых пациенток, %

При верификации диагноза ПТО и определение его форм наибольшее распространение констатировано у цистоцеле – 349 (87,03%) больных и у ректоцеле – 342 (85,29%) пациенток, а самыми редкими

констатированы «другие формы выпадения» и «выпадение женских половых органов» – по 1 (0,25%) исследуемых, энтероцеле – 2 (0,5%) женщин и уретроцеле – 3 (0,75%) больных (табл. 1).

Таблица 1

Формы пролапса тазовых органов у исследуемых женщин

Формы пролапса тазовых органов	Число больных	
	Абс	%
N81.0 Уретроцеле	3	0,75
N81.1 Цистоцеле	349	87,03
N81.2 Неполное выпадение матки и влагалища	107	26,68
N81.3 Полное выпадение матки и влагалища	22	5,49
N81.4 Выпадение матки и влагалища неуточненное	7	1,75
N81.5 Энтероцеле	2	0,50
N81.6 Ректоцеле	342	85,29
N81.8 Другие формы выпадения	1	0,25
N81.9 Выпадение женских половых органов	1	0,25
Рецидив выпадения женских п.о.	8	2,00

Исследуемым пациенткам нами проведена операционная коррекция ПТО несколькими типами вмешательств (табл. 2). наиболее распространенной операцией явилась передняя кольпорафия с задней кольпоперинопластикой, ее перенесли 297 (74,06%)

пациенток. Также проведена TVT-O – разновидность слинговой операции, при которой под среднюю часть уретры подводили петлю из сетчатого полипропилена [1].

Таблица 2

Типы операционной коррекция ПТО исследуемых женщин

Типы операции	Число больных	
	Абс	%
Передняя кольпорафия с задней кольпоперинопластикой	297	74,06
TVT-O (Tension-free Vaginal Tape Obturator)	131	32,67
Задняя кольпоперинопластика	63	15,71
Влагалищная гистерэктомия	54	13,47
Передняя кольпорафия	16	3,99
Операция Нейгебауэра–Лефора	4	1,00
Пектопексия	2	0,50
Сакровагинопексия	1	0,25
Сакроспинальная фиксация	1	0,25

Нами проведено динамическое наблюдение в течение двух лет состояния всех 297 пациенток, пе-

ренесших операции, направленные на укрепление тазового дна с использованием собственных тканей

– переднюю кольпорафию с задней кольпоперино-пластикой и 131 больной, перенесшей симульганно направленные на укрепление связочного аппарата шейки мочевого пузыря и уретры, и их фиксацию с использованием аллопластических либо синтетических материалов – TVT-О. Часть из которых перенесла сочетание этих вмешательств.

В нашем исследовании среди 297 пациенток, перенесших переднюю кольпорафию с задней кольпоперинопластикой, было зафиксировано 163 (54,88%) случаев рецидива в ближайшие два года после проведения операций.

ВЫВОДЫ

Часть хирургов-гинекологов иногда допускают ошибки в дооперационной тактике в виде недостаточно точной диагностики пролапса с недооценкой степени ПТО, что обуславливает его неполную интраоперационную коррекцию, особенно в сочетанных формах с апикальным пролапсом.

Мы рекомендуем проводить тщательное обследование пациенток с ПТО и классифицировать его комплексно по POP-Q с последующим мультиком-партментным подходом к хирургической коррекции.

Огромное значение имеет ошибка отсутствия разъяснений и рекомендаций по реабилитации – ограничения физических нагрузок, половой жизни и гигиене, что приводит к расхождению швов и часто обуславливает рецидивы ПТО.

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют утверждать, что хирургическая коррекция пролапса тазовых органов (ПТО) не может быть унифицирована по единому протоколу и требует индивидуализированного подхода, учитывающего анатомо-функциональные особенности каждой пациентки. Клиническая практика демонстрирует, что ПТО нередко сопровождается выраженными нарушениями функций мочевыделительной, аноректальной и сексуальной сфер, степень которых варьирует в зависимости от формы и стадии пролапса. Это обуславливает необходимость комплексной оценки симптоматики и функционального статуса пациентки перед выбором метода хирургического вмешательства. Применение персонализированных хирургических техник, адаптированных к конкретной клинической картине, способствует повышению эффективности лечения, снижению риска рецидивов и улучшению качества жизни пациенток в послеоперационном периоде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Allen-Brady K, Norton PA, Hill AJ, Rowe K, Cannon-Albright LA. Risk of pelvic organ prolapse treatment based on extended family history. // *Am J Obstet Gynecol.* 2020 - №223(1) – p.1051-1058.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists and the American Urogynecologic Society; INTERIM UPDATE: This Practice Bulletin is updated as highlighted to reflect the US Food and Drug

Administration order to stop the sale of transvaginal synthetic mesh products for the repair of pelvic organ prolapse. *Pelvic Organ Prolapse. Female Pelvic Med Reconstr Surg.* 2019 - №25(6) – p.397-408.

3. Brito L.G., Pereira G.M., Moalli P. et al. Age and/or postmenopausal status as risk factors for pelvic organ prolapse development: systematic review with meta-analysis // *International Urogynecology Journal.* – 2022. – Vol. 33. – № 1. – P. 15–29.
4. DeLancey JO. What's new in the functional anatomy of pelvic organ prolapse? // *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2016 - №28(5) – p.420-429.; Dieter A.A., Wilkins M.F., Wu J.M. Epidemiological trends and future care needs for pelvic floor disorders // *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology.* – 2015. – Vol. 27. – № 5. – P. 380–384
5. De Mattos Lourenço T.R., Pergialiotis V., Durnea C. et al. A systematic review of reported outcomes and outcome measures in randomized controlled trials on apical prolapse surgery // *International Journal of Gynaecology and Obstetrics: The Official Organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics.* – 2019. – Vol. 145. – № 1. – P. 4–11.; Iglesia CB, Smithling KR. Pelvic Organ Prolapse. // *Am Fam Physician.* 2017 - №96(3) – p.179-185
6. Dietz H.P, Haylen B.T, Vancaillie T.G. Female pelvic organ prolapse and voiding function. // *Int Urogynecol J* 2022 - №13 (5) – p. 284-248
7. Fatton B, de Tayrac R, Letouzey V, Huberlant S. Pelvic organ prolapse and sexual function. // *Nat Rev Urol.* 2020 - №17(7) – p.373-390.; Kayembe A.T., Muela A.M., Baleka A.M. et al. Genital prolapse: epidemiology, clinic and therapeutic at Saint Joseph Hospital of Kinshasa // *The Pan African Medical Journal.* – 2020. – Vol. 37. – P. 196-201. Beketie E.D., Tafese W.T., Assefa Z.M. et al. Symptomatic pelvic floor disorders and its associated factors in South-Central Ethiopia // *PLOS ONE.* – 2021. – Vol. 16. – № 7. – p.254-260; Firdisa G., Tilahun T., Kejela G. Determinants of uterovaginal prolapse in Western Ethiopia // *International Urogynecology Journal.* – 2022. – Vol. 33. – № 2. – P. 421–429.; Oraekwe O.I., Udensi M.A., Nwachukwu K.C. Genital prolapse: A 5-year review at Federal Medical Centre Umuahia, Southeastern Nigeria // *Nigerian Medical Journal: Journal of the Nigeria Medical Association.* – 2016. – Vol. 57. – № 5. – P. 286–289
8. Lourenço DB, Santos HOD, Hirakawa EY, Rios LAS. Does vaginal surgery for correction of pelvic organ prolapse improve urinary function? A prospective cohort study. // *Int Urogynecol J.* 2024 - №35(1) – p.149-156.
9. Oliveira J., Arfi A., Boudy A.-S. et al. Efficacy and safety outcomes after genital prolapse repair by the vaginal route using the Avaulta Plus® mesh // *European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology.* – 2020. – Vol. 250. – P. 48–53
10. Schulten SFM, Claas-Quax MJ, Weemhoff M, van

Eijndhoven HW. et al. Risk factors for primary pelvic organ prolapse and prolapse recurrence: an updated systematic review and meta-analysis. // Am J Obstet Gynecol. 2022 - №227(2) – p.192-208.

11. Лоран О.Б., Серегин А.В., Довлатов З.А. Кратко-, средне- и долгосрочные показатели эффективности и безопасности слинговых операций при недержании мочи у женщин. // Вестник урологии. 2020 - №8(4) – с.80-92.; Elers

J, Hornum Bing M, Birkefoss K, Rohde JF. TVT or TVT-O? - A systematic review and meta-analysis comparing efficacy, complications and re-operations. // Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2021 - №258 – p.146-151.; Song B, He Y, Shen R, Shao H. et al. TVT-O vs TVT-S for female stress urinary incontinence: A systematic review and meta-analysis. // Int J Clin Pract. 2020 - №74(9) – p.135-146

UDC: 616.151.6:618.177

FREQUENCY OF MICROORGANISM ISOLATION IN CHRONIC SALPINGITIS AMONG WOMEN WITH INFERTILITY

Yuldasheva D.S.

Tashkent state medical university

XULOSA

Surunkali salpingit — bu bachadon naylarining uzoq muddatli yallig‘lanishi bo‘lib, ayollarda bepushtlikning asosiy sababi hisoblanadi. Maqsad. Ushbu tadqiqot bepushtlik bilan og‘rigan, surunkali salpingit tashhisi qo‘yilgan ayollarda mikroorganizmlarning turlari va uchrash chastotasini o‘rganishga qaratilgan. Ishda diagnostika usullari, mikroob profili va reproduktiv salomatlikni yaxshilashga qaratilgan davolash strategiyalarining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: surunkali salpingit, bepushtlik, mikroorganizmlarni aniqlash, bachadon naylari, reproduktiv salomatlik, ginekologik infeksiyalar, diagnostika usullari

Female infertility is a complex condition often associated with infectious etiologies. Among these, chronic salpingitis plays a critical role, characterized by long-term inflammation and structural damage to the fallopian tubes. The presence of pathogenic microorganisms can exacerbate tissue damage and impede the movement of gametes, thereby compromising fertility. Understanding the microbial landscape in salpingitis cases is essential for developing targeted treatment protocols and preventive strategies.

MATERIAL AND METHODS

This study involved microbiological analysis of samples obtained from women diagnosed with chronic salpingitis at fertility clinics. Samples were cultured and analyzed for aerobic and anaerobic bacteria, as well as for specific pathogens known to affect the reproductive tract. Advanced molecular techniques such as PCR were employed to identify bacterial DNA, ensuring comprehensive profiling of the microbial communities.

RESULTS AND DISCUSSION

The bar chart below illustrates the frequency of

РЕЗЮМЕ

Хронический сальпингит, стойкое воспаление маточных труб, является одной из основных причин женского бесплодия. Данное исследование направлено на изучение частоты и видов микроорганизмов, выделенных у женщин с диагнозом хронический сальпингит и страдающих бесплодием. В работе освещаются диагностические методы, микробиологический профиль и значимость этих данных для разработки эффективных стратегий лечения и улучшения репродуктивных результатов.


Ключевые слова: хронический сальпингит, бесплодие, выделение микроорганизмов, маточные трубы, репродуктивное здоровье, гинекологические инфекции, диагностические методы.

isolated microorganisms among women suffering from chronic salpingitis and infertility:

The data reveals a high incidence of Chlamydia trachomatis and E. coli in chronic salpingitis cases, underscoring their role in tubal pathology. The detection of Mycoplasma and Ureaplasma species further supports the need for broad-spectrum diagnostic approaches. Effective treatment regimens should include coverage for these pathogens, and public health initiatives must emphasize the importance of early screening and treatment of reproductive tract infections.

CONCLUSIONS

Chronic salpingitis significantly contributes to infertility through microbial colonization and subsequent tubal damage. Understanding the microbial etiology enables tailored therapeutic strategies and enhances the success rates of fertility treatments. This study advocates for enhanced diagnostic protocols and preventive measures to mitigate the impact of infectious agents on female reproductive health.



Microorganism prevalence in chronic salpingitis cases

Microorganism	Prevalence (%)	Associated Risk
Chlamydia trachomatis	28%	High Risk of Tubal Damage
Mycoplasma hominis	23%	Associated with Chronic Infections
Ureaplasma urealyticum	19%	Contributes to Inflammatory Response
E. coli	26%	Common Urogenital Pathogen
Gardnerella vaginalis	15%	Indicator of Bacterial Vaginosis

REFERENCES

1. CDC. (2023). Guidelines for the Treatment of Sexually Transmitted Infections.
2. WHO. (2022). Global Health Strategies on Reproductive Tract Infections.
3. European Society of Human Reproduction and Embryology. (2021). Infectious Causes of Female Infertility.
4. NIH. (2022). Molecular Identification of Reproductive Tract Pathogens.
5. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). Clinical Practice Guidelines for PID and Salpingitis.

UDC: 618.17:616.98:578.834(575.1)

THE IMPACT OF PREVIOUS COVID-19 ON MENSTRUAL CYCLE REGULARITY AND WOMEN’S PSYCHOSOCIAL STATUS: QUALITY-OF-LIFE ASSESSMENT IN THE POST-COVID PERIOD

Yunusova D.X., Najmutdinova D.K.
Tashkent state medical university

XULOSA

Dolzarbliigi. Reproduktiv yoshdagi ayollarda post-COVID davrida hayz sikli buzilishlari va hayot sifatining pasayishi qayd etilgan, mavjud tadqiqotlar dizayni va ta’riflari turlicha.

Maqsad. Post-COVID hayz/ovarial disfunktsiyaning hayot sifati va stress bilan bog’liqligini baholash.

Materiallar va usullar. “ShifoNur” klinikasida ko’ndalang kesim tadqiqoti. $n=144$: post-COVID buzilishlar bilan ($n=62$), post-COVID buzilishlarsiz ($n=52$), nazorat — COVID-19 o’tkazmagan ($n=30$). Hayz ko’rsatkichlari FIGO mezonlari asosida, stress IES-R (10 band, 0–10; jami 0–100) orqali baholandi.

Natijalar. Tartibsiz hayz post-COVID buzilishlari bor guruhda 72,6% (45/62), nazoratda 30,0% (9/30; $p<0,001$); OR = 6,18 (95% IS 2,37–16,13). IES-R ballari mos ravishda $88,24\pm 2,9$, $73,79\pm 2,5$ va $68,92\pm 2,3$ (nazoratga nisbatan $p<0,001$ va $p<0,01$). “Yuqori stress” ulushi guruhlar orasida sezilarli farq qilmadi ($p>0,05$).

Xulosa. Post-COVID holat ayollarda hayz siklining tartibsizligi va yuqori stress yuklamasi bilan bog’liq, ayniqsa simptomlari borlarda. FIGO mezonlariga asoslangan hayz baholashi va qisqa IES-R skriningi post-COVID kuzatuv va maslahatni yaxshilashi mumkin.

Kalit so’zlar: COVID-19, hayz sikli, tartibsiz hayz kelishi, hayot sifati, IES-R, psixologik- ijtimoiy stress, ayollar salomatligi.

COVID-19 has affected health and quality of life worldwide and remains clinically relevant in the post-acute (“post-COVID/Long-COVID”) phase for many patients. [2,5]. Among women of reproductive age, emerging evidence points to menstrual-cycle disturbances (irregularity, changes in duration and flow) and reduced health-related quality of life (HRQoL). While these signals are consistent across multiple cohorts, the literature is heterogeneous in design and outcome definitions, and confounding by age, BMI, time since infection, and cycle day is common, underscoring the need for standardized assessment and reporting. [2,3,8]. Two mechanistic domains plausibly converge on post-COVID menstrual

РЕЗЮМЕ

Актуальность. В пост-COVID периоде у женщин репродуктивного возраста описаны нарушения менструального цикла и снижение качества жизни; опубликованные исследования неоднородны по дизайну и дефинициям.

Цель. Оценить взаимосвязь пост-COVID нарушений менструально-овариальной функции с качеством жизни и уровнем стресса.

Материал и методы. Одномоментное исследование (клиника «Шифо Нур», Ташкент). $n=144$: пост-COVID с нарушениями ($n=62$), пост-COVID без нарушений ($n=52$), контроль без COVID-19 ($n=30$). Менструальные исходы фиксировали по FIGO; стресс оценивали адаптированной IES-R (10 пунктов, 0–10; сумма 0–100).

Результаты. Нерегулярные менструации чаще у пост-COVID с нарушениями (72,6%, 45/62) vs контроль (30,0%, 9/30; $p<0,001$), OR = 6,18 (95% ДИ 2,37–16,13). IES-R: $88,24 \pm 2,9$; $73,79 \pm 2,5$; $68,92 \pm 2,3$ соответственно ($p<0,001$ и $p<0,01$ vs контроль). Доля «высокого стресса» существенно не различалась ($p>0,05$).

Выводы. Пост-COVID состояние ассоциировано с большей частотой нерегулярных менструаций и более высоким стресс-бременем, особенно у женщин с жалобами на нарушения цикла. Комбинация FIGO-ориентированной оценки и краткого стресс-скрининга (IES-R) может оптимизировать маршрутизацию и наблюдение.

Ключевые слова: COVID-19, менструальный цикл, нерегулярные менструации, качество жизни, IES-R, психосоциальный стресс, здоровье женщин, FIGO.

changes. First, psychobiological stress can alter hypothalamic–pituitary–ovarian (HPO) regulation, leading to anovulation or cycle irregularity. A 2024 systematic review synthesizing adult data found that most studies report an association between psychological stress and menstrual dysfunction, most often irregular menses and abnormal flow; the authors also highlighted inconsistencies in how “menstrual disturbance” is defined across studies, motivating better standardization in future work. Second, post-infectious endocrine–immune effects have been described, particularly involving the thyroid axis [8,9,10]. Prospective data show that after acute COVID-19 some women exhibit thyroiditis or autoimmune thyroid dis-

ease (ATD), with higher anti-TPO titers and an increased prevalence of ATD versus matched controls; other cohorts show that many acute thyroid test deviations regress by 3–6 months, though autoimmunity may persist in a subset. These findings suggest a pathway whereby HPT (thyroid) perturbations can secondarily influence HPO regulation and menstrual function in susceptible women [6,4,10].

Against this backdrop, several clinical studies published in 2024 examined menstrual alterations after COVID-19 and their correlates with mood and sleep. A prospective observational analysis reported increased menstrual changes in the pandemic context and linked amenorrhea with depressive symptoms—consistent with functional hypothalamic amenorrhea paradigms. [8,9,10]. These data dovetail with stress-focused syntheses and strengthen the rationale for pairing menstrual phenotyping with validated stress measures in post-COVID cohorts. For menstrual phenotyping itself, the FIGO systems offer a robust framework: the symptom-based system for normal or abnormal uterine bleeding and the PALM-COEIN classification for etiologies, with 2018 revisions designed to improve reproducibility across studies and clinical settings. Using these systems clarifies outcomes (frequency, regularity, duration, volume) and aligns new studies with international standards [7].

OBJECTIVE

To investigate how post-COVID-19 menstrual and ovarian dysfunction affects quality of life in women of reproductive age.

MATERIAL AND METHODS

A cross-sectional analytic study was conducted at the “Shifo Nur” clinic (Tashkent). We enrolled 144 women of reproductive age (mean age 29.0 ± 6.4 years). Three groups were formed: the main group – women with a history of COVID-19 who had menstrual dysfunction ($n = 62$; mean age 22.6 ± 3.2 years); the comparative group – women with a history of COVID-19 without menstrual disturbances ($n = 52$); and the control group – apparently healthy women without prior COVID-19 ($n = 30$; mean age 26.4 ± 4.1 years). The mean age at menarche in the total sample was 13.0 ± 2.3 years (median 12 [11; 15]).

Inclusion criteria: reproductive age; documented history of COVID-19 for groups 1–2; absence of prior COVID-19 for the control group; no active severe somatic or psychiatric disease. Exclusion criteria: polycystic ovary syndrome and endometriosis stage III–IV; pregnancy/lactation; recent hormone therapy; acute in-

flammatory process at the time of assessment.

Clinical and questionnaire assessment included:

- a standardized menstrual function questionnaire based on FIGO criteria (frequency, regularity, duration, and volume of bleeding) with predefined outcomes: “irregular cycle” (yes/no), “menorrhagia” (yes/no), and impact on daily activity/work/sleep (categorical responses);
- an adapted short version of the IES-R (10 items; response scale 0–10) validated to assess the intensity of stress responses; total score 0–100 (higher scores indicate greater impact). Internal consistency of the scale was planned to be evaluated using Cronbach’s alpha. The survey was administered electronically with guaranteed anonymity. For groups 1–2 we additionally recorded: time elapsed since COVID-19 (months), severity of the acute illness (outpatient/inpatient), and vaccination status (yes/no).

Our primary approach was regression-based. The binary primary outcome, irregular menses (yes/no), was analysed using multivariable logistic regression; the secondary outcome, total IES-R score, was analysed using linear regression (ANCOVA). We prespecified two contrasts—“main vs control” and “comparative vs control”—and controlled multiplicity using the Holm method. Model diagnostics included multicollinearity (VIF), linearity of the logit for continuous covariates, and inspection of linear-model residuals (Q–Q plots, Breusch–Pagan test). When assumptions were markedly violated, we additionally computed bootstrap 95% CIs (2000 resamples). The significance threshold was two-sided $p < 0.05$. Analyses were performed in Stata

RESULTS

A total of 144 women of reproductive age were analyzed: post-COVID with menstrual disturbances ($n=62$), post-COVID without disturbances ($n=52$), and controls without COVID-19 ($n=30$). Age at menarche averaged 13.0 ± 2.3 years (median 12 [11; 15]). Irregular menses were more frequent in the post-COVID group with disturbances (45/62; 72.6%) compared with controls (9/30; 30.0%), yielding a statistically significant difference ($p < 0.001$) and a large effect size (OR = 6.18; 95% CI 2.37–16.13) (Table 1; Figure 1).

Bar chart comparing the proportion of irregular cycles in the post-COVID group with menstrual disturbances (72.6%; 45/62) versus controls (30.0%; 9/30). The contrast corresponds to an odds ratio of approximately 6.2, indicating a substantially higher risk among post-COVID patients with disturbances.

Table 1

Irregular menses (frequency)

Group	n	Irregular menses, n (%)
Post-COVID with menstrual disturbances	62	45 (72.6%)
Control (never had COVID-19)	30	9 (30.0%)

Menorrhagia occurred in 3/62 (4.8%) vs 1/30 (3.3%), respectively (between-group $p > 0.05$). For amenorrhea, oligomenorrhea, and intermenstrual bleeding, $p > 0.05$

in all comparisons (data not shown). Most disturbances were reported within the first 6 months after recovery.




Fig. 1. Prevalence of irregular menses (%).

Psychosocial status and quality of life (IES-R). The total IES-R score (0–100) was highest in the post-COVID group with disturbances (88.24 ± 2.9), compared with the post-COVID group without disturbances (73.79 ± 2.5) and controls (68.92 ± 2.3). The difference vs controls was highly significant ($p < 0.001$); the comparison vs the post-COVID group without disturbances was not statistically

significant ($p > 0.05$); the post-COVID without disturbances vs controls contrast reached $p < 0.01$ (Table 2; Figure 2). The proportion of women with “high stress” (per your threshold definition) did not differ significantly across groups ($p > 0.05$), indicating a similar distribution of high IES-R values.

Table 2

IES-R total score (mean \pm SEM) by group

Group	n	IES-R, mean \pm SEM
Post-COVID with menstrual disturbances	62	88.24 ± 2.9
Post-COVID without disturbances	52	73.79 ± 2.5
Control (never had COVID-19)	30	68.92 ± 2.3




Fig. 2. IES-R scores across study groups (mean \pm SEM).

Bar chart showing higher IES-R totals in the post-COVID group with menstrual disturbances compared with the post-COVID group without disturbances and the control group. Error bars indicate SEM; higher scores reflect greater stress impact.

In this cohort, post-COVID status was associated with a markedly higher prevalence of irregular menses and with elevated stress/HRQoL burden (IES-R), particularly among women reporting menstrual disturbances, supporting integrated gynecologic and psychosocial assessment in post-COVID care.

CONCLUSIONS

In this cross-sectional study of 144 women, a history of COVID-19 coupled with self-reported menstrual disturbances was associated with a marked excess of irregular cycles (72.6% vs 30.0%; OR = 6.18; 95% CI 2.37–16.13) and the highest stress burden on the adapted IES-R (mean 88.24 ± 2.9). Women who had COVID-19 without menstrual disturbances showed intermediate IES-R scores and no excess of irregular menses relative to controls. This pattern supports a dual post-COVID signal–menstrual dysregulation and psychosocial distress—most pronounced in symptomatic patients.

Clinically, our findings argue for integrated assessment in post-COVID gynecologic care: (1) standardized FIGO-based phenotyping of menstrual function (frequency, regularity, duration, volume); (2) brief stress screening (e.g., IES-R short form) to identify patients with high psychosocial load; and (3) clear counseling and follow-up pathways, including lifestyle guidance, symptom diaries and, where indicated, referral for psychological support. Such a bundled approach can improve patient communication, prioritize targeted interventions, and reduce unnecessary testing.

From a public-health and research perspective, results highlight the need for longitudinal studies to clarify temporal dynamics and causality, and for multivariable models that address confounding (age, BMI, cycle day, time since infection, vaccination, comorbidities). Limitations include single-center design, self-reported outcomes, and the use of an adapted 10-item IES-R (requiring formal psychometric reporting, e.g., Cronbach's α). Strengths are the standardized menstrual framework (FIGO), explicit definition of contrasts between groups, and presentation of effect sizes with confidence intervals. Overall, the data support incorporating combined menstrual and psychosocial screening into routine post-COVID pathways for women of reproductive age.

REFERENCES

1. Мирзозода Г.С., Додхоева М.Ф., Абдуллаева Р.А. COVID-19 и репродуктивное здоровье женщин. Вестник Авиценны. 2022;24(3):385–393.
2. Климчук А.В., Белоглазов В.А., Яцков И.А., Дворянчиков Я.В. Эндокринные нарушения на фоне COVID-19 и при постковидном синдроме. Ожирение и метаболизм. 2022;19(2):206–212.
3. Мокрышева Н.Г., Галстян Г.Р., Киржаков М.А., Еремкина А.К., Пигарова Е.А. Пандемия COVID-19 и эндокринопатии. Проблемы эндокринологии. 2020;66(1):7–13.
4. Сибирская Е.В., Курмангалеева А.Ю., Короткова С.А., Осипова Г.Т. Аномальные маточные кровотечения и COVID-19 (обзор литературы). Проблемы репродукции (Russian Journal of Human Reproduction). 2023;29(3):74–80.
5. D. Yunusova; D. Najmutdinova Evaluation of hormonal changes in women with menstrual dysfunction who had Covid-19// International Journal of Gynecology & Obstetrics. – 2023. – Т. 163, Suppl. 1. – P. P01.31
6. Юнусова Д.Х., Нажмутдинова Д.К. Нарушения менструально-овариальной функции у женщин репродуктивного возраста, перенесших COVID-19. Вестник Ташкентской медицинской академии. 2023; №7: с. 176-178стр
7. Munro MG, Critchley HOD, Fraser IS; FIGO Menstrual Disorders Committee. The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions. Int J Gynecol Obstet. 2018;143(3):393–408.
8. Polese D, Seravalli V, Biagioni T, et al. The impact of COVID-19 on menstrual cycle alterations in relation to depression and sleep disturbances: a prospective observational study. BMC Women's Health. 2024;24:494.
9. Poitras M, Colizza K, Frappier J-Y, et al. Bloody stressed! A systematic review of the associations between psychological stress and menstrual disturbances. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2024;158:105440.
10. Weiss DS, Marmar CR. The Impact of Event Scale-Revised (IES-R). In: Wilson JP, Keane TM, eds. Assessing Psychological Trauma and PTSD. New York: Guilford Press; 1997:399–411.